$$C = 2 \pi r$$

se tiene C=2×3'141593×25=157'07965

II.—Siendo la circunferencia de un círculo de 339'292044 determinar la longitud del diámetro.

En la fórmula

$$C = \pi d$$

$$d = \frac{C}{C}$$

despejaremos á

$$d = \frac{339^{\circ}292044}{3^{\circ}141593} = 108 \text{ metros}.$$

III.-Determinar la longitud de un arco de 48° en un círculo cuyo rádio es de 10 metros.

La circunferencia de este círculo conforme á la fórmula

$$C = 2 \pi r$$

 $C = 2 \times 3^{\circ}141593 \times 10 = 62^{\circ}83186$ una simple proporcion nos dará la longitud del arco de 48°

IV.—Se quiere saber cuál será el número de grados de un arco de círculo, cuya longitud es de 52 metros y cuyo rádio es igual á 15.

La circunferencia de este círculo será:

$$C = 2 \pi r$$

 $C = 2 \times 3^{\circ}141593 \times 15 = 124^{\circ}247790$ 

una proporcion nos dará el número de grados del arco

$$124^{\circ}247790 : 52^{\circ} :: 360^{\circ} : x = 150^{\circ} - 40^{\circ}$$

con poca diferencia.

V.-Determinar la magnitud de un arco de 60° en partes del rádio. En este caso se supone el rádio =1. La circunferencia será

$$C = 2 \pi r$$

sustituyendo


$$C = 2 \times 3^{\circ}141593 \times 1 = {}^{m}6^{\circ}283186$$

estableciendo la proporcion:

Esto es, siendo 1 el rádio, la longitud del arco de 60° será 1'047198 millonésimas.

# SEGUNDA PARTE.

551.—Superficie es la extension en longitud y latitud prescindiendo del espesor 6 grueso.



La superficie de una figura es la extension comprendida entre las líneas que la limitan. Del mismo modo que la medida de una línea se obtiene refiriendo su longitud al número de c veces que contiene otra línea escogida por F unidad, para valuar una superficie es necesario determinar cuántas veces contiene la unidad de superficie. Al tratar del sistema de pesos y medidas (182 y 185) hemos visto que la

unidad superficial es un cuadrado, y si representando esta unidad por a b c d (fig. 230) quisiéramos estimar la área ó fuperficie del rectángulo A B C D, bastaria averiguar cuántas veces el cuadrado está contenido en el rectángulo. En la figura que hemos tomado por ejemplo, diriamos que la área del rectángulo es de 12 medios centímetros cuadrados, porque 12 veces cabe la unidad superficial escogida, que es el medio centímetro cuadrado, en dicho rectángulo.

Se llaman figuras equivalentes las que tienen superficies iquales, y como se ha visto, figuras iguales son aquellas que sobreponiéndolas coinciden en todos sus puntos. Los rectángulos A B C D y E F G H son equivalentes porque tienen la misma superficie; pero, como se ve, no son ignales.

552. - Para determinar las áreas es de un uso frecuente escoger en los triángulos, y en los paralelógramos uno de sus lados como base de la figura, y se llama altura la perpendicular bajada sobre este lado del vértice ó del lado opuesto.

Así (fig. 231) tomando A B por base la altura del triángulo es C D. En el triángulo E F G, considerando E F como base, la altura es G H, la cual, como se ve, cae sobre la prolongacion

de la base. Por último, en el paralelógramo J O, la base es J K y la altura M L, la cual puede bajarse desde cualquier punto del lado opnesto á la base.

553.—Un paralelógramo A B C D [fig. 232] y un rectángulo A B E F que tienen la misma base A B é igual altura, son equivalentes.



Siendo la altura del paralelógramo igual á la perpendicular E B, si prolongamos F E pasará por D C, y ejecutándolo resultarán dos triángulos A F D y B E C que serán iguales, [385] por tener el ángulo F A D = E B C, por estar formados por

lados paralelos, y tener sus vértices en la misma direccion y F A=E B y A D=B C por lados opuestos de paralelógramo. Una vez demostrado

que el triángulo A F D=B E C

si sucesivamente restamos del trapecio A B C F cada uno de estos triángulos tendremos:

A B C F—A F D—A B C E—B E C

luego A B C D=A B E F en superficie, que es lo que se queria demostrar.

554. Dos paralelógramos de igual base é igual altura son equivalentes, por ser cada uno de ellos equivalente á un rectángulo de la misma base y altura.


555. — Un triángulo cualquiera A B C [fig. 233] es equivalente á la mitad de un paralelógramo de la misma base y altura.

Considerando A C como la base del triángulo, por el vértice B del ángulo opuesto tírese una paralela B D á A C, y por C una paralela C D á A B, resultará el paralelógramo A B D C de la misma base y altura que el triángulo; pero como los triángulos A B.C y B C D son iguales (386), por tener B C comun, B D=A C y A B=C D por lados opuestos de paralelógramo, se infiere que el triángulo A B C será la mitad del paralelógramo que tiene la misma báse y altura que él.

556. - Dos triángulos que tienen sus bases y alturas respectivamente iguales, son equivalentes; porque cada uno de los triángulos es la mitad de paralelógramos equivalentes entre sí.

557.—Dos rectángulos de la misma base son proporcionales á sus al-

Puede suceder que las alturas sean conmensurables 6 inconmensurables entre si.



1º Si (fig. 234) se tienen los rectángulos ABCDy A' B' C' D' de bases iguales, AD =A' D' y cuyas alturas A B y A' B' sean conmensurables, de modo que, por ejemplo, dividiendo A' B' en tres partes iguales, cada una de éstas puede llevarse sobre A B cinco veces, en este supuesto resultará

## A' B' : A B :: 3 : 5


Si por los puntos de division tiramos paralelas respectivamente á las bases A' D' y á A D quedará dividido el rectángulo A' C' en tres rectángulos, y el rectángulo A C en cinco rectángulos iguales todos entre sí por tener la misma base y altura, luego

rectángulo A' C': rectángulo A C:: 3:5

suprimiendo la razon comun de estas dos proporciones, se tiene por último:

rectángulo A' C': rectángulo A C :: A' B': A B

que es lo que se tenia que demostrar.



2º Si las alturas A B y A' B' son inconmensurables (fig. 235) el teorema será igualmente cierto. Supongamos que despues de haber dividido A' B' en dos partes iguales, al llevar la magnitud de estas partes sobre A B resulte esta altura dividida en cuatro partes de A á i, que-

dando una resta i B, la que forzosamente será menor que una de las divisiones. Tirando por los puntos de division paralelas, quedarán divididos el rectángulo A' C' en dos rectángulos, y el rectángulo A C en cuatro rectángulos iguales entre sí, mas otro i C menor que los demas.

Considerando las porciones conmensurables, tendrémos conforme á lo que acabamos de demostrar:

Como rect. A o=rect. A C-rect. i C, y A i=A B-B i sustituyendo se tiene:

multiplicando entre sí los medios y los extremos

A B 
$$\times$$
 rect. A' C' — B i  $\times$  rect. A' C' = A' B'  $\times$  rect. A C — — A' B'  $\times$  rect. i C

trasladando:

A B 
$$\times$$
 rect. A' C' — A' B'  $\times$  rect. A C = B i  $\times$  rect. A' C' — A' B'  $\times$  rect. i C

Una vez establecida esta ecuacion, vamos á demostrar que A B  $\times$ rectángulo A' C' no puede ser desigual á A' B'  $\times$  rectángulo A C. Si lo fueran, habria entre estos dos productos, cuyos factores todos son constantes, una diferencia d fija é independiente de la magnitud arbitraria de las partes en que se divida A' B' y se tendria:

A B 
$$\times$$
 rect. A' C' — A' B'  $\times$  rect. A C = d.

y por lo mismo B i  $\times$  rect. A' C' — A' B'  $\times$  rect. i C = d.

Si en vez de dividir A' B' en dos partes iguales, la dividiéramos en 20 6 en 2,000, y llevando la magnitud de estas partes sobre A B, por los puntos de division tiráramos paralelas, resultaria que la recta B i y el rectángulo i C podrian hacerse sucesivamente más y más pequeños,

y los productos de que son factores podrian ir disminuyendo tanto como se quisiera. Así es, que siendo d constante por expresar la diferencia entre cantidades fijas: A B × rect. A' C' y A' B' × rect. A C, llegaria á tenerse, aumentando el número de divisiones de A' B', en la ecuacion:

pudiendo ser B i < 
$$\frac{A'}{2}$$
, B i <  $\frac{A'}{2,000}$  ó una fraccion tan pequeña co-

mo se quiera, llegaria à tenerse B 1 × 1001. A puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco podrémos suponerensidad de nuevo puede ser el minuendo puede ser el minuendo menor que la resta, tampoco posto.

designales los productos A B × rect. A' C' y A' B' × rect. A SENOTECA UNIVERSITATION CONTRACTOR DE NUEVO EL MALEO DE "ALFONSO REYES" rect. A' C': rect. A C :: A' B': A B Aude. 1625 MONTERREY, MEXIC

558.—Como en un rectángulo puede tomarse la altura como base y ésta por altura, se infiere que las áreas de los rectángulos que tienen sus alturas iguales, son proporcionales á sus bases.

559.—Dos rectángulos cualesquiera son entre sí como los productos respectivos de sus bases por sus alturas.



Sean ABCDyEFGH (fig. 236) dos rectángulos enalesquiera. Si suponemos sobrepuesto el rectángulo E G de manera que coincida el ángulo recto F con el D, tomará la posicion E' D G' H'. Si prolongamos el lado G' H' hasta M, se formará el paralelógramo A D G' M de la

misma base que A C y de igual altura que D H'. Como el rectángulo D M y el A C tienen la misma base A D, serán proporcionales á sus alturas, y por tanto


Los rectángulos D M y D H' tienen la misma altura D G', luego serán proporcionales á sus bases, como lo expresa la siguiente propor-

multiplicando ordenadamente las proporciones [m] y [n], y suprimiendo los factores comunes, resulta:

# rect. A C ; rect. F H :: A D $\times$ A B : F E $\times$ F G

que es lo que se tenia que demostrar.


560.—Problemas de figuras equivalentes.—I.—Trasformar el polígono A B C D E (fig. 237) en otro equivalente que tenga un lado ménos.



Construccion.—Tírese la diagonal A C: por el vértice B del triángulo A B C que tiene esta diagonal por base, tírese B B' paralela á A C; si despues prolongamos el lado D C hasta su interseccion en B', con la paralela B B' y trazamos la recta A B', se tendrá el polígono A B' D E de un lado menos y equivalente á A B C D E.

Demostracion.—Tomando A C como base de los triángulos A C B y A C B', por estar los vértices opuestos B y B' sobre la misma paralela, tendrán sus alturas iguales; luego (556) los triángulos A C B y A C B' serán equivalentes. Si á cada uno de ellos se agrega el área de la figura A C D E, resultará A B C D E equivalente á A B' D E.

II.—Trasformar un polígono A B C D E (fig. 238) en un triángulo equivalente.



Ejecutando la construccion del problema anterior, trasformarémos el pentágono

A B C D E en el cuadrilátero equivalente A B' D E. En seguida, tirando la diagonal A D, la paralela E D' y la recta A D', trasformarémos el cuadrilátero A B' D E en el triángulo A B' D', el cual resolverá el proble-

ma, supuesto que es equivalente al cuadrilátero y éste al pentágono. Del mismo modo podrá reducirse á triángulo un polígono de mayor número de lados.

III.—Trasformar un polígono  $A \ B \ C \ D$  (fig. 239) en otro equivalente que tenga un lado más.




Construccion, —Desde el vértice A tírese una recta indefinida A E que quede fuera del polígono y otra A F que toque el lado opuesto D C en un punto cualquiera F: por el vértice D del triángulo A F D tírese D E paralela á A F, y reuniendo los puntos E y F se tendrá el polígono A B C F E pedido.

Demostracion.—Los triángulos A F D y A F E tienen la misma base A F, y estando los vértices opuestos D y E sobre una paralela, tendrán alturas iguales, y por lo mismo serán equivalentes (556). Si á cada uno de los triángulos equivalentes A F D y A F E se agrega la parte comun A F C B resultará el polígono A B C D equivalente á A B C F E que tiene un lado más.

133

#### VALUACION DE LAS SUPERFICIES

561.—Hemos dicho que para medir ó valuar la área de una figura, es necesario determinar el número de veces que contiene la área de otra figura escogida como término de comparacion, y que la unidad de superficie es un cuadrado cuyo lado es la unidad lineal.



Así, por ejemplo, si queremos medir la área del rectángulo A B C D (fig. 240), la compararémos á la del cuadrado a b c d, tomado como unidad, y determinarémos cuántas veces la unidad lineal a b, lado del cuadrado, está contenida en la base A B del rectángulo (6

veces en el caso que consideramos). Si por los puntos de division tiramos rectas perpendiculares á la base, resultarán 6 bandas ó rectángulos cuya base es la unidad y cuya altura es la del rectángulo A B C D. En seguida llevarémos la unidad lineal a d, lado del cuadrado, cuantas veces se pueda sobre la altura A D del rectángulo (4 en nuestro ejemplo), y tirando por los puntos de division paralelas á la base, resultará el rectángulo A B C D dividido en 6 bandas, cada una de las

cuales contiene 4 cuadrados, ó en junto  $6\times4=24$  unidades superficiales. Se vé, pues, que para valuar la área del rectángulo, se ha determinado el número de unidades lineales de que constan su base y su altura, y el producto de estos dos números expresa cuántas veces la unidad superficial a b c d está contenida en el repetido rectángulo.

Como puede suceder que la unidad lineal no esté contenida un número cabal de veces en la base y altura del rectángulo, valuarémos su área, fundándonos (559) en que dos rectángulos cualesquiera, son proporcionales á los productos de sus bases por sus alturas. Así, en la misma figura 240, se tiene:

### ABCD:abed::ABXAD:abxad

y como a b c d es la unidad superficial, y sus dos lados son iguales entre sí é iguales á la unidad, sustituyendo resulta:

luego despejando, resulta la área de

$$ABCD = AB \times AD$$

por lo que en general se dice que la área de un rectángulo es igual al producto de su base por su altura; pero es preciso tener presente que en este modo abreviado, y tal vez impropio de expresar la superficie de un rectángulo, los lados A B y A D son los números que indican las veces que cada lado contiene á la unidad lineal, y que la área A B C D debe estar expresada en unidades superficiales, como centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. En la última proporcion los términos de la primera razon expresarán, por ejemplo, metros cuadrados, y los factores de los términos que forman la segunda razon, indicarán metros lineales.

562.—En el caso de que los dos lados del rectángulo sean iguales, la figura será un cuadrado y su área estará medida por la 2ª potencia ó el cuadrado de uno de sus lados. De esto proviene que se llame cuadrado á la segunda potencia de un número.

563.—La área de un paratelógramo es igual al producto de su base por su altura, supuesto que (553) el paralelógramo es equivalente á un rectángulo de su misma base y altura.

564.—La área de un triángulo es igual á la mitad del producto de su base por su altura, en razon de que (555) es equivalente á la mitad de un paralelógramo de igual base y altura.

565.—La área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de las bases paralelas por la altura.



Sea el trapecio A B C D (fig. 241). Tirando la diagonal A C, quedará descompuesto en dos triángulos A B C y A D C, que tendrán la misma altura E F, y si tomamos por bases respectivamente los lados paralelos del trapecio, se tiene:

área del triángulo área del triángulo

A B C= $\frac{1}{2}$  A B×E F A D C= $\frac{1}{2}$  D C×E F

sumando, el trapecio A B C D= $\frac{A B + D C}{2} \times E F$ 

que es lo que se tenia que demostrar.

Como 
$$\frac{A B + D C}{2}$$
 = G H (459) recta tirada á distancias iguales de

las bases, puede decirse que la área de un trapecio es igual al producto de su altura por la recta que une los medios de los lados no paralelos.

566.—La área de un polígono regular es igual à la mitad del producto de su perímetro por el rádio recto.



Sea el polígono A B C D E F (fig. 242); si desde el centro O se tiran los rádios oblícuos O A, O B, O C.... resultarán tantos triángulos iguales como lados tenga el polígono regular.

La área de uno de estos triángulos

$$A O B = \frac{1}{2} A B \times H \dot{O}$$

luego si multiplicamos los dos miembros de esta ecuacion por 6, número de los lados del polígono, se tendrá:

área del polígono, A B C D.... = 
$$\frac{1}{2} \times 6$$
 A B  $\times$  H O

pero 6 veces un lado A B es el perímetro, y H O es el rádio recto, si llamamos A la área del polígono, p su perímetro y r el rádio recto, en general se tendrá;

$$A = \frac{1}{2} p r$$



567.—La área de un polígono irregular A B C D E (fig. 243) es igual à la suma de las áreas de los triángulos que lo forman. Comunmente se descompone en triángulos el polígono tirando diagonales desde uno de los vértices, y en seguida se determina el valor de la base y altura de cada uno de ellos.

568.—Expresiones del área del círculo.—Supuesto que el círculo puede considerarse como un polígono regular de una infinidad de lados extremadamente pequeños, la área del círculo será igual á la mitad del producto de su circunferencia por el radio. Así es que, si representamos por s la superficie de un círculo, por c su circunferencia y por r el rádio, se tiene:

sustituyendo por e su valor [549] en funcion de  $\pi$ 

$$c = 2 \pi r$$

$$s = \pi r^2 \dots [2]$$

resulta

de cuya fórmula se hace un uso muy frecuente.

Si llamamos d el diámetro del círculo y sustituimos por r su valor: 4 en la ecuacion [2] se tiene:

$$s=\pi\frac{d^2}{4}\ldots[3]$$

de cuya fórmula nos podrémos servir cuando se conozca el diámetro de un círculo, para determinar su área. Ya hemos visto que el valor numérico de  $\pi$  es de 3'141593 aproximadamente.

569.—Se llama corona la porcion de superficie comprendida entre dos círculos concéntricos.



La área de la corona A B [fig. 244] es igual á la del círculo mayor, ménos la del círculo menor. Si llamamos S la área del primero y R su rádio, s la área del círculo menor y r su rádio, tendremos [568]:

$$S = \pi R^{2}$$

$$s = \pi r^{2}$$

luego la corona =  $\pi \left[ R^2 - r^2 \right] = \pi \left[ R + r \right] \left[ R - r \right]$ 

de esta expresion resulta que la área de una corona es igual al producto de la razon de la circunferencia al diámetro por la suma y por la diferencia de los rádios de los círculos que la forman.



570.—Se llama sector circular la porcion A D B C de un círculo comprendida entre dos rádios y el arco. Si el arco A B [fig. 245] se divide en dos partes iguales, A D y D B, y tiramos el rádio C D, resultarán dos sectores A D C y D B C iguales entre sí, porque si dobláramos la figura por C D, los arcos A D y D B coin-

cidirian por ser iguales, C B se sobrepondria à C A por ser iguales tanto los ángulos B C D y D C A, como los rádios C B y C A. Si en vez de dividir el arco A B en dos partes iguales, lo dividiéramos en tres, cuatro, etc., partes iguales, resultarian tres, cuatro, etc., sectores iguales entre sí, por serlo las partes de que constan; luego los sectores de un mismo círculo son proporcionales á los arcos.

Por tanto, si comparamos la área del sector C A D B con la de todo el círculo, tendrémos:

sector C A D B : área del círculo :: arco A B : eircunferencia del círculo : sustituyendo : sector C A D B :  $\pi$  r² :: arco A B : 2  $\pi$  r

de donde sector C A D B = 
$$\frac{\text{arco A B} \times \pi r^2}{2 \pi r}$$

y reduciendo | sector C A D B = 
$$\frac{\text{arco A B} \times r}{2}$$

luego la área del sector circular es igual á la mitad del producto det arco rectificado por et rádio.

571.—La área de un trapecio circular A B D E [fig. 246] es igual á la semisuma de los arcos A B y D E, por la diferencia A E de los rádios.



Se llama trapecio circular la figura formada por dos arcos A B y D E de círculos concéntricos, y las porciones A E y B D de los rádios.

La área del trapecio circular, como puede verse en la figura, es igual á la del sector A B C ménos la del sector E D C.

Si hacemos el arco A B = A, el E D = a, A C = R y E C = r, tendrémos [570]:

A:a::R:r
de donde a R = A r....[2]

Así es que la ecuacion [1] no se alterará si al numerador del 2º miembro le agregamos a R y le quitamos A r. Así pues,

trapecio A B D E = 
$$\frac{A R - a r + a R - A r}{2}$$
  
=  $\frac{A [R - r] + a [R - r]}{2}$  =  $\frac{[A + a] [R - r]}{2}$ 

luego, trapecio A B D E =  $\frac{A+a}{2}$  [R - r]

que es lo que expresa el teorema.

B' C

572.—La área del segmento A O B A [fig. 247] es igual á la área del sector A O B C ménos la del triánque A B C.

Si consideramos A C como la base del triángulo A B C, y bajamos la perpendicular B D á este lado, B D será la altura del triángulo, y esta recta B D, será la mitad de B B' cuerda del arco doble de A O B.

 $\begin{array}{lll} \text{La área del sector} & \text{A O B C} = \frac{1}{2} \text{ A C} \times \text{A O B} \\ \text{la del triángulo} & \text{A B C} = \frac{1}{2} \text{ A C} \times \text{B D} \\ \text{restando: área del segmento} & \text{A O B A} = \frac{1}{2} \text{ A C [A O B} - \text{B D]} \end{array}$ 

por esto se dice que al área del segmento es igual á la mitad del producto del rádio por la diferencia entre el arco del segmento y la mitad de la cuerda del arco doble.

Conociendo A B, se determina la cuerda B B' del arco-doble despejando á a en la fórmula  $x=\sqrt{2 r^2-r}\sqrt{4 r^2-a^2}$  del problema III

del núm. 544, en la que x representa á A B, y B B' está representada por  $\alpha$ .

Así pues B B' = 
$$a = \sqrt{4 r^2 - \left(\frac{2 r^2 - x^2}{r}\right)^2}$$

573.—Problemas de valuación de áreas.—I.—Determinar el lado de un cuadrado equivalente á un triángulo conocido.

Si llamamos a la altura y b la base del triángulo, su área será  $\frac{ab}{2}$ , y si representamos por x el lado del cuadrado buscado, su área será  $x^2$ ; pero como debe ser

el valor de x puede determinarse sustituyendo los valores de a y de b en esta ecuacion, ó bien buscando gráficamente (544—I) una média proporcional entre las líneas que representen la altura y la mitad de la base del triángulo, supuesto que de la ecuacion resulta:

II.—Determinar un triángulo equivalente á un polígono regular dado.

Como la área del polígono es igual á la mitad del producto de su perímetro por el rádio recto, y la del triángulo es igual á la mitad del producto de su base por su altura, bastará construir un triángulo que tenga por base el perímetro del polígono, y por altura el rádio recto, para resolver el problema.

III. - Determinar un cuadrado equivalente á un círculo.

Dado un círculo, conocerémos su rádio, y para resolver el problema hay que busçar la magnitud del lado del cuadrado. La área del círculo es igual á la mitad del producto de su circunferencia per el rádio, y como la del cuadrado es igual á la 2ª potencia de su lado, para determinar su magnitud bastará encontrar una média proporcional entre la mitad de la circunferencia y el rádio, bien sea calculándola ó construyéndola gráficamente, supuesto que si llamamos e la circunferencia del círculo, r su rádio y x el lado del cuadrado, debe tenerse:

$$\frac{\mathbf{c} \times \mathbf{r}}{2} = \mathbf{x}^2$$

de donde

Podemos resolver este problema de otro modo.

La área del círculo es:

 $S = \pi r^2$ 

La del cuadrado es

supuesto que deben ser equivalentes, se tiene:  $\pi$  r<sup>2</sup> = x<sup>2</sup>

Despejando á x resulta:  $x = \sqrt{\pi r^2}$ 

Como la razon de la circunferencia al diámetro no ha podido expresarse exactamente por ningun valor numérico, tampoco se puede determinar con entera precision, ni la circunferencia ni la superficie del círculo; así es que solo puede resolverse aproximadamente este problema, que se llama de la cuadratura del círculo.

IV. Determinar la área de un triángulo cuya base es de 2025 56 mé-

tros, y cuya altura es de 108'25 metros.

La área del triángulo es igual á la mitad del producto de la base por la altura, así es que en el caso que consideramos, se tiene:

Area = 
$$\frac{b \times a}{2}$$
 =  $\frac{2025'56 \times 108'25}{2}$  =  $10^{9633'4350}$ 

Así, pues, la área del triángulo es de 109633 metros cuadrados, y 4350 diezmilésimos de metro cuadrado.

Como en este caso las dimensiones de la figura estaban expresadas en metros lineales, la superficie resultó en metros cuadrados y fracciones decimales de metro cuadrado.

Si el valor obtenido en metros cradrados lo quisiéramos trasformar en aras conforme á lo explicado en aritmética (183), bastaria dividir el número obtenido por 100. Así

Si las aras se quieren reducir á hectaras, se dividirán igualmente por 100. de modo que

Por el contrario, si los metros cuadrados se quieren reducir sucesivamente á decímetros cuadrados y estos á centimetros cuadrados, se tiene:

V.-Los lados contíguos de un rectángulo son de 8500 metros y de 2556 metros. Se quiere saber cnál es la área de este rectángulo expresada en miriaras.

Siendo la área de un rectángulo igual al producto de su base por su altura se tiene:

Area del rect. 
$$=8500\times2556=21726000=21^{\text{miriars}}$$
.

VI.-¿Cuál seria el lado de un cuadrado equivalente á una caballeria de tierra que contiene 609408 varas cuadradas?

Llamando x el lado del cuadrado buscado debe tenerse

x2=609408 varas cuadradas

luego

 $x = \sqrt{609408} = 780$  varas 64 centésimas.

VII.-Se quiere saber cuál es la área expresada en centímetros cuadrados, de un paralelógramo que tiene 3º2 de base y 0º85 de altura.

Como la área de un paralelógramo es igual al producto de su base por su altura, se tiene:

Area del paralelógramo=3°2×0°85=2°72=27200

VIII .- ¿Cuál es el número de aras que tiene un trapecio, cuyas bases son de 16'5 y 28'22, y cuya altura es de 9 metros?

Como la área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de sus bases por su altura, tendrémos:

Area del trapecio = 
$$\frac{16^{\circ}5 \times 28^{\circ}22}{2} \times 9 = 201^{\circ}24 = 2^{\circ}0124$$

IX.—Calcular la área de un exágono regular cuyo lado es de 32.2. Como la área de un polígono regular es igual á la mitad del producto de su perímetro por el radio recto, es preciso averiguar la longitud de estas dos líneas.

El perímetro del exágono regular será igual á  $3\overline{2}$  2  $\times$  6 =  $19\overline{3}$  20.

Figura 245.

En cuanto al radio recto, bastará observar en la (fig. 248) que si desde el centro del polígono se baja la perpendicular C D y el radio oblicuo C B, resultará el triángulo C B D cuya hipotenusa C B = A B = 32.2 [497], y cuyo cateto B D= $\frac{32.2}{2}$ , luego (532)

 $CD = \sqrt{777'63} = 27'88$ 

La área del exágono será =  $\frac{1}{2}$  (193'20 × 27'88) = 2693'208.

X.—Calcular la área de un círculo cuyo radio es de 6325.28.

Sustituyendo en la fórmula [568] s =  $\pi$  r<sup>2</sup>

se tiene:  $s = 3^{\circ}141593 \times (6325^{\circ}28)^{\circ}$ 

haciendo el cálculo por logaritmos:

8'099 3095=log. 125 692 551

Así pues, la área del círculo es de 125 692 551 metros cuadrados. XI.—Determinar el diámetro de un círculo cuya área es de 45238 9342 varas cuadradas.

La fórmula (3) del número 568 da

 $s = \frac{\pi d^2}{4}$ 

despejando á

 $d = \sqrt{\frac{4s}{\pi}}$ 

sustituyendo

 $d = \sqrt{\frac{4 \times 45238'9342}{3'141593}}$ 

tomando los logaritmos.

Logaritmo 4............0'602 0600 logaritmo 45238'9342.................4'655 5123

5'257 5723

menos log. 3'141593.......0'497 1499

4'760 4224 ½ 2'380 2112 == log. 240

luego el diámetro será de 240 varas.

XII.—Se quiere determinar en piés cuadrados, la área de una corona formada por dos círculos cuyos radios son de 56 y de 42 varas. La fórmula correspondiente [569] es:

$$s = \pi (R + r) (R - r)$$
  
$$s = \pi \times 98 \times 14$$

sustituyendo

calculando por medio de logaritmos,

logaritmo 3'141593......0'497 1499 logaritmo 98......1'991 2261 logaritmo 14.......1'146 1280

Como una vara cuadrada tiene 9 piés, la área de la corona expresada en piés cuadrados será de 38792'385.

XIII.—Determinar la área de un sector de círculo, cuyo radio es de 14'5 y el arco de 42°.

La área del sector circular es igual (570) á la mitad del producto del arco rectificado por el radio.

Para determinar el valor del arco rectificado de 42° calcularémos primero la circunferencia del círculo cuyo radio es de 14°5 por la fórmula (549):

circunferencia =  $2 \pi r$ 

sustituyendo

$$C = 2 \times 3^{\circ}141593 \times 14^{\circ}5 = 91^{\circ}10^{\circ}62.$$

En seguida se calculará la longitud del arco de 42° por medio de la proporcion:

La área del sector será=
$$\frac{10^{\circ}629\times14^{\circ}5}{2}=77^{\circ}06025$$

XIV.—Determinar la área de un trapecio circular cuyos arcos son de 60° y cuyos radios son respectivamente de 41 y de 30 piés.

La fórmula correspondiente (571) es:

trapecio circular = 
$$\frac{A + a}{2}(R - r)...[1]$$

Así, pues, para poder sustituir en ella los valores numéricos, comenzarémos por determinar los arcos A y a de 60°.

$$C = 2 \pi R = 2 \pi 41 = 257'611$$
  
 $360^{\circ}: 60^{\circ}:: 257'611: A = 42'935$   
 $c = 2 \pi r = 2 \pi 30 = 188'496$   
 $360^{\circ}: 60^{\circ}:: 188'496: a = 31'416$ 

Sustituyendo en la fórmula (1),

Area del trapecio = 
$$\frac{42^{\circ}935 + 31^{\circ}416}{2}$$
 (41—30) =  $\frac{168^{\circ}925}{408^{\circ}925}$ 

XV.-Determinar la área de un segmento de círculo cuyo radio es de 10 metros y cuyo arco es de 30°.

La área del segmento circular es igual á la mitad del producto del radio por la diferencia entre el arco del segmento y la mitad de la cuerda del arco doble [572].

Así, pues, tendremos que determinar el a:co rectlicado de 30° en el eírculo cuyo radio es de 10 metros, y la cuerda del arco de 60°.

La circunferencia del círculo es 2  $\pi$  r = 2  $\pi$  10 = 62'832.

$$360^{\circ}:30^{\circ}::62'832:$$
arco de  $30^{\circ}=5'236$ 

En cuanto á la cuerda del arco de 60° hay fórmulas y tablas que dan el valor de la cuerda en funcion del número de grados del arco; pero, en nuestro caso, por ser el arco de 60° [497] la cuerda será igual al radio del círculo = 10 metros. Por tanto, la área del segmento

$$=\frac{10 \left[5^{\circ}236-5\right]}{9}=1^{\circ}180$$

### COMPARACION DE LAS AREAS.

574.—Las áreas de dos paralelógramos cualesquiera, son proporcionales á los productos respectivos de sus bases por sus alturas.

Como la área de un paralelógramo es igual al producto de su base por su altura, si representamos por P y p las áreas de los peralelógramos, por B y b sus bases y por A y a las alturas, se tiene:

$$P = B \times A$$
$$p = b \times a$$

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Dividiendo una por otra estas ecuaciones, resulta: "ALFONSO REYES" Apre. 1625 MONTERREY, MENER

$$\frac{P}{p} = \frac{B \times A}{b \times a}$$

P:p:: B × A: b × a

que es lo que se debia demostrar.

575.—Las áreas de dos triángulos cualesquiera son proporcionales á los produclos respectivos de sus bases por sus alturas.

Como la área de un triángulo es igual á la mitad del producto de su base por su altura, si llamamos T y t las áreas de los triángulss B y b sus bases, y A y a sus alturas, se tiene:

$$T = \frac{B \times A}{2}$$
$$t = \frac{b \times a}{2}$$

Dividiendo una por otra estas ecuaciones, y suprimiendo el denominador comun 2, resulta:

$$\frac{T}{t} = \frac{B \times A}{b \times a}$$

 $T : t :: B \times A : b \times a$ 

que es lo que expresa el teorema.

De aquí se infiere: 1º que las áreas de los triángulos que tienen bases