

es la doctrina, ó mas bien el error de los sifilizadores. ¿En este caso por qué no aplicar simples vejigatorios, como ha dicho con mucha oportunidad Cullerier? Un chancro blando ó vejigatorio es una herida simple, pero si por el contrario, se inoculase un chancro indurado, se inocularia la sífilis misma, y nada mas que la sífilis, y no se podría multiplicar dicho chancro indurado. Así es que se habria producido simplemente la sífilis á un hombre que no la tenia, porque á un sífilítico no se le puede inocular el chancro indurado. Una vez atacado el hombre de sífilis, no se le puede mas que picar y cubrirle de heridas ulcerosas simples, chancros blandos, que no tienen nada de comun con la sífilis, ni influyen por consiguiente de ninguna manera sobre la marcha de esta enfermedad. Llega uno á convencerse que se trata de chancros blandos y no de otra cosa, por este pasaje del libro de Sperino: «El tercer dia despues de la inoculación, la pústula está ordinariamente bien caracterizada...; al cuarto ó quinto dia, las pústulas se abren y fluye el pus, formándose una costra que cubre al chancro... (1).» Esta es mas bien la descripción del chancro blando *no sífilítico*, porque el sífilítico empieza despues de veinte dias lo menos, término medio, por una pápula. La mas brillante demostración de este hecho la dieron los experimentadores que han operado sobre sí mismos. Lindmann se ha inoculado dos mil doscientos chancros simples; pero despues de doce inoculaciones seguidas de doce chancros simples, habiéndose inoculado este experimentador pus de chancro sífilítico, tuvo un chancro indurado al duodécimo dia; cuarenta y cinco dias despues sobrevinieron los accidentes secundarios en la piel. A seguida de esto, fué cuando ejecutó sobre sí mismo el número prodigioso de inoculaciones que hemos referido. Warnery, de Lausanne, (2) Danielsen, han suministrado ejemplos idénticos de inutilidad de inoculaciones de chancros blandos, relativamente á la sífilis. Otra lección que resalta de estos experimentos, es que el organismo jamás se satura por el chancro simple, puesto que dos mil chancros pueden ir seguidos de un número indefinido de iguales ulceraciones, sin provecho y aun con la perspectiva de algun accidente grave, causado por estas operaciones, debiendo temerse el fagedenismo, la erisipela y las consecuencias de estas complicaciones. Aun cuando la inmunidad existiese despues de un número determinado de inoculaciones, esta práctica no seria menos inútil, pero esta inmunidad es de todo punto controvertible. El doctor Laval, que se consideraba sifilizado, ha sido sometido por Ricord á nuevas inoculaciones que dieron resultado positivo. Solo el chancro indurado dá esta inmunidad, porque la sífilis es su

(1) Sperino, *La syphilisation étudiée comme méthode curative et comme moyen prophylactique des maladies vénériennes*, traduit de l'italien par A. Trésal. Turin, 1853.

(2) Lasègue, *De la contagion de la syphilis secondaire* (*Archives de médecine*, 1858, t. I, ou 5^e série, t. XI).

resultado y porque este chancro mismo es el indicio de la saturación del organismo por este principio específico.

Bock (de Christiania) practica la sifilización en los niños atacados de sífilis congénita ó adquirida y se aplaude de esta práctica.

El profesor Sigmund (de Vienne), despues de haber practicado la sifilización en un gran número de sujetos, ha llegado á concluir que este método no tiene ninguna eficacia real.

Quizá el porvenir reservá á la esperimentación emprendida en los animales y en el hombre, éxitos que no se han realizado hasta ahora. Es prudente aguardando nuevos hechos no fiarse de un método peligroso para el paciente y comprometido para el médico.

FORMULARIO É INDICACIONES TERAPÉUTICAS.—Nos limitaremos á indicar, segun hace Melchor Robert, sin dar su fórmula, las *tisanas* que siempre se han empleado en el tratamiento de la sífilis:

- Tisana de genciana.
- de lúpulo.
- de cuasia amara.
- sudorífica.
- de Felz.
- de Zittmann, n.º 1.
- idem, n.º 2.
- de Pollini.
- de Arnoud.
- de Vigaroux.
- de zarzaparrilla simple.

De todas estas bebidas las mas usadas hoy son la dulcamara, el lúpulo, la genciana y la zarzaparrilla, pero nosotros solo les aconsejamos como adyuvantes.

JARABES.

Jarabe.

Jarabe de genciana 500 gram. | Ioduro de hierro . . . de 4 á 8 gram.
Tres cucharadas al dia.

(Sífilis complicada con linfatismo y blenorrea antigua.)

Jarabe sudorífico. (Ricord.)

Zarzaparrilla partida 200 gram. | Guayaco rasurado . . . 200 gram.
Agua comun 2000 gram.

Macérese durante veinticuatro horas; y redúzcase á la mitad á un fuego suave, cuélese con espresion y añádase:

Azúcar blanco 1000 gram.

De 50 á 100 gramos por dia en las tisanas.

A este jarabe se pueden añadir las preparaciones ferruginosas, mercuriales ó ioduradas á dosis convenientes.

JARABES DE PORTAL, DE LARREY, DE COCINERO, DE BOUCHARDAT.

Jarabe antiestrumoso. (Puche.)

Iodo cristalino.....	1 gram.	Ioduro de potasio.....	20 gram.
Tanino del codex.....	10 gram.	Jarabe de genciana.....	469 gram.

Dos ó tres cucharadas por día.

Jarabe de iodidargirato de potasio.

Bi-ioduro de mercurio.....	15 centíg.	Ioduro de potasio.....	10 gram.
Jarabe de goma.....	500 gram.		

Dos cucharadas por día en los accidentes de transición.

Jarabe de ioduro de potasa ferruginoso. (Puche.)

Ioduro de potasio.....	10 gram.	Agua de canela.....	20 gram.
Tartrato férrico potásico....	10 gram.	Jarabe simple.....	480 gram.

De 25 á 100 gramos en medio litro de agua fría: en tres veces durante el día.

Jarabe iodurado. (Ricord.)

Jarabe de zarzaparrilla....	500 gram.	Ioduro de potasio.....	16 gram.
-----------------------------	-----------	------------------------	----------

De tres á seis cucharadas por día.

(Accidentes terciarios de la sífilis y período prodrómico de los accidentes secundarios.)

Jarabe de ioduro de amonio.

Ioduro de amonio.....	25 centíg.	Jarabe de goma.....	100 gram.
-----------------------	------------	---------------------	-----------

Empleado por Gamberini y Galligo como sucedáneo del ioduro de potasio.

Poción de clorato de potasa.

Agua destilada.....	150 gram.	Clorato de potasa.....	4 á 6 gram.
Jarabe de limon.....	50 gram.		

(Estomatitis mercurial.)

Píldoras de proto-ioduro de mercurio. (Ricord.)

Proto-ioduro de mercurio.....	} aa 3 gram.	Estracto tebáico.....	1 gram.
Tridacio.....		Estracto de cicuta.....	6 gram.

H. s. a. 60 píldoras. De una á tres por día.

Algunas veces se reemplaza el extracto de cicuta por seis gramos de conserva de rosas.

Estas píldoras deben administrarse durante el período secundario de la sífilis.

Píldoras de Dupuytren.

Sublimado corrosivo.....	40 centíg.	Estracto de cicuta.....	6 gram.
Estracto de ópio.....	50 centíg.		

H. 40 píldoras. De una á tres por día.

Píldoras de dento-ioduro de mercurio. (Magendie.)

Dento-ioduro de mercurio.....	5 centíg.	Polvos de regaliz.....	C. S.
Estracto de enebro.....	50 centíg.		

H. 8 píldoras. Dos por la mañana y dos por la tarde, y despues cuatro por la mañana y cuatro por la tarde.

Píldoras de ioduro de potasio.

Ioduro de potasio.....	} aa partes iguales.
Estracto de nogal.....	

H. píldoras de 20 centigramos. De cinco á doce por día.

Píldoras de estagnato de oro. (Puche.)

Estagnato de oro.....	50 centíg.	Goma arábica.....	1 gram.
Almidon.....	5 gram.	Agua destilada.....	C. S.

H. 50 píldoras. De dos á cuatro por día.

Píldoras de cloruro de oro. (Chrestien.)

Cloruro de oro y de sódio.....	25 centíg.	Mucilago de goma tragacanto.....	C. S.
Azúcar.....	30 gram.		

H. 60 píldoras. Dos al día.

Píldoras de amalgama de oro y de mercurio.

Amalgama de oro y de mercurio.....	60 centíg.	Conserva de rosas.....	30 centíg.
Tridacio.....	20 centíg.	Polvo de regaliz ó de goma...	C. S.

H. 10 píldoras. Una, dos y tres al día.

Cada píldora contiene 6 centigramos de amalgama y la amalgama está compuesta de 5 centigramos de mercurio y 1 de oro.

Estas píldoras han sido administradas por Ricord con mucho éxito y á dosis muy elevadas, sin provocar la salivación. La fórmula difería, pero la dosis de la amalgama era la misma en cada píldora.

SOLUCIONES.

Licor de Van Swieten.

Bicloruro de mercurio....	1 gram.	Alcohol.....	100 gram.
Agua pura.....	900 gram.		

Primero se disuelve el bicloruro en el alcohol y en seguida se añade el agua destilada. Una cucharada en la tisana.

Licor mercurial normal. (Mialhe.)

Agua destilada.....	500 gram.	} Clara de huevo.....	n.º 1		
Sal comun.....	} aa 1 gram.			Sublimado corrosivo....	30 centíg.
Sal amoniaco.....					

La clara de huevo se bate en el agua destilada, se filtra y en seguida se disuelven los tres compuestos salinos en el agua albuminosa y se filtra de nuevo.

Dos ó tres cucharadas por día en un vaso de agua azucarada.

Solucion de iodidargirato de potasa. (Puche.)

Bi-ioduro de mercurio...	50 centíg.	} Alcoholato de azafran...	20 gram.
Ioduro de potasio.....	50 centíg.		

Dé 25 á 100 gramos por día en la tisana.

Solucion de deuto-ioduro de mercurio. (Lagneau.)

Deuto ó proto-ioduro de mercurio.	1 gram.	Alcohol de 36°....	45 gram.
-----------------------------------	---------	--------------------	----------

Diez á veinte gotas por día en agua azucarada.

Solucion simple de ioduro de potasio.

Agua destilada.....	500 gram.	Ioduro de potasio.....	20 gram.
---------------------	-----------	------------------------	----------

De una á tres cucharadas por día.

Zarzaparrilla iodurada.

Tisana de zarzaparrilla..	500 gram.	Ioduro de potasio.....	1 gram.
---------------------------	-----------	------------------------	---------

Para tomar en el día. Se aumenta gradualmente la dosis hasta 3 á 4 gramos, y mas si el caso lo exige.

Pomadas.—Pocas veces las empleamos. Las que usamos mas son, los ungüentos mercuriales doble y simple, cuando queremos obtener la salivacion por fricciones, ó cuando queremos obrar sobre un tumor ganglionar. Muchas veces curamos tambien el chancreo indurado con

la pomada de calomel. Por otra parte hé aquí las que empleamos con mas frecuencia:

Pomada de calomel.

Calomel al vapor..	1 á 4 gram.	Cerato ó pomada de cohombro.	30 gram.
--------------------	-------------	------------------------------	----------

Para curar el chancreo indurado y ciertas ulceraciones secundarias, cuya base es dura.

Pomada de proto-ioduro hidrargirico.

Proto-ioduro hidrargirico...	1 gram.	Grasa.....	30 gram.
------------------------------	---------	------------	----------

Pomada de turbit mineral. (Ricord.)

Turbit mineral.....	1 gram.	Grasa.....	20 gram.
---------------------	---------	------------	----------

(Sifilides secas y crónicas.)

Pomada de Brea.

Brea purificada.....	4 gram.	Grasa.....	30 gram.
----------------------	---------	------------	----------

(Sifilides escamosas.)

Pomada de estearato de hierro. (Braille.)

Estearato de hierro.....	40 gram.	Aceite esencial.....	5 partes.
--------------------------	----------	----------------------	-----------

(Chancros fagedénicos.)

Otra.

Extracto de ratania.....	4 gram.	} Extracto tebáico.....	2 á 4 gram.
Alcanfor.....	1 gram.		

Esparrapado de estearato de hierro.

Jabon de Marsella.....	2 partes.	Sulfato de protóxido de hierro.	1 parte.
------------------------	-----------	---------------------------------	----------

(Ulceraciones fagedénicas.)

Gargarismos y colutorios.—Solo mencionaremos los gargarismos emolientes de agua de adormideras, de malvavisco, de cebada perlada y de lechuga.

Gargarismo opiado.

Agua de lechuga.....	200 gram.	Extracto tebáico.....	50 centíg.
----------------------	-----------	-----------------------	------------

(Estomatitis y ulceraciones dolorosas.)

Gargarismo antisyfilitico. (Ricord.)

Cocimiento de cicuta y de
yerba mora..... 250 gram. | Deuto cloruro de mercurio. 10 centig.

(Accidentes de la boca y de las fauces.)

Gargarismo iodado. (Ricord.)

Agua destilada..... 200 gram. | Tintura de iodo..... 2 á 4 gram.
Ioduro de potasio..... 50 gram.

(Accidentes terciarios de la boca y de la garganta.)

Gargarismo astringente.

Agua de lechuga..... 200 gram. | Alumbre..... 5 á 10 gram.
Miel rosada..... 30 gram.

Otra.

Agua de lechuga..... 200 gram, | Borax..... 4 á 8 gram.

Gargarismo contra la salivacion.

Agua de lechuga..... 150 gram. | Acido clorhídrico... .. 15 gotas.
Miel rosada..... 40 gram.

Otro gargarismo contra la salivacion.

Agua..... 200 gram. | Clorato de potasa..... 6 gram.
Jarabe de moras..... 60 gram.

(Estomatitis mercurial y ulceraciones secundarias.)

SOLUCIONES PARA LOCIONES Y CURAS.

Solucion opiada.

Agua destilada de lechuga. 200 gram. | Extracto gomoso de ópío... 4 gram.

(Chancros gangrenosos y parafimosis.)

Solucion de sal amoniaco.

Agua..... 250 gram. | Hidroclorato de amoniaco, 250 gram.

(Aplicacion sobre los bubones estrumosos.)

Solucion iodada.

Tintura de iodo..... 2 á 4 gram. | Ioduro de potasio..... C. S.
Agua destilada..... 200 gram.

(Para curar las sífilides terciarias ulceradas.)

Agua alcalina.

Agua..... 200 gram. | Carbonato de sosa..... 10 gram.

(Placas mucosas.)

Locion clorurada. (Ricord.)

Licor de Labarraque..... 50 gram. | Agua destilada..... 150 gram.

(Placas mucosas: se espolvorea la parte enferma con el calomel.)

Solucion de sublimado.

Agua destilada..... 200 gram. | Bicloruro de mercurio... 10 centig.

(Lociones sobre las placas mucosas; efectos muy rápidos.)

Otra.

Agua destilada..... 200 gram. | Alcohol..... C. S.
Bicloruro de mercurio... 50 centig.

(Contra los parásitos.)

Solucion de nitrato de plata.

Agua destilada..... 30 gram. | Nitrato de plata..... 50 centig.

(Para mojar con un pincel las partes afectadas en la balanopostitis.)

Otra.

Nitrato de plata..... 50 centig. | Agua destilada..... 100 gram.

(Para curar los chancros blandos múltiples, en su principio.)

Vino aromático simple ú opiado.

(Chancros simples ó fagedénicos.)

Solucion de tartrato ferrico-potásico.

Agua destilada... 200 gram. | Tartrato ferrico-potásico.. 10 gram.

Mézclese.

Dos ó tres cucharadas por dia, puras ó en un vaso de agua azucarada. Cura de los chancros fagedénicos.

Solucion de alcoholado de guaco. (Pascal.)

Alcoholado de guaco..... 20 gram. | Agua destilada..... 100 gram.

(Cura de los chancros simples y fagedénicos, lociones abortivas, y se hace uso del alcoholado puro con un pincel, para practicar cauterizaciones abortivas al principio del chanero.)

BAÑOS Y FUMIGACIONES.

Pediluvio mercurial.

Deutocloruro de mercurio..... 1 gram.

Para un baño de pies.

(Sifilides de los pies y de la parte inferior de las piernas.)

Baño de sublimado.

Deutocloruro de mercurio..... 10 á 16 gram.

Disuélvase en:

Alcohol..... 120 gram.

Echese en un baño de madera.

(Sifilides antiguas inveteradas.)

Fumigacion de cinábrio.

Cinábrio..... 8 á 12 gram.

Se le puede añadir partes iguales de benjuí, azúcar, etc.

POLVOS.

Calomel al vapor.

Polvo de muriato de oro y de sosa. (Chrestien.)

Licopodio ó iris lavado en alcohol..... 15 centig. | Muriato de oro y sosa..... 5 centig.

Mézclese.

Divídase primero en 15, despues en 14, 13, 12 y tambien progresivamente ocho partes, empezando por las mas débiles.

Se dan fricciones una vez al dia en la lengua y en las encías con uno de estos paquetes.

Polvos contra las vegetaciones.

Polvo de sabina..... }
Oxido de hierro..... } aa. . 4 gram.
Alumbre calcinado..... }

Mézclese.

(Para espolvorear las vegetaciones.)

DESCARÓTICOS.

Pasta de Viena.

(Chaneros, bubones.)

Acido nítrico monohidratado.

(Chaneros simples fagedénicos, vegetaciones.)

Nitrato ácido de mercurio.

(Vegetaciones, placas mucosas de la garganta y de la boca.)

Acido hidroclórico.

(Estomatitis ulcerosa mercurial.)

Pasta carbo-sulfúrica. (Ricord.)

Acido sulfúrico..... 6 gram. | Carbon pulverizado y tamizado. C. S.

Para una pasta blanda, no fluida.

Consérvese en un frasco de tapon esmerilado y en un sitio seco. Esta pasta atrae con avidez la humedad de la atmósfera y se altera rápidamente.

(Chaneros blandos, simples ó fagedénicos.)

Pasta de cloruro de zinc. (Lyon.)

Cloruro de zinc..... }
Harina..... } aa. . partes iguales.

Añádase:

Alcohol..... C. S.

Esta pasta se estiende en tiras de esparadrappo.

(Chaneros y bubones chancrosos.)