

de hierro (Hosack), el *deutocloruro de mercurio* (Martin) á muy cortas dosis, el *aceite de hígado de bacalao* (Wenzel), la *pimienta*, el *iman*, el *cloroformo*, la *metaloterapia*, etc.

Una observacion que se debe hacer acerca del uso de estos medicamentos, es que no tienen probabilidades reales de buen éxito, sino cuando se pueden administrar durante los prodromos ó al principio del acceso.

Precauciones generales.—Los enfermos deben colocarse en un sitio oscuro; tenerlos lejos del ruido y del movimiento; guardar inmovilidad; evitar los olores fuertes y las emociones morales; sostener el calor en los piés, y administrar lavativas para evitar esfuerzos en el acto de defecar. Por otra parte todas estas precauciones las toman instintivamente los enfermos.

ARTÍCULO II.

NEURALGIA EN GENERAL.

En cualquier punto del cuerpo en que aparezca la neuralgia, presenta caracteres generales y comunes.

Poco conocida en la antigüedad, la neuralgia ha comenzado á estudiarse bien por Cotugno (1), despues por Chaussier (2), por Valleix (3), por Notta (4), Sandras (5) Trousseau y Axenfeld.

§ I.—Definicion, sinonimia.

La neuralgia consiste en un dolor mas ó menos intenso, que tiene su asiento en el trayecto de un nervio y se disemina por puntos circunscritos, verdaderos focos dolorosos de donde parten á intervalos variables punzadas ú otros dolores análogos, y en los cuales la presion hecha de un modo conveniente produce un aumento mayor ó menor de sensibilidad.

Si hemos separado las neuralgias de las visceralgias, es porque, segun nosotros, las neuralgias presentan particularidades importantes y forman un grupo patológico bien distinto.

Chaussier ha dado á la enfermedad que nos ocupa el nombre de *neuralgia*, denominacion que ha sido generalmente adoptada, y solo

(1) Cotugno, *De ischiade nervosa*.

(2) Chaussier, *Table synoptique de la néuralgie*, 1803.

(3) Valleix, *Traité des néuralgies ou affections douloureuses des nerfs*. Paris, 1841.

(4) Notta, *Mémoire sur les lésions fonctionnelles qui sont sous la dépendance des néuralgies* (*Arch. gén. de méd.*, 1854, 5^e série, t. V, p. 1, 290 et 543).

(5) Sandras; *Traité pratique des mal. nerveuses*, 1862.

al describir estas afecciones en particular hallamos nombres diferentes, tales como el *calambre doloroso de la cara*, *cedtica*, etc.

Las neuralgias son enfermedades *muy frecuentes*, y desde que se estudian con mas cuidado se descubre un gran número de ellas que pasaban desapercibidas, que es lo que observamos particularmente en la neuralgia intercostal.

§ II.—Causas.

Causas predisponentes.—*Edad.*—El mayor número de las neuralgias aparecen de los veinte á los cincuenta años, y luego sigue el período de cincuenta á sesenta: antes de los diez años es sumamente rara esta enfermedad.

Sexo.—Segun los hechos que he observado y considerada la neuralgia de un modo general, se presenta casi con tanta frecuencia en la mujer como en el hombre; pero ya veremos que en ciertas neuralgias es muy diferente la proporción segun los sexos: así la mujer está mas dispuesta á la neuralgia dorso-intercostal y el hombre á la cedtica. En los hechos que he observado, la enfermedad ha sido mas frecuente en la mujer antes de los treinta años, y se ha notado lo contrario despues de esta edad.

La *constitucion*, el *temperamento*, la *habitacion*, la *alimentacion*, la *profesion*, los *climas* y las *costumbres* no tienen una influencia real sobre las neuralgias. Ciertas *diátesis* parecen tener una accion mas manifiesta, tales como las diátesis reumática, herpética, etc. La desaparicion de una enfermedad cutánea puede dar lugar á neuralgias. No es menos evidente la influencia de las alteraciones de la sangre, ya por la variacion de sus elementos normales, ya por la presencia de elementos estraños (tóxicos).

La *menstruacion*, el *embarazo*, sobre todo durante los primeros meses, la *lactancia*, predisponen á las neuralgias.

Causas ocasionales.—El *enfriamiento prolongado* es la causa que con mas frecuencia se ha comprobado. Pocas veces se desarrolla la enfermedad despues de la *supresion de las reglas*, ó en un *movimiento brusco*.

La exageracion momentánea de la fuerza motriz (Sandras), el *traumatismo*, determinan muchas veces neuralgias, como se ve á consecuencia de heridas, de contusiones, de aplicacion del forceps, etc.

Emilio Dubois (1) fué el primero que ha indicado la intermitencia cuando hay solucion de continuidad, como puede observarse en la zona, las quemaduras, etc. La neuritis, la inflamacion del neurilema

(1) Emile Dubois, *De la néuralgie traumatique* (*Gaz. hebdomadaire*, 1861, n.º 5).—Charles Londe, thèse inaug., 1860.