

-15- pida de pus que mina profundamente dicho tejido celular; en esto tenéis una perfecta imagen de la erisipela flegmonosa. No encontrareis frecuentemente con estos síntomas el desarrollo de vesículas ó de pústulas; en lugar de esto, os encontrareis con la superficie húmeda, brillante y tensa. Los dolores son violentos y agudos, de un carácter lancinante y punzante, y generalmente vienen acompañados de muchos latidos, en particular si las partes profundas están comprendidas en la inflamación.

-5- Si la erisipela llega á atacar la cara, casi siempre comienza en el lado derecho y tiene tendencia á pasar al lado izquierdo. Generalmente hay tendencia á la irritación cerebral, y mientras más joven es el enfermo, mayor es dicha tendencia. No confundais esta irritación cerebral con la metástasis de la erisipela al cerebro, pues aquella es una simple irritación producida, ya por lo elevado de la fiebre, ya por la severidad de los dolores, ó por el envenenamiento de la sangre, ó probablemente por estas tres causas reunidas; pero no es una verdadera metástasis. Si esta última llega á verificarse, la Bell. puede todavía estar indicada; pero si falla, tenemos otros remedios, por ejemplo LACHESIS que conviene cuando la metástasis del cerebro deja de ceder á la Bell., la cara está de un color púrpura ó azuloso, más bien que del color rojo brillante ú oscuro del último remedio mencionado. El paciente está más débil, el pulso más rápido y con menos fuerza, y hay más soñolencia que la que encontramos bajo la acción de Bell.

Otro remedio concordante es CROTALUS que es muy parecido á Lach., tan parecido que no puedo indicaros las diferencias que existen entre ambos.

Debe pensarse en CUPRUM para los casos de metástasis en que los síntomas sean espasmódicos y violentos. El paciente está amenazado de convulsiones; hay contracciones vigorosas de los músculos flexores.

Volviendo á hablar del eritema de Bell. nos encontramos con que cuando dicha afección se hace general, nos sugiere el empleo de dicho remedio para la fiebre escarlatinosa. En esta enfermedad está indicada, antes que todo, por el color rosado brillante de todo el cuerpo; en segundo lugar, por la irritación del cerebro, que es de un carácter activo, y cuyos síntomas recorren todos los grados, desde los simples subsaltos durante el sueño ó estremecimientos en grupos aislados de

músculos, hasta el delirio más violento, con gritos y saltos fuera de la cama. La erupción misma debe ser lisa, pues BELL. NO PRODUCE ERUPCIÓN MILIAR. Los vómitos son violentos, pues Bell. los produce con tanta intensidad como Ipec.; por tal motivo, está indicada particularmente cuando son de origen cerebral. Los síntomas de la garganta son muy marcados; hay en ella una hinchazón rojo-brillante, las amígdalas están lucientes, la lengua presenta un aspecto parecido al de una fresa, ó si está cubierta de alguna capa, ésta es delgada, y á través de ella se perciben las papilas linguales. El pulso es lleno, fuerte y acelerado, y como supondreis, hay una grande inquietud. Puede haber hinchazón de los ganglios, especialmente de los cervicales; puede haber supresión de orina, ó ser ésta copiosa. Alguno de estos estados puede encontrarse incidentalmente en el caso de Bell. Ni el amodorramiento ni el sueño son tales que lleguen á constituir un estado francamente comatoso; no hay la soñolencia ó estupor que se desarrolla á consecuencia de la sangre envenenada, y en cuyo caso el cerebro está tan imperfectamente provisto de oxígeno que pierde su actividad; no es esto lo que se observa bajo la acción de Bell. El sueño que este remedio produce puede ser profundo; el enfermo ronca; puede dormir como un lirón, pero este sueño no es quieto y tranquilo; durante él hay gritos, hay subsaltos musculares, la boca presenta un movimiento continuo de masticación, hay crujido de dientes. Por consiguiente, casi siempre tenemos presentes algunos síntomas que ponen de manifiesto la existencia de una irritación cerebral de carácter activo. Cuando el enfermo despierta, se encuentra violento, mirando con insistencia á todos lados de la pieza, y golpea á los que le rodean. Sin embargo, cuando la enfermedad reviste un tipo maligno, ó cuando á pesar del uso de Bell., llegue á revestir dicho tipo, no debéis cambiar muy pronto de remedio; después tendreis que elegir entre otros, tales como Lach., Rhus tox. ó Hyosc. En estos casos LACHESIS tiene muchos síntomas parecidos á los de Bell.; en ambos remedios nos encontramos gritos durante el sueño, inquietud, irritabilidad al despertar, lengua de fresa, rubicundez de toda la superficie del cuerpo, supresión de orina, adolorimiento de la garganta y vómitos; pues bien, ¿en qué se distinguen? En la esencia de la enfermedad; ésta en el caso de Lach., es adinámica, y el envenenamiento de la sangre es profundo; los síntomas cerebrales no desarrollan el furor de

Bell., pero hay mayor estupor. La piel no tiene aquel aspecto eritematoso y brillante del último remedio, sino un color pálido irregular que aparece de una manera imperfecta, ó un color purpúreo ó azulado. La garganta os presenta no sólo el infarto de los ganglios, sino también la hinchazón del tejido conjuntivo que se encuentra en las fauces. Las partes afectadas, por lo común, tienen un color purpúreo. Si hay tendencia á la formación de pus, y éste no es loable, más indicado estará el Lach.

Frecuentemente precede RHUS TOXICODENDRON á Lach. cuando aparece un flegmón como complicación, habiendo existido antes un color purpúreo. La inflamación asume un carácter depresivo. La erupción es de tipo miliar (lo mismo que con *Hyos.*, *Stram.*, *Bry.* y *Lach.*)

Volviendo á hablar de Bell., nos encontramos con que esta substancia falla algunas veces, aun cuando parece que está bien indicada, en el tratamiento de la escarlatina de Sydenham; y en este caso debe pensarse en dos remedios, uno de los cuales es SULPHUR, que exactamente produce como Bell. un eritema liso en toda la superficie del cuerpo, y que en ciertos casos puede encontrarse indicado al principio del tratamiento.

El otro remedio es CALCAREA OSTREARUM que es complementaria de Bell., pues termina frecuentemente una curación que esta última principió. Por consiguiente, nos la encontramos indicada en la escarlatina cuando aparece la erupción bajo la acción de Bell., pero luego comienza á hacerse pálida. La cara palidece y se hincha; la orina es escasa, ó aun puede estar suprimida, y pueden encontrarse al mismo tiempo, los síntomas cerebrales que reclaman el uso de Bell.

Otra acción que ejerce la Bell. sobre la piel, es la formación de diviosos ó abscesos. Podeis administrarla en la mastitis, ó inflamación de la glándula mamaria, y está indicada por la violencia de los síntomas, por la rubicundez radiante, por las punzadas y la tendencia á la supuración. Los mismos síntomas reclaman su administración para los abscesos de cualquiera clase que sean, y sea cual fuere el lugar en donde se encuentren situados, y hasta los bubones que son de carácter específico pueden reclamar el uso de Bell. cuando los síntomas revistan el carácter violento ya mencionado; nos encontramos igualmen-

te con que dicha substancia es el medicamento adecuado para los diviosos que aparecen durante la primavera.

La Bell. puede usarse con mucho éxito en las afecciones que padecen los niños muy pequeños en el verano. Nos encontramos con que es el remedio adecuado cuando hay propensión á estar llorando ó gritando por horas enteras sin causa aparente; también nos la encontramos indicada contra las indigestiones de los niños, que vienen acompañadas de dolores agudos, gritos repentinos é inclinación del cuerpo hacia atrás para encontrar alivio, y no por encogerse como con *Coloc.* Algunas veces se encuentra tan distendido el colon transverso que hace que se forme una prominencia en la región umbilical, síntoma que también se encuentra con alguna frecuencia en el cólico saturnino. Además, nos encontramos indicada la Bell. contra la diarrea, con especialidad en la diarrea disintérica, esto es, la que es ocasionada por un resfriado, con enteritis, cuando las deposiciones vienen acompañadas de mucho tenesmo (pues debeis recordar que Bell. tiene grande afinidad por los músculos de los esfínteres), siendo las deposiciones viscosas y sanguinolentas. En las afecciones de verano las deposiciones son amarillentas ó verdes, y contienen masas como de yeso, que están formadas indudablemente por caseína.

Debeis recordar la Bell. como complementaria de CHAMOMILLA para dicho cólico y diarrea de los niños.

En la neuralgia, Bell. está indicada por los dolores que aparecen repentinamente, duran un tiempo más ó menos largo, y desaparecen luego, también repentinamente; los dolores son lancinantes, ardorosos, desgarrantes, y cambian de uno á otro lugar; se agravan por el movimiento, por la luz, por el ruido, por el choque más ligero y por estar acostado; y se mejoran enderezándose el enfermo. En la prosopalgia, el lado derecho es el que está afectado más frecuentemente, con especialidad el nervio infra-orbital; la cara se pone roja y caliente. En la sciática el dolor es peor en la articulación de la cadera por la noche, y obliga al enfermo á cambiar de posición. Todos estos dolores, lo mismo que las fiebres, presentan cierta propensión á las exacerbaciones entre 2 ó 3 P. M., y además á las 11 P. M. La propiedad que tiene esta substancia de excitar dolores neurálgicos en todos los nervios espinales nos ha conducido á recomendarla para aquellos dolores atroces que marcan el principio de la ataxia locomotriz.

Con mucha frecuencia está indicado el uso de Bell. en el tratamiento de las convulsiones. La epilepsia<sup>1</sup> se ve prontamente modificada por el uso de ella, y algunas veces se cura; lo mismo pasa con aquella terrible enfermedad: la eclampsia puerperal. También para las convulsiones de los niños, que aparecen, ya sea durante la dentición,<sup>2</sup> ó por repercusión de alguna enfermedad eruptiva, etc.; este remedio tiene un uso casi diario. En todos estos casos deben encontrarse presentes de una manera prominente, los síntomas cerebrales: cabeza caliente, cara abochornada, latidos de las carótidas, el enfermo salta aterrorizado durante el sueño, etc., espuma en la boca que tiene un olor de huevos podridos. Los movimientos convulsivos pueden ser una especie de combinación de emprostótonos y opistótonos; ó el enfermo, que generalmente es un niño, se pone repentinamente rígido, con la mirada fija y brillante. En los casos que se presentan en el período puerperal, la mujer se encuentra en un estado inconsciente, y cada dolor reproduce las convulsiones. Entre éstas y aquel, la enferma da de vueltas, se lamenta y llora, ó cae en un profundo sueño. Entre los niños que están en la época de la dentición, las encías están hinchadas y la boca seca y caliente.

Ahora vamos á hablar de la acción que ejerce la Bell. sobre los órganos genitales de la mujer, acción que en verdad es muy marcada. Produce una presión constante y violenta hacia abajo en las partes genitales<sup>3</sup> con agravación por estar acostada, y se alivia estando en

<sup>1</sup> Es necesario fijar la atención en que *Absinthium* produce congestión de las meninges del cerebro y de la médula, alucinaciones terribles, ojos brillantes, epilepsia seguida de un estado de embotamiento de la mente, ofuscamiento. Vértigo epiléptico ó pérdida momentánea del conocimiento. *Artem. vulg.* es considerada botánicamente, semejante á *Absinth.* y alivia en las epilepsias que aparecen después de un susto, y cuando los ataques se suceden rápidamente. Una inquietud muy marcada es sintoma que caracteriza á *Absinth.*, *Artemisia*, *Cina*, *Cham.* y otros remedios de la familia de las compuestas.

<sup>2</sup> En las indisposiciones que padecen los niños durante la dentición deben hacerse comparaciones con *Kreosota* cuando el niño molesta toda la noche, y durante ésta, necesita ser arrullado constantemente; los dientes se destruyen muy pronto. *Colchicum* cuando las deposiciones tienen un aspecto variable, cuando haya convulsiones durante la dentición, las que son reflejo de irritación abdominal. *Cina* cuando hay convulsiones, cara pálida, el niño duerme lo más del tiempo; está rígido é inquieto. *Dolichos*, encías sumamente sensibles, parece que hay comezón. *Aethusa* disminuye prontamente la hinchazón roja de las encías, y tiene vómitos de leche cuajada.

<sup>3</sup> *Sepia* es opuesta á Bell. en la agravación y el alivio. *Kreosota* tiene presión hacia abajo que se agrava por la quietud, y se mejora moviéndose.

pie. La menstruación es anticipada y abundante, la sangre es rojo-brillante, y su expulsión viene acompañada de dolores calambroides y desgarrantes en la espalda, brazos, etc.; cefalalgia pulsátil; dismenorrea congestiva y dolorosa de una manera muy intensa; presión hacia abajo en las partes genitales; dolores incisivos de atrás hacia adelante ó viceversa; flujo menstrual que sin causa aparente, es de mal olor; loquios igualmente de mal olor y sin causa aparente. Hemorragias uterinas; al fluir la sangre se siente caliente; hemorragia uterina con sensación de presión hacia abajo en la espalda; leucorrea acompañada de esa misma sensación de presión hacia abajo; espasmos en el cuello del útero que se siente caliente y reblandecido; dolores en la espalda como si ésta se fuese á romper. Los dolores de parto aparecen y desaparecen con gran rapidez, y son violentos, pero ineficaces. Puede usarse la Bell. en los momentos del parto cuando no se dilata el cuello, y hay un estado espasmódico en él. Los dolores son violentos y causan mucha angustia, y sin embargo el feto no avanza. Al hacer el tacto vaginal se encuentra el cuello rígido y en estado espasmódico. Unas cuantas dosis de Bell. pueden ser suficientes para corregir esta perturbación.

La Bell. tiene alguna acción sobre el aparato respiratorio: produce una tos con cosquilleo en la laringe, que parece ocasionada como por polvo; cara roja, ojos brillantes; tos seca interrumpida, que viene por accesos violentos; tos con sequedad y presión en la parte superior del pecho que se agrava inmediatamente al acostarse, por la tarde y por la noche. Expectorcación de un moco algo sanguinolento. La laringe se siente adolorida y caliente, con agravación de estos síntomas por la presión. Ardor en el pecho, dolores punzantes al toser y al moverse, pero en los que no influye la respiración. Los dolores se acentúan más por abajo de la clavícula derecha. Hay una sensación de presión en el pecho y entre los omóplatos, con dispnea que aparece tanto al andar como estando en reposo.

También *Calcarea* tiene tos que se presenta inmediatamente después de acostarse.

*Phosphorus* se distingue de Bell. porque la irritación que produce se encuentra situada en una parte más baja del aparato respiratorio. Tiene una sensación mayor de escoriación, y la laringe está adolori-

da, habiendo agravación con hablar y con la presión. En Bell. el adolorimiento es solamente producido por la presión.

Bajo la acción de CAUSTICUM la tos viene acompañada de cosquilleo, la voz casi está apagada; sensación de adolorimiento y escoriación en la tráquea, pero no en el pecho.

RUMEX tiene tos seca que parece producida por cosquilleo en la fosa supra-esternal; agravación por la más ligera corriente de aire frío, ó por una inspiración profunda.

Con CEPA la tos produce una sensación como si se fuese á hendir la laringe; el paciente tiene que asirse la garganta; hay coriza.

LACHESIS tiene tos como por cosquilleo en un lugar más abajo que el que corresponde á Bell. y se agrava por la más ligera presión de las ropas.

Para combatir la rigidez del cuello del útero también os debeis acordar de GELSEMIUM.

Bell. es complementaria de CALCAREA OSTREARUM. Sus antídotos son *Coff.*, *N. vom.* *Opium*. El *Hyosciamus* antidotiza el abuso que de ella se hace para las afecciones cutáneas y la tos.

## XXXIX LECTURA.

### STRAMONIUM Y HIOSCIAMUS.

#### DATURA STRAMONIUM.

STRAMONIUM difiere algo de Bell. Los síntomas mentales que os conducirán á su elección, son estos: la manía ó el delirio es de carácter furioso, estando la cara con un color rojo-brillante; los ojos tienen una mirada vaga y feroz, aun cuando no se encuentran completamente congestionados como bajo la acción de Bell. Las alucinaciones aterrorizan al paciente; ve objetos que saltan de todos los ángulos de la pieza ó animales de formas inexplicables ó inverosímiles, lo que le aterroriza. Si el enfermo es un niño, grita llamando á su madre, que tal vez está cerca de él; tiene los ojos abiertos y las pupilas ampliamente dilatadas. Si es un adulto, se halla presa de un delirio locuaz. Unas veces tiene un carácter alegre que revela en su locuacidad, otras veces está aterrorizado. A ratos se pone á reir, cantando y haciendo muecas; y á pocos momentos se pone á orar, grita pidiendo auxilio, etc. Con frecuencia tiene fotomanía, ó deseo de la luz, y parece que tiene un grande horror á la obscuridad. Algunas ocasiones cree firmemente que habla con algunos espíritus; otras veces la manía asume un carácter de estupidez; el enfermo habla de una manera necia y falta de sentido, riéndose de lo que él considera como chistes. Esta locuacidad es distinta de la de LACHESIS; en Stramonium la locuacidad consiste en un simple aflujo de palabras, mientras que en