Págs.

Vid de Moscatel..... 130
Vid, esfinge de la. Lámina XXIII.
Vid, filoxera de la. Lámina XXIII.
Vid Lenoir..... 133
Vid, mariposa de la. Lámina XXIII.
Vid, mayate de la. Lámina XXIII.
Vid Moscatel..... 133
Vid, oruga de los racimos. Lámina XXIII.
Vid, pulga de la. Lámina XXIII.
Vid, palomilla de la..... 279
Vinagrillos..... 99
Vinagre de mango..... 185
Viruela..... 229 y 281
Viruela del algodón. Lámina XVI.
Visco cuercino..... 179
Volcán de Toluca..... 95
Vorticella..... 179

W

Wait..... 233
Walter..... 308
Weed. Lámina XXIII y XXVIII.
Wilbur, J..... 269
World, V..... 189

X

Xochicoatlán..... 286
Xoxoco. Lámina X..... 7, 10, 37 y 38

Y

Yucca gloriosa. Lámina XIV.

Z

Zacate..... 4
Zacate, palomilla del..... 304
Zacate del Pará..... 149
Zacates..... 10
Zacatlaxcal..... 185
Zacatlascale..... 185
Zacatón..... 192
Zapote prieto..... 391
Zarzaparrilla, extracto de..... 172
Zea mays..... 26
Zimmermann..... 242
Zincuate..... 100
Zygadenus mexicanus. Liliáceas..... 170

ADICIONES.—ERRATAS.

PAGINA 43, LINEA 13.—Los experimentos de Kühn y de Saccardo fueron negativos y esto nos hizo dudar de la opinión del Doctor Villada, quien suponía que los gérmenes de los Chahuixtles podrían ser alimentados por el Palo Amarillo, la Tullidora ó la Chaquirilla. (Véase: "Las Plagas de la Agricultura," p. 260 y "La Naturaleza," segunda serie, tomo III, p. 1 del Apéndice. Opinión de Delacroix: "Boletín de la Comisión de Parasitología Agrícola," tomo II, p. 120.)

Los hongos que viven en el Palo Amarillo y en la Chaquirilla son muy distintos del Chahuixtle del Trigo, y á pesar de que se les había considerado como perjudiciales, no deben preocupar al agricultor. El hongo del Palo Amarillo fué estudiado por el Sr. Maublanc y es el *Aecidium mexicanum*, el de la Chaquirilla ó *Adolphia infestans* fué descrito como especie nueva por el Sr. M. Turconi y se llama *Phyllachora mexicana*. Los Sres. J. B. Ellis y A. Kellerman lo clasificaron como *Phyllachora adolphiæ*.

Los últimos estudios de Eriksson parecen demostrar que el germen del Chahuixtle se conserva dentro de los tejidos del trigo (micoplasma), en las variedades que no son resistentes y que, por tanto, no conviene cultivar, pues sería imposible destruir ese germen por los medios acostumbrados. (Véase: "Experiment Station Record," Vol. XV, nº 8, p. 186.)

LAMINA XXVIII. Fig. 16.—Catarina de la papa. Fué considerada como perjudicial en el Valle de México, en antiguas publicaciones agrícolas.

No existe en dicha región, según el Profesor W. L. Tower, de la Universidad de Chicago, pues fué confundida con la *Doryphora multitæniata*, que sí vive en el Valle de México.

PAGINA 97.—*Nota*. —Dice: *formieria*. Léase: *formicaria*.

PAGINA 100.—Dice: teconote. Léase: teconete.