

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD AGRICOLA MEXICANA
HONORUM VEGETABILIA
CENSUS HISTORICO
IN LUGEM PRODUCIT
MEXICO
APUD CUNDIS FAVNUM ESTEVA
M.DCC.XXII

PROEMIUM HUJUSCE SECUNDÆ EDITIONIS.

Opusculum hoc duobus fasciculis comprehensum, annis millesimo octingentesimo vigesimo quarto et sequente hâc civitate editum fuit. At exemplaria forsitan pauca e prelis exiere, sive temporum incuria obruta sunt; quô factum est ut pluribus ab hinc annis tum opellæ inventio cum ejusdem adquisitio perquam difficiles fuerint. Propterea et nomina et labores DD. Pauli de la Llave et Joannis Lexarza vel penitus inter nos ignota sunt, aut tantum cognita ob mentionem in scriptis candoleanis et Lindleyanis factam.

Nos igitur oblivionem indecoram redimere cupientes, simulque Heroum nostrorum grata nomina commemorari, et tandem Botanices studio inservire, hanc Fasciculorum editionem, Societatis Agricolæ Mexicanæ impensis efficiendam, typis mandare libentissime aggredimur.

Hoc tantum nobis admonere liceat: Auctores nostri, veterum Nomenclatorum vestigia sequentes, verbo *germen usi* sunt, ubi si nunc scripsissent, illius loco *ovarium* nomen inveniretur: hæc unius verbi substitutis facillime à benevolentे lectore fiet.

P. ALMAZAN.

MINA

Pentandria monogynia. Perianthium: monophyllum, liberum. Corolla; monopetala, tubulosa, basi dilatata. Filamenta corolla duplo longiora, ore tubi inserta. Germen oblongum glandula carnosa cinctum.

M LOBATA.

Planta; volubilis ramosa, caule cylindrico glabro.

Folia; cordato-trilobata, inferiora scabriuscula aliquantulum villosa, superiora glabra, parum nervosa.

Pedunculi; communes longissimi, glaberrimi, striati.

Inflorescentia; racemi gemini, secundi, in extremitate cujuslibet pedunculi communis 7-9-11 flori.

Flores; semipollicares, ad exortum rubri, adultiores luteo rubentes, postremo dum ad summam explicationem pervenerunt luteo-albantes, apice tantum rosei.

Perianthium; brevissimum, liberum, monophyllum, carnosum, 5 fidum, laciniis oblongis, carinatis, marginibus membranaceis, dorso sub apice mucronatis, mucrone carioso, colorato inermi-

Corolla; monopetala, tubulosa, incurva, basi ampliata, lateri-
3.

bus compressa, 5 angularis, tubo intra calicem brevissimo, limbo angustato 5 dentato, dentibus post explicationem floris, rotundatis, mucronatis.

Filamenta; quinque, *inequalia*, *corolla duplo longiosa*, *incurva*,
ad latus superius corollae *inclinata*, ore tubi *inserta*.
Stigmas *triloculares*, *biloculares*, basi *crenatae*, polli-

Antherae; oblongae, sulcatae, biloculares, basi crenatae, polline globoso refertae.

Germen; oblongiusculum, obtusum, 5-angulare, angulis obtusis, glandula carnosa basi cinctum.

Stylus; filiformis, filamentis paulo longior, stigmate globoso,
glandulis tecto.

Genus ipomoea affine. Vasis testeis Mexici propter florum elegantiam colitur. Floret aestate.—Cerv.

MORENOA.

Pentandria, monoginia. Corolla; incurva, compresiuscula, limbo globoso aut explicato. Filamenta exserta, reclinata. Reliqua, ut in Ipomoca.

M. GLOBOSA.

Caulis; teres, scandens, perennis.

Folia; alterna, longe petiolata, glabra, hastata, lobo intermedio lanceolato-acuminato, lateralibus in angulum acutum antice protractis, postice, prolongato-amplificatis, truncatis, hic ut plurimum angulosis, nec raro repandis.

Flores; axillares, subfasciculati. petiolo communi praelongo; proprio, brevi.

Calix; quinque-partitus, laciniis rotundatis, margine membranaceis, aequalibus, subtus, versus apicem corniculo carnoso donatis.

Corolla; punicea, incurva, compressa, limbo globoso, filamentis exsertis, reclinatis. Reliqua ut in ipomoea.

Floret toto anno in S. José del Corral, ad vias in montosis. Colitur etiam in horto mexicano.—Llav.

Cervantesio auctore habemus, plantam quam nunc Morenoam appellamus aliasque bene multas Marianno Lagasca Botanic Hispan, Principi, multis abhinc annis ob ipso fuisse comunicatas, ut nova instituerent genera; sed cum Morenoa praesertim in libris qui ad nos pervenerunt minime descripta inveniatur, rite jure nostro utimur.

MORENOA.

BRAVOA.

Hexandria monogynia. Flores; gemini spathacei. Perigonium; infundibuliforme, ore amplificato. Filamenta; sex fundo tubi inserta, longitudine perigonnii. Ovarium; trigonum adhaerens. Capsula, oblonga trilocularis, trivalvis. Semina, numerosa reniformia.

B. GEMINIFLORA.

Radix; bulbus solidus piriformis, tuberculis inferioribus fasciculatis.

Scapus; longissimus, teres, articulatus, erectus, apice coloratus.

Folia; radicalia ensiformia, patenti-ráflexa, basi punctis coccineis maculata.

Flores; alterni, gemini, penduli, breviter pedunculati, spatha squamiformi suffulti.

Perigonium; infundibuliforme, fere cylindricum, extus puniceum intus lutescens ore amplificato, limbo sex-dentato, dentibus tribus alternatim minoribus, paululum introflexis, omnibus obtusis brevissimis.

Filamenta; tubi fundo inserta, filiformia, longitudine perigonii antheris versatilibus.

*Ovarium; oblongum, obscuré trigonum, adhaerens, stylo in-
crassato, filamentis longiore, stigmate triquetro.*

*Capsula; oblonga trilocularis, trivalvis, perigonio persistenti
obtecta.*

*Semina; plurima, reniformia, dupli serie in unoquoque lucu-
lamento ordinata.*

*Habitat in montibus Micciacanis, et prope Vallisoletum. Floret au-
tumno.—Lex.*

BRAYOA

*Bracteolae vibrantes, ruficreas, exsertae. Bractea secundaria
oblonga, divisa, marginata, mucronata, apice rotundata.
Corolla hypogyna, plicata, staminis inclusa. Stigma, truncatum.
Capsula unilocularis, polysperma.*

LENNOA.

*Octandria monogynia. Calix inferus marcescens. Corolla
hypogyna, plicata. Stamina octo inclusa. Stigma, truncatum.
Capsula unilocularis polysperma.*

L. MADREPOROIDES.

Planta; nana, crassa.

*Caulis; teres, carnosus, niveus, radiculis fibrosis simplicis-
simis.*

*Squamulae; foliacae; bractaeformes, coloratae, imbricatae,
marcescentes.*

*Flores; corimboso-thyrsoidei, purpurinae, pedunculis carnosis,
ut plurimum fasciculatis.*

*Calix; monophyllus, basi gibbosus, profunde laciniatus, seg-
mentis octo linearibus, ligulatis, tomentoso-hyalinis, linea pur-
purina tota longitudine, intus amplius explicata notatis, apice
involutis.*

*Corolla; monopetala, hipocrateriformis pupureo-violacea, tu-
bo calice breviori, ventricoso, albicanti, limbo stellato-plicato,
octo-fido, dentibus emarginatis, fave lutescenti.*

Filamenta; octo, tubo inserta, plicaturis alternatim opposita,

incurva, nec exserta, antheris geminis, subrotundis, lutescentibus.

Ovarium; superum, hemisphaericum coloratum, stylo subulato tubo corollae breviori, stigmate truncato.

Capsula; piriformis, unilocularis, octo-valvis, polysperma, seminibus minutissimis.

Floret prope Vallisoletum autumno.—Lex.

MATAMORIA.

Poligamia aequalis. Calix 4-florus, 4-phyllus, 4-caliculatus. Receptaculum, nudum. Pappus, multiaristatus, aristis duabus longioribus inflexis atque reflexis in hamulum.

M. SPICATA.

Caulis; bipedalis et ultra, nunc simplex omnino, nunc ramis florigeris in summitate compositus, piloso-hispidulus.

Folia; alterna in petiolum breve decurrentia, obtuse serrata, adultiora obovata, juniora, lanceolata.

Flores; bini terni in axillis sessiles spicam exhibent.

Calix 4-phyllus, foliolis—4 per paria inequalibus caliculatus.

Flores 4 tubulosi, 5 dentati, in umbrosis violacei, de caetero albi.

Pappus multi-aristatus, aristis 4 longioribus quarum duas maiores videntes inflexae in hamulum.

Semina sublinearia villosa.

Floret februario in semitis et pascuis S. Josephi del Corral.—Llav.

incurva, nec astricta, seducta quatinus, subreductis, longiora.
Mon.

Ovarium; superum, hemisphaericum, rotundatum, aplo-subrotundatum, cordiforme levator, stylo exsertum.

Capsula; peritoma, unicarpi, ovovalvis, polycarpica, se-
minalibus, ciliatis, striata.

Flora prope Callianthes — Lla.

ANISOMATAM ROSALESIA.

Poligamia, aequalis. Calix, de medio ad imum foliolis
apice revolutis imbricatus. Receptaculum, nudum. Anthe-
rae in imo tubi; styli exserti, eminenter clavati. Pappus. vi-
losus. Semina, striata villosa.

R. GLANDULOSA

Frutex; biorgialis, ramoso-virgatus, ramis junioribus striatis,
pubescentibus, florigeris in extremitate viscosis.

Folia; opposita, ovato-subcordata, petiolata, supra aspera,
subtus pube subtomentosa, margine crenis subserrata.

Inflorescentia; ramulorum extremitate atque iu axillis corim-
bosa, pedunculis 2—5 flores gerentibus.

Calix; foliolis constat 8—12 acutis, erectis, aequalibus, stria-
tis, ad medium usque duplici foliorum ordine cinctis, quae ova-
ta sunt, apiceque revoluta; omnibus glanduloso viscosis.

Flores; calice paullo longiores, numerosi, pallide flavi, tubis
linearibus, ore stricto, limbo brevissime 5 dentato.

Antherae; in fundo corollae.

Stylus; ab ore tubi in stigmata duo dividitur, prelonga, emi-
nenter clavata, divaricata, nec revoluta.

Receptaculum; nudum, scabrum.

Pappus; pilosus, floribus paullo minor.

Semina; cilindracea, striata, villosa.

Habitat in pascuis S. Jose del Corral; florebat martio.—Lla.

Genus, calice, antheris, et stylis preserlim, qui singularitatem quan-
dam plantae tribuunt, a Cacaliis afinibusque prorsus diversum.

ALTIENDEA.

Receptaculum; convexum, paleis praeditum minutis, apice subbaristatis, in centro longioribus. Pappus, pilosus uniformis.

Florebat martio ad ripas stagni vulgo Balsa del Buei in Rio Seco, non longe à S. Jose del Corral.

Folia nonnulla altera medietate versus basim abbreviata, quasi clauda apparent.—Llav.

ABASOLOA.

ALLENDEA.

Poligamia superflua. Flos discoideus. Calix imbricatus. Feminae in peripheria semiflosculosae, erectae. Receptaculum squamosum. Pappus pilosus uniformis.

A. LANCEOLATA.

Caulis; herbaceus, 6 pedalis et ultra, virgatus, ramulis, striato-teretibus, tomentoso-sericeis.

Folia; opposita, connata, late lanceolata, in petiolum brevem decurrentia, supra, leté viridia, subtus trinervia, tomento argenteo sericeo, margine una alterave papilla denticulata.

Inflorescentia; terminalis, subcorimbosa, pedunculis communibus praelongis, propriis multo minoribus.

Calix; imbricatus, foliolis acutis.

Flores; pallide flavescentes; hermaphroditi, pauciores, in disco centro, tubulosi, limbo 5 fido lacinis revolutis; feminei, multipli ci serie, semiflosculosi, filiformes, erecti circunstant.

Floret februario et martio in S. Jose del Corral ad ripas Huchueyapa.—Llav.

In honorem Emmanuelae Taboada, Marianni Abasolo dum inter vivos versabatur dignissimae conjngis, singulari erga patriam et maritum amore, virilique animi fortitudini et constantia inter mexicanas faeminas notissimae.

ABASOLOA.

Poligamia superflua. Flos radiatus. Receptaculum, paleatum. Floscula disci 4—dentati. Semina, papilla coronata. Pappus plenus uniformis.

A. TABOADA.

Caulis; 3 pedalis, ramosissimus, dichotomus.

Folia; opposita, linear-lanceolata, asperula, dentibus distans serrata.

Flores; solitarii, dichotomia inserti, longe pedunculati.

Calix; aequalis, ex foliolis constans 12–16 dupli circumpositis serie.

Flores; feminei; semiflosculosi, albi, numerosi, capillares, 2–3 serie bus collocati; hermaphroditici; concolores, tubulosi, 4 dentati, antheris et stylis flavis, vix ad os tubi pertingentibus.

Receptaculum; planum, paleis linearibus acutis, ciliatoserratis. Semina; tetragonoromboidea, apicis centro papilla umbilicata insignita.

GALEANA.

Poligamia superflua. Calix, 5 phyllus. Receptaculum nudum. Papus=o. Semina radii, ovata compressa, concava, marginata; disci prismatica.

G. HASTATA.

Caulis; herbaceus, procumbens, striatus, dichotomatosus. Folia; opposita, breviter petiolata, ut plurimum glabra, succulenta, nunc hastata, nunc sagitata.

Inflorescentia; duplex: in ramorum extremitate racemosa pedunculis brevibus; in inferiori parte, flores solitarii longe penduculati in dichotomia inserti.

Calix; 5 phyllus, foliolis equalibus carinatis. Flores; in disco 5 ut plurimum, hermaphroditi, flavi, tubulosi, 5 dentati.

Radius; albus ex tribus constans ligulis, brevissimis, bifidis. Receptaculum; nudum.

Semina; in radio, concava margine subdentato; in disco prismatica.

Habitat in satis S. Jose del Corral; florebat martio.—Llav.

ZEXMENIA [1].

Poligamia superflua. Flos radiatus. Calix, dupli foliorum ordini. Receptaculum paleaceum. Semina compressa marginata; disci, 2-aristata; radii, 3-aristata; inter aristulas coronula paleacea.

Z. SERRATA.

Frutex; sarmentosns, 12-pedalis et ultra, ramis oppositis, teretibus, pubescentibus.

Folia; opposita, sublanceolata, petiolata, margine serrato, utrinque aspera; juniora, subtus pubescentia.

Inflorescentia; terminalis, racemis. nec raro umbellulis disposita, floribus pedunculatis.

Calix; foliolis 10-12 dupli ordine positis, ovatis, apice revolutis.

Receptaculum; planum, paleis stratum carinatis, apice dilatatis.

Discus; aureus, multiflorus, tubis 5 dentatis.

[1] Inversis hic litteris Ximenez cognomen exhibetur, cum jam inter compositas Ximenesiae genus inveniatur.

Radius; 10-12 semiflosculis concoloribus, ovatis, emarginatis.
Semina; compressa margine in aristulas duas desinente, inter
 quas coronula peleacea.
Semina; radii ut plurimum aristis tribus.

Florebat martio in S. Jose del Corral ad vias.—Llav.

*Verbesinis affinis, sed ab his pappo habituque presertim quam
 maxime differt.*

EXMENIA [I]

Polygonum suberectum. Flos radiatus. Calix, duplex. Receptaculum, paleaceum. Perianthum, tubulatum.

X. SERPENTINA

*Virga; seminervosa 15-20 cm. et ultra, ramosa, obsoleta, ex-
 titera, hirsutissima.
 Vix; oblonga, supraelevata, petiolata, marginata, serrata,
 subundata, pubescens; lumen, supra, pubescens.
 Foliosae, foliolis 10-15 duplo longioribus, dentibus serratis, distantibus.
 Foliosae, foliolis 10-15 duplo longioribus, dentibus serratis, distantibus.*

*Examenia, ex parte receptaculi basi, costata, oblique
 levigata, subnudum, sanguinem et siccum. Thalamus
 levigatus, levigatus. Lacinia—tubus, levigata, levigata, levigata.*

HIDALGOA.

Polygonum, ex parte. Flos radiatus. Calix, duplex. Receptaculum, paleaceum. Perianthum, tubulatum.

ALDAMA.

Poligamia frustranea. Flos, radiatus. Calix, subimbricatus. Receptaculum, conicum, paleaceum. Semen, palea claustratum apice cucullata.

H. DENTATA.

*Caulis; procumbens, dichotomus, teres, inferiori parte striatus,
 Folia; opposita, petiolata, sublanceolata, utrinque aspera.
 dentibus serrata distantibus.*

Flores; ut plurimum solitarii, longe pedunculati, dichotomia inserti.

Calix; foliolis 12, dupli circumpositis ordine, interioribus latioribus, omnibus ciliatis.

Radius; aureus 8-10 semiflosculis linearibus, emarginatis.

Discus; concolor, tubis numerosis 5 dentatis.

Receptaculum; paleis obsitum flosculos amplexantibus.

Semina; clausa receptaculi paleis, corrugatis, costatis, apice eucullatis.

Florebat martio in inundatis rivuli Huehueyapa S. Josephi del Corral—Llav.

Folia superiora alterna nec raro linearis lanceolata.

AMAGIA

HIDALGOA.

Poligamia, necessaria. Flos, radiatus. Calix, duplex. Receptaculum, paleaceum. Pericarpium drupa.

H. TERNATA.

Caulis; volubilis, altissimarum arborum summitates attingens, easque undequaque venustissime vestiens.

Folia; opposita, longe petiolata, ternata, foliolis ovatis, crassiusculis, glabris, serratis.

Calix; exterior 3-4 phyllus; interior 5 fidus.

Flores; solitarii, longe pedunculati, axillis inserti.

Radius; 5 floribus, ligulis coccineo-aurantiacis, ovatis, tridentatis, stylis clavatis, nec revolutis.

Discus; flavus, multiflorus, tubis 5 dentatis, stylis concoloribus, simplicibus, abortientibus.

Receptaculum; planum, paleis stratum, floribus paullo majoribus, apice deauratis, obtusiusculis.

Pericarpium; drupa, ovata, compressiuscula, apice initio, auriculata, in maturitate forcipata.

Nux; ossea compressa, etiam ovata.

Florebat aprilii in margine densissimarum silvarum, prope ultimam cataractam fluminis Blanco, non longe à S. Jose del Corral.—Llav.