

Affinitas. Certe novum genus *Cyrtochilo* Humboldtii, parum affine.

Ethylogia. Diximus in memoriam *Cuitlahuatzin*, Reguli Iztapalapae, qui Mexicanos Hesperideos hortos maximo labore arboribus plantisque rarissimis exornare curavit.

36. CUITLAUZINA PENDULA.

Planta parasitics, formosa.—Bulbi ovati, depresso-tripollicares conferti foliiferi, ad vetustatem rugati, basi membranis induti: radiculae cylindraceae spongiosae, albicantes.—Folia bina lanceolata, coriaceo-membranacea, patentissima basi supra bulbos conduplicata (unum ab altero complexum).—Scapus radicallis teres, multiflorus extra bulbos natus, bracteis destitutus, pendulus. Flores magni, odoratissimi, alterni.—Perigonium candidum aut violaceum, punctis purpurinis diversimode variegatum. Labellum tum concolor, tum discolor ungula lutescenti, punctis coccineis miniata. Operculum alaque candidae.—Capsula ignota.

Habitat supra arbores juxta Jesus del monte prope Vallisoletum. Floret Junio et Julio.

XVII. ODONTOGLOSUM.

Perigonii folia quinque subaequalia patentia: labellum unguiculatum; unguis gynostemo basi aduatus; lamina reflexa, plana, dentibus carnosis instructa. Gynostemum apice alatum. Anthera terminalis operculata. Pollinis massae duas cereaceae pedi-

cello communi suffulta.—Herbae parasiticae bulbiferae. Scapus multiflorus. Flores magni spthellati.

(*Humboldt, nova gen. et sp. t. 1.*)

37. ODONTOGLOSSUM CERVANTESII.

O. bulbis ovatis ancipitibus confertis; foliis solitariis lanceolatis, basi attenuatis, bulbo innatis: scapo distiche vaginato; floribus longe pedunculatis, gynostemo alato.

Planta parasitica, habitu gracillima, odore grata.—Bulbi ovati, carnosii, lenticulares vel ancipites, pollicares, confertissimi, monopyllii (raro diphilii); radiculae spongiosae, vermiformes. —Folium unicum in singulo bulbo, lanceolatum laevigatum, basi attenuato-conduplicate, vix 4 pollicare, acutum, reflexum. —Scapus flexuosus extra bulbos natus, squamulis distichis spatheformibus vaginatus. Bracteae magnae membranaceae, ringosae, acutae.—Flores alterni, longe pedunculati, pedunculis ad insertionem incrassatis. Perigonium subcarnosum niveum, segmentis tribus externis lanceolatis, carinatis angustioribus, acutis; duobus internis ovatis, latis breviter acuminatis; omnibus venosis, mollissimis, maculis concentricis versus basim purpurinis aut sanguineis variegatis. Labellum concolor, ungula incrassata biloba lutescenti, dentibus duobus instructa punctisque maculata; lamina niveae cordata, nervosa, limbo undulato sublacerato.—Gynostemum columnare 3-gonum, elongatum prope rimam duabus auriculis subrotundis munitum. Stigma ovale concavum, amplificatum, glutinosum. Anthera opercularis deeidua. Pollinis massae duas pedicellatae. Operculum cucullatum album. —Capsula ventricosa, costis non prominentibus. Semina scobiformia.

Habitat in montibus prope Irapaeum, floretque vere.

Obs. Species omnium pulcherrima, sapientissimo Magistro D. D.
Vicentio Cervantes, Botanices Professori dicata.—L.

38. ODONTOGLOSSUM APTERUM.

O. bulbis ovatis depresso: foliis lato-lanceolatis nervosis conduplicatis; scapo tereti paucifloro; gynostemo aptero crasso.

Planta praecedenti simillima. Bulbi bipollicares et ultra, an- cipites, di-aut-triphilli: radiculis spongiosis.—Folia radicalia lato-lanceolata, nervosa, conduplicata, tum supra bulbos, tum extra bulbos nata scapum amplecentia, basi squamulis foliaceis praecincta.—Scapus teres paniciflorus, spathelis membranaceis vaginatus. Flores pedunculati, articulati. mollissimi.—Perigonium album; segmentis internis latioribus, maculis subrotundis purpurinis versus basim congestis variegatum. Labellum unguis carnosa bilobata, denticulis terminalibus incrassatis divergentibus: lamina petaloidea alba, limbo crenato, ad insertionem maculata.—Gynostemum columnare apice inflatum fovea cordiformi, glutinosa, aptera. Anthera praecedentis.—Capsula ignota.

Habitat supra arbores juxta Irapaeum, floretque Martio.

39. ODONTOGLOSSUM MACULATUM.

O. bulbis ovatis subancipitibus monophyilis; foliis lanceolatis conduplicatis; scapo elongato depresso multifloro; floribus bicoloribus maculatis; lamina labelli integra, cordata acuminata.

Planta parasitica.—Bulbi ovati elongati, subancipites mono-

phylli: radiculae ut in caeteris parasitis.—Folium unicum in singulo bulbo, lanceolatum, conduplicatum subcoriaceum, nervis longitudinalibus.—Scapus radicalis simplex elongatus depresso, floribus alternis, inodoris, resupinatis, spathelatis.—Perigonium bicolor, segmentis 3-externis lanceolatis, carinatis, castaneo-fuscis, acutissimis, duobus internis ovatis amplificatis, luridis, venosis paulo brevioribus; omnibus versus basim maculis ochreis diversimode variegatis. Labellum basi carnosum bi-auriculatum, denticulis duobus incurvis, lamina lutescenti, cordiformi, acuminata, maculata; limbo integro. Gynostemum alatum. Anthera praecedentium. Capsula oblonga, costis parum prominentibus.

Habitat supra arbores in montibus Irapaei, Jesus del monte prope Vallisoletum Floret Martio.

Obs. Characteribus memoratis addere possumus ut essentiales in hoc genere: 1. Segmenta interna perigonii ampliora. 2. Externa carinata acuta. 3. Gynostemum elongatum: 4. Stigma patens: 5 Scapus extra bulbos procedens.—L.

XIX. ONCIDIUM

Perigonii folia 5-subaequalia, patentia; labellum maximum ecalcaratum, basi tuberculatum (*cristatum*), planum, liberum. Gynostemum apice alatum. Anthera terminalis operculata. Pollinis massae duae, cereaceae pedicello communi affixae.—Herbae parasiticae, bulbiferae. Scapi radicales multiflori, paniculati, rarius pauci, aut uniflori.—Swartz.

(Humb. nova gen. t. 1.)

40. ONCIDIUM TIGRINUM.

O. bulbis ovatis ancipitibus; foliis lanceolatis bulbo innatis; scapo tereti simplici; floribus lamina labelli reniformi longe unguiculata.

Planaria parasitica; pedalis et ultra formosissima.—Bulbi ancipites ovati, obscure hexagoni 6-pollicares et ultra; foliolis membranaceis ad basim convolutis: radiculae spongioso-albantes.—Folia lanceolata, subcoriacea, laevigata, bina aut terna in sinuulo bulbo, basi conduplicata.—Scapus bipedalis, cylindraceus, purpureo-fuscus, incrassatus, extra bulbos natus; ad articulos squamulis membranaceis vaginatus. Flores tres, quinque, magni, alterni, speciosi, pellem tigrinam referentes, odore violae suavissimo.—Perigonum regulare patens, segmentis quinque lanceolato-ovatis lutescentibus, maculis tigrinis castaneo purpureis tota superficie variegatis; subtus carina virescenti, marginibus revolutis. Labellum maximum luteum, immaculatum, ad ortum lobulis duobus obtusis auriculae formibus; ungula convexa, margine etiam revoluta, obscure denticulata: lamina amplissima carnosa, reniformi, aut bilobata, emarginata, limbo undulato.—Gynostemum ventricosum, bi y auriculosum; auriculis basi subrotundis, apice acuminatis, foveam stigmatis post fecundationem claudentibus. Anthera opercularis decidua. Pollinis massae duas pyriformes, cavae cereaceae pedicello caliculato affixa.—Operculum petaloideum, loculare, cucullatum.—Capsula oblonga, 3-costata. Semina scobiformia.

Habitat in montibus Irapaei prope Vallisoletum Floret Novembri.—Vernacula Flor de muertos.

a O. tigrinum giganteum, scapo ramoso multifloro (Onc. altissimo Pers affinis.)—eum praecedenti.

b O. tigrinum elatum, scapo attenuato; floribus gracillimis prope Paracho.

41. ONCIDIUM FUNEREUM.

O. bulbis subrotundis depressis cogestis; foliis lanceolatis bulbo innatis; scapo tenuissimo elongato: floribus lamina labelli convexa, emarginata.

Parasitica supra arbores.—Bulbi lenticulares, subrotundi depressi, hyalino-virescentes, vix pollicares, diphylli: radiculae vermiformes albidae.—Folia lanceolata spithamea, basi conduplicata, bulbis adnata.—Scapus simplex longissimus, attenuatus bracteolis vel spathelis membranaceis brevissimis vaginatus. Flores alterni, gracillimi longe pedunculati.—Perigonum oliveum, segmentis subaequalibus patulis miniatis, apice reflexo. Labellum carnoseum luteum; lamina convessa emarginata; unguis prominentiis variis, denticulisve larvata.—Gynostemum capitatum, incrassatum, breve. Reliqua ut in praecedenti.—Capsula clavata, gynostemi rudimento crasso coronata, 3-valvis, obscure 6-gona.

Habitat in diversis locis hujus provinciae, praecipue juxta Irapaeum et Jesus-del-monte. Floret Novembri.

Obs. Michuacanenses accolae veluti ornamenta sepulchralia flores hujusce, et praecedentis speciei, jam inde ab antiquitate, ad nostra usque tempora adhibere consueverunt, hinc non incongrue eam funeream nominamus.—L.

a O. funereum bulbis 6-gonis, floribus bicoloribus, perig. segmentis inferioribus divergentibus arcuatis.

b O. funereum biflorum, labello difformi.—Supra arbores prope Vallisoletum.

42. ONCIDIUM HYALINOBULBOM.

O. bulbis lenticularibus subhyalinis; foliis linear-lanceolatis; scapo filiformi flexuoso; floribus insectiformibus resupinatis; lamina labelli lanceolata; gynostemo cuneiformi longe rostrato.

Planta exigua, parasitica.—Bulbi lenticulares subrotundi hyalino-virescentes, punctati, confertissimi: radiculae spongiosae filiformes.—Folia graminea linear-lanceolata, conduplicata, binata in singulo bulbo.—Scapus radicalis extra bulbos, filiformis, flexuosus, pauciflorus. Bracteolae membranaceae. Flores resupinati.—Perigonum membranaceum, subhyalinum, segmentis 5 lanceolatis subaequalibus marcescentibus. Labellum maximum luteum, carnosum 3-partitum, basi tribus auriculis tuberculosis prominentibus; lobulis lateralibus cuneatis subrotundis, intermedio ovato, acuminato, pendulo.—Gynostemum cuneiforme retroflexum. Anthera operculata. Pollinis massae duae ellipticae, filamento communi lateraliter affixae. Operculum calceiforme, 1-loculare, longe rostratum.—Capsula ignota.

Habitat supra arbores ad Acuitzium. Floret vere.

Obs. Istius plantae fructificatio singularis differt a praecedentibus.
An genus diversum? Cl. Humboldt Onc. ornithoriachum. huic similiuum, hic retulit.—L.

§. II. Parasitica, bulbis destituta;
Scapi in sinu folii vaginati.

XX. DENDROBIUM.

Perigonii foliola 5 patula; lateralia exteriora cum ungue labelli connata, calcar referentia. Labellum ecalcaratum, unguicula-

tum, cum gynostemo continuum: lamina articulata, Anthera terminalis operculata. Pollinis massae cereaceae.

A. *Dendrobia parasitica*

Caulescentia, folio terminali solitario.

Pollinis massae duae.

43. DENDROBIUM SCARIOSUM.

D. caule brevi unifolio; folio elliptico, limbo scarioso; scapis filiformibus in sinu folii congestis; segmentis externis perigonii latioribus concavis.

Planta parasita, exigua, caulibus plurimis brevisimis unifoliis fibrilis radicalibus spongiosis albanticibus; filamentis crispatis ex collo prodeuntibus, intertextis.—Folium unicum in singulo pede ovale aut ellipticum, carnosum, pagina superiori hyalinum, enervi; limbo scarioso lutescenti; scapus ad basim vaginans.—Spatha membranacea brevissima in sinu folii.—Scapi tres aut quatuor filiformes, flexosi, pauciflori; floribus secundis bracteolis suffulatis.—Perigonum segmentis 3-externis luteo-virescentibus, submembranaceis concavis: duobus lateralibus planis, niveis, linea longitudinali, limboque purpurascenti variegatis. Labellum 3-partitum purpureum.—Gynostemum depresso, incurvo, versus apicem amplificatum. Anthera operculata. Pollinis massae duae obovatae cereaceae. Operculum parvum uni-loculare.—Capsula oblongotriquetra, Semira pulveriformia.

Habitat supra arbores versus Arumbaro, floretque Octobri et Novembri.

44. DENDROBIUM RETUSUM.

D. caule elongato unifolio; folio lanceolato retuso; scapis plurimis in sinu folii fasciculatis.

Parasitica, habitu praecedentis.—Folium unicum lanceolatum carnosum, retusum, longitudinaliter sulcatum, limbo integro revoluto.—Scapi plurimi in sinu folii fasciculati, filiformes; floribus articulatis dilute purpureo-fuscis, subcalcaratis.—Capsula ignota.

Habitat in montibus Vallisoletō proximis supra arbores. Floret Januario.

45. DENDROBIUM QUADRIFIDUM.

D. caule elongato unifolio, folio cuneato-oblongo, racemis folio longioribus in sinu fasciculatis; perigonio 4-fido.

Planta parasitica, caulis plurimis aggregatis, seu polypoda.—Radices fibrillosoe vermiformes, spongiosae ut in caeteris orchideis.—Folium unicum in singulo pede, cuneato-oblongum carnosum, luridum, vaginans, planum, basi articulatum, limbo integerrimo.—Flores racemosi, secundi; racemis 2-3-5, spathella membranacea in sinu folii praecinctis. Scapi longissimi articulati, erecti, bracteolis acutis brevissimis vaginati.—Perigonum herbaceum lutescens, mollissimum, quadri-partitum, segmentis duabus externis amplificatis oppositis, apice reflexis; duobus lateribus sublinearibus erectis, acutis. Labellum 3-lobatum, carinatum, concolor; filo tenuissimo articulato-pendulum, mobile.—Gynostemum cylindraceum incurvum, antice planum. Fovea glutinosa ovata. Anthera opercularis decidua. Pollinis massae duas oblongo pyriformes apici gynostemi adglutinatae. Operculum uni-

loculare acuminatum, Capsula clavata 6-gona. Semina scobi-formia.

Habitat supra arbores versus Jesus del monte, propé Vallisole-tum. Floret Septembri.

Obs. Species vere nova. Flores odorem citrinum vespere expi-rant.—L.

PARS IV.

Rinemospermae Michuacanae, nondum satis notae.

I. RINEM-BULBIFERAE.

46. EPIDENDRUM? TURBINATUM.

E. bulbis oblongo-turbinatis confertis, membranis lacera-tis praecinctis, scapo ex bulbis prodeunte, foliis linear-lanceolatis coriaceis bulbo adnatis.

Flores nondum explicati. Vidi eam supra arbores prope Arium in provincia Michuacana.

47. PACHIPHILLUM? UNIFLORUM.

P. bulbis turbinatis unifloris, segmentis perigonii subrotundis.

Planta parasitica repens.—Bulbi oblongi, turbinati, graciles, foliis destituti.—Folia ...—Scapus 2-pollicaris, uniflorus. Flos magnus pedicello articulato.—Perigonum dilute roseum, segmentis 3 externis subrotundis; 2 internis angustis, obtusis. Labellum ovatum, dilatatum, pendulum, ad insertionem sulcatum, ungula macula purpurina notata.—Gynostemum carinatum, obtuse 3-gonum, alatum, antice punctis ochreis variegatum. Anthera operculata, decidua. Pollinis massae quatuor?—Capsula ignota.

Vidi eam floridam mense Junio, absque foliis in via Irapaei supra arbores.

48. EPIDENDRUM? (MAYZIFOLIUM) MACROBULBON.

E. bulbis fusiformibus pedalibus, articulatis: foliis distichis, ensiformibus, trinerviis.

Planta parasitica.—Bulbi pedales fusiformes, articulati, rugati, membranis imbricatis adolescentia tecti.—Folia 8-9 in sinuulo bulbo, ensiformia, disticha, 3-nervia, elongata, quodammodo Zeae Mayzii simillima. Reliqua ignota.—Habitat supra arbores, prope Turicato in regione calida provinciae Michuacanensis Floret....

Obs. Haec Orchidearum peregrina species, omnium rarissima, ad hortos vallisoletanos translata, nondum, florescit.

2. RINEMOSPERMAE BULBIS DESTITUTAE.

49. DENDROBIUM? ALOIDEUM.

D. foliis carnosis triquetris, scapo in sinu foliorum vaginato.

Parasitica supra arbores prope Arrium. Flores ignoti.
Amatzauhli sp.? (V. Hern. t. I. p. 169. ed. Matrit.)

50. DENDROBIUM? BRACTEATUM.

D. caule elongato polyphyllo; foliis distiche vaginantibus linearibus; scapo terminali paucifloro, bracteis concavis subrotundis, magnitudine florum.

Parasitica graminearum habitu.—Caules plurimi elongati, articulati, tenuissimi.—Folia vaginantia disticha, lineari-lanceolata, longissima nervosa, apice obtusa.—Scapus terminalis brevis, incurvus.—Flores roseii, bracteis magnis concavis alternis cincti.

Habitat supra arbores, prope Paracho. Floret Octobri.

Obs. Labello differt ab Isochyo grami folio Humboldti.



