de 1,400,000 à 16,000 kilogr., et encore, au lieu d'espèces recherchées, n'était-ce plus qu'un hainage grossier et du pire et le plus bas. Pendant le temps que les colons de nos Antilles laissaient ainsi volontairement se tarir cette source de richesses, quelques émigrés de Bahama, qui avaient été chercher des semences à la Guadeloupe, importaient la culture du *coton* Géorgie dans la Caroline du Sud et les îles du littoral. Telle est l'origine du fameux *coton sea-island* ou *Géorgie longue soie*, un des plus grands éléments de la fortune des Etats-Unis, dont la production atteint maintenant le chiffre de 4,500,000 kilogr., et qui se vend de 8 à 12 fr. le kilogr. Mais la nature a imposé elle-même des limites à cette production ; les qualités si recherchées du *sea-island* dégénèrent et disparaissent même à une lieue ou deux dans l'intérieur des terres ; la brise maritime est nécessaire à cette espèce, et cela explique pourquoi nos Antilles sont éminemment propices à sa culture. La production de l'espèce si recherchée du *Géorgie longue soie* étant limitée et ne pouvant, en Amérique, s'étendre davantage, puisque les Antilles se trouvent dans des conditions exceptionnelles et éminemment favorables à cette production, il est à désirer que la culture du *coton* y prenne la plus grande extension. Du reste, l'administration a fait tous ses efforts pour engager les colons dans cette voie, et elle a pris des mesures pour assurer aux planteurs un débouché à des produits qui doivent un jour être pour les Antilles françaises l'élément principal de leur richesse agricole et de leur commerce maritime.

Le *coton* croît spontanément au Sénégal, où il est utilisé par les indigènes dans la fabrication des tissus qu'ils consomment. Pour devenir l'objet d'un commerce d'exportation, il ne manque à ce *coton* (variété courte soie) qu'une culture plus soignée, qu'une exportation plus intelligente. En présence des efforts que les Anglais font dans leurs établissements de la côte d'Afrique pour créer une industrie cotonnière, on se demande pourquoi l'industrie et le commerce français, qui possèdent dans nos établissements du Sénégal les éléments de cette culture, ne font pas des efforts plus soutenus pour la propager, l'étendre et la perfectionner.

L'industrie cotonnière rentre peu à peu dans les conditions qui faisaient autrefois sa vie et sa sécurité. Aujourd'hui déjà, ce sont les Etats-Unis qui redeviennent, comme avant la guerre, le marché régulateur. Tout semble concourir à une prompte réorganisation du travail dans les plantations. Le déficit de la main-d'œuvre se comble chaque jour par l'arrivée des travailleurs du Nord, et l'émigration européenne, à l'heure qu'il est déjà, va seconder *cette reconstruction* agricole, non moins intéressante que la *reconstruction politique*. Pendant que, de l'autre côté de l'Atlantique, on pousse à la culture du *coton* avec l'énergie propre au tempérament américain, de ce côté-ci les circonstances redeviennent décidément favorables au travail manufacturier. Ainsi la belle matière textile et les produits fabriqués, la facilité avec laquelle ils s'écoulent aux prix actuels, le retour de la consommation à ces articles longtemps dédaignés ; enfin, la mise que laissent aux fabricants les cours de la matière première : tout semble promettre à l'industrie cotonnière la fin d'une situation qui n'avait pas laissé d'être menaçante jusqu'aux derniers temps.

Comme on l'a déjà vu, le *coton* est l'une des grandes causes du développement industriel de l'Angleterre. C'est pour subvenir aux divers besoins de ses filatures et de ses manufactures qu'elle a creusé son sol, créé ses industries houillère et métallurgique et construit tant de navires. En 1767, deux ans avant l'invention d'Arkwright, l'Angleterre, qui a aujourd'hui 18 millions d'habitants, en avait à peine 7. Le produit moyen de sa récolte de blé était de 11 millions d'hectolitres, le salaire de ses ouvriers des champs et des petits bourgs était en moyenne de 1 shilling (1 fr. 25), le revenu annuel de la Grande-Bretagne ne dépassait pas 9 millions sterling (225 millions de francs), et cependant, dit Jeunes, « l'Angleterre, alors comme aujourd'hui, possédait tous les éléments matériels qui ont contribué si largement au développement de sa grandeur et de sa richesse. Elle avait, comme aujourd'hui, un climat tempéré, un sol fertile, de belles rivières, des ports spacieux, de riches mines de charbon, de fer, d'étain, de cuivre et d'autres minerais nécessaires au succès des entreprises industrielles ; mais il fallait une baguette enchantée pour transformer ces richesses inutiles en source de vie et de prospérité, et la fée bienfaisante qui opéra ce changement merveilleux se servit simplement d'un délicat linéament de *coton*. Cette prospérité a été, ainsi que nous l'avons dit, fortement ébranlée par la crise cotonnière de 1862 et 1863. Fort heureusement cette crise est aujourd'hui du domaine de l'histoire. Toutes les manufactures qui lui ont survécu ou qui ont été créées depuis sont actuellement en pleine activité. Ce n'est plus le *coton* qui leur manque, mais bien la main-d'œuvre. Fait remarquable, les ouvriers des manufactures, qui, en 1862 et 1863, étaient si effroyablement abandonnés, étaient devenus rares en 1866, au moins dans quelques districts. Bon nombre des ouvriers inoccupés pendant la crise ont émigré ; bon nombre ont changé de comté et d'occupation. Ils ont demandé du travail aux autres industries textiles, à la construction des navires, et même au métier de manœuvre. Mais ces vides momentanés faits dans la population de 4 à 5 millions d'individus qui vivaient, en 1860, de l'industrie du *coton*, sont en voie de se combler. Les salaires étaient, au commencement de 1867, d'un tiers plus élevés qu'en 1860 ; à cette même époque, la consommation de matières brutes par les manufactures avait repris son niveau de 1860. Si les quantités ouvrées étaient moins considérables qu'avant 1860, la valeur de ces mêmes quantités était beaucoup plus élevée dès 1865. La valeur des exportations en fils et tissus, qui, en 1860, était de 52 millions sterling, atteignait en 1865 le chiffre de 56 millions sterling. En 1866, la progression a été très-grande, d'après les états de douane, pour les onze premiers mois. La valeur de ces exportations s'élevait à 66 millions sterling, savoir : filés, 12 millions sterling ; tissus, 54 millions. Selon toute probabilité, cette valeur, pour l'ensemble de l'année, dépasse 72 millions sterling (1,800 millions de francs).

En **France**, l'industrie du *coton* a perdu beaucoup moins importante qu'en Angleterre, tient cependant une très-grande place. D'après le recensement de 1861, fait un an avant la guerre de sécession, elle occupait directement plus de 500,000 individus, tant ouvriers qu'employés et patrons, c'est-à-dire que 1,200,000 bouches lui devaient leur nourriture. L'infériorité de l'industrie cotonnière française vis-à-vis de l'industrie anglaise, est due en partie aux difficultés qui ont entravé ses premiers pas. Le régime impérial lui fut très-peu favorable ; la restauration lui fut hostile. Frappée de droits presque prohibitifs. Sous la Restauration, l'industrie linière demanda et fut sur le point d'obtenir qu'on lui en fît le sacrifice. Echappé à grand'peine à ces exigences, le *coton* eut à supporter des droits de 40 à 55 fr. pour 100 kilogr. En 1836, ce droit fut réduit à 20 fr. Sous ce nouveau régime, l'industrie du *coton* se fit une place assez grande ; chaque année voyait s'accroître le chiffre des matières premières qu'elle demandait à l'étranger, à l'Amérique surtout. En 1861, au commencement de la guerre d'Amérique, ces importations montaient à 183 millions de kilogr. Dans cette même année, les fabrications dépassèrent 1,100 millions de mètres, estimés plus de 600 millions de francs. Bien que le régime fiscal existant depuis 1836 fît payer à cette industrie environ 20 millions de francs par an sur ses matières premières, comme elle était protégée contre la concurrence étrangère par des prohibitions à l'égard des tissus et par des tarifs protecteurs très-élevés sur les files, elle prospérait. Il y a donc fallu former successivement toute cette population, et il y a bien loin d'un ouvrier qui est né dans un atelier et qui y a passé sa vie à faire le même travail, à un homme déjà âgé que l'on prend pour en faire un ouvrier. Enfin il y a la conscription, dont les manufacturiers ressentent les effets tous les ans. On forme des ouvriers pour le *self-acting* depuis l'âge de douze ou de quinze ans, et, quand ils arrivent à vingt ans, la conscription enlève les plus vigoureux. Ces jeunes gens font leur temps, et la plupart l'industrie cotonnière ne les voit plus dans ses ateliers. » De l'aveu du même industriel, les enfants ou les jeunes filles de quinze, dix-huit ou vingt ans conduisent mieux que personne les métiers mécaniques à tisser. C'est là surtout la supériorité des ouvrières anglaises, qui font en dix heures l'ouvrage que les ouvrières françaises mettent douze heures à exécuter. C'est à ces différences dans la durée du travail que tient le principal débouché. L'Algérie est notamment un des grands débouchés de l'industrie rouennaise. Les Algériens viennent acheter eux-mêmes à Rouen et à Darnétal, et remportent ensuite les produits rouennais jusque dans l'intérieur de l'Afrique.

En Alsace, la filature et le tissage sont à peu près, vis-à-vis de l'industrie anglaise, dans les mêmes conditions d'infériorité qu'en Normandie. Elles ne peuvent pas non plus travailler aux mêmes conditions que la filature et le tissage suisses, qui luttent avec succès contre l'Angleterre. Cette infériorité de l'industrie française vis-à-vis de l'industrie suisse tient à trois causes : 1° les frais généraux, tels que contributions et autres qui sont à meilleur marché qu'en France ; 2° les chutes d'eau, à la condition d'être constantes, sont d'un secours considérable et en Suisse, on en trouve de semblables presque pour rien ; 3° la main-d'œuvre réduite à prix de revient moyen de travail avec des ouvriers valant les ouvriers français, puisqu'ils font autant de besogne qu'eux par heure. En résumé, en Suisse la filature travaille à 10 fr. par broche et par an, tandis qu'en Alsace on travaille à 16 fr. La plupart des industriels entendus dans cette enquête se sont efforcés de faire ressortir sous toutes leurs faces les différences qui existent entre l'ouvrier français et l'ouvrier anglais. Voici les parties les plus saillantes de ces déclarations : « L'ouvrier anglais, dit M. Boigeol-Japy, filateur et tisseur à Giromagny (Haut-Rhin), est ouvrier toute sa vie, il s'y resigne. Comme il se nourrit bien, il a par conséquent besoin d'un gros salaire, et il travaille en conséquence. » En Alsace, l'ouvrier ne travaille en moyenne que six à sept ans ; les hommes enlevés par la conscription reprennent rarement leurs métiers. Les jeunes filles une fois mariées quittent l'atelier. Les ouvriers sont presque tous petits propriétaires. Industriellement parlant, c'est fâcheux ; au point de vue social et politique, c'est admirable. La nécessité ne les contraint pas autant à travailler que les ouvriers qui n'ont rien ou qui, habitant les villes, ont plus de besoins. » M. Straszewicz, dans cette comparaison entre les ouvriers des deux nations, a été encore plus explicite. Il y a, a-t-il dit, dans l'ouvrier anglais des qualités qui manquent à l'ouvrier français. L'ouvrier anglais est né dans la manufacture ; il y reste jusqu'à la mort, laissant à ses enfants une tradition qu'ils feront rarement : quelle différence avec les frères, pour lesquels la manufacture n'est qu'un pis-aller et qui préfèrent toujours l'indépendance qu'ils trouvent dans les travaux des villes et des campagnes ! On doit tenir compte de cette énorme différence, en comparant le coût de la main-d'œuvre dans les deux pays. En Angleterre, l'ouvrier coûte cher, mais il produit beaucoup et avec entrain. En France l'ouvrier fait sa journée. Sans doute l'intelligence et l'adresse des ouvriers français ne le cèdent en rien à celles des ouvriers anglais, mais ces qualités, essentielles dans les industries de goût et de luxe le sont moins dans les filatures, où il faut avant tout surveillance active, soins et forces physiques ; cette différence se traduit en chiffres ; il en résulte en effet que la main-d'œuvre française, tout en étant meilleur marché par homme, revient plus cher par kilogramme. Toutes les causes d'infériorité ne peuvent être compensées par notre intelligence et notre énergie. Les chiffres sont là avec leur éloquence incontestable. Selon M. Loyer, filateur à Lille, les ouvriers anglais, étant en général plus forts et plus intelligents, n'ayant jamais eu depuis leur enfance que le genre de travail auquel ils sont employés dans chaque filature, sont devenus d'une habileté telle qu'ils font dans un temps moindre beaucoup de travail que les nôtres. Les fileurs peuvent notamment conduire un nombre beaucoup plus considérable de broches. Cette infériorité de l'ouvrier français, M. Théodore Barrois en a nettement attribué la cause à la conscription. « La conscription, a-t-il dit, outre l'inconvénient qu'elle a d'interrompre la carrière d'un ouvrier et de lui faire perdre en grande partie le prix de son apprentissage, l'empêche, pendant cet apprentissage, de développer la plus grande somme possible d'activité et d'intelligence, afin de devenir plutôt un ouvrier accompli. Son patron lui-même sait qu'il est exposé à le perdre à l'âge de vingt ans, et il n'est pas encouragé à lui donner en perspective l'avancement vers lequel l'ouvrier anglais fait chaque jour un nouveau pas. Les fabricants anglais se sont, au contraire, préoccupés de rehausser l'intelligence des ouvriers français. « Il n'est nul pays, ont-ils dit, qui ait autant de goût que la France, aussi bien pour la disposition des dessins que pour l'harmonie des couleurs, qualités essentielles dans les industries du tissage, de l'impression et de la broderie. » Quelques industriels français, moins pessimistes que ceux que nous avons cités plus haut, ont avoué que les causes d'infériorité des ouvriers français n'étaient pas irrémédiables, et qu'il ne fallait qu'adopter les procédés industriels des Anglais. L'industrie française énumérait encore d'autres causes de son infériorité, tels que frais d'établissement plus coûteux, combustible quatre ou cinq fois plus cher, marché restreint pour l'approvisionnement, cherté du chauffage, de l'éclairage et des réparations, frais de transports plus élevés, capitaux plus chers et plus rares, division des fortunes. En vertu de toutes ces considérations, elle demandait à être protégée par des droits et *valeurs* de douanes d'une plaque de fonte chauffée au rouge, ou sur une flamme suffisamment chaude et pure, comme celle de l'hydrogène très-carboné ou celle de l'esprit-de-vin.

Le grillage à la plaque offre plusieurs inconvénients qui l'ont fait abandonner généralement. La première idée du grillage au moyen de la flamme du gaz appartient à Morlard, ancien directeur du Conservatoire des arts et métiers ; mais elle n'a été mise à exécution qu'en 1817, par Samuel Hall, mécanicien anglais. Cet appareil consiste essentiellement en deux tubes de cuivre, percés d'une multitude de trous sur leur partie supérieure. Ces tubes, placés horizontalement à peu de distance l'un de l'autre, sous une hotte faisant fonction d'aspirateur, reçoivent le gaz d'un réservoir. Le gaz s'échappe par les trous des tubes, et, lorsqu'on l'enflamme, il se produit deux lignes de feu sur lesquelles on fait passer rapidement les toiles qu'il s'agit de roussir. L'appareil de Hall fonctionne avec une rare perfection ; malheureusement il est d'un prix assez élevé. Il est employé à Rouen, chez MM. Cotte frères, Scheuchler, de Creveld, qui avait imaginé avant Hall une lampe à huile pour griller les toiles ; mais cette lampe avait plusieurs inconvénients inséparables de l'emploi de l'huile et des mèches. Descroizilles fils a pris, en 1826, un brevet pour la substitution de l'esprit-de-vin au gaz de la houille, et ce mode de grillage a été adopté dans beaucoup de fabriques, comme plus commode et moins coûteux.

Rien ne surprend plus les personnes étrangères à l'industrie que de voir des tissus aussi légers que nos calicots, nos mousselines, traverser une ligne de feu sans être brûlés. Cet étonnement cesse dès que l'on sait que la fibre ligneuse est un très-mauvais conducteur de la chaleur. En effet, qu'on présente un fil de *coton* à la flamme d'une bougie, il y a aussitôt une scission nette, et l'inflammation qui a lieu d'abord, loin de se propager dans la longueur du fil, ne tarde pas à s'éteindre. C'est en raison de cette propriété non conductrice de la fibre végétale, qu'une toile qu'on grille n'éprouve aucune altération dans ses fils, tandis que le duvet seul, qui recouvrait sa surface, est entièrement consumé par la flamme.

Depuis quelques années, les fabricants d'indiennes ont abandonné le roussi pour le remplacer par l'emploi de tondeuses peu différentes de celles qui servent à tondre les draps. Ces machines enlèvent très-bien le duvet des toiles et fonctionnent avec plus d'économie que les appareils précédents.

COTONAL s. m. (ko-to-nal — rad. *coton*). Hist. Magistrat qui avait été établi dans les Indes françaises, pour juger les affaires criminelles. Il devait son nom à cette circonstance que le coton est la principale production du pays.

COTONAQUE s. f. (ko-to-na-ke). Antiq. gr. Vêtement que portaient les femmes esclaves, et dont le bord inférieur était garni de peau.

COTON-CORDONNET s. m. Comm. Coton à coudre auquel le retors est donné dans le sens contraire du tors des fils simples.

COTONÉA s. m. (ko-to-né-a). Bot. Ancien nom du cognassier.

COTONÉASTRE s. m. (ko-to-né-a-stre — du fr. *coton*, et de la désinence péjorat. *astre*). Bot. Genre d'arbrisseaux, de la famille des rosacées, tribu des pomacées, voisin des néfliers, et comprenant quatre espèces qui croissent dans les régions montagneuses de l'Europe et de l'Asie.

COTONINE, COTONIS. V. COTONNINE, COTONNIS.

COTONNADE s. f. (ko-to-na-de — rad. *coton*). Comm. Etoffe de coton, et particulièrement étoffe fabriquée avec de coton écru avant d'être tissée : COTONNADE *bleue*. Cotonnade *rayée*. COTONNADE *à carreaux*. *Une robe, un tablier de* COTONNADE. *La fabrication de la* COTONNADE *en France remonte à une époque très-reculée. L'industrie de Briançon consiste en fabriques de bonneteries, de* cotonnades *et d'objets de quincaillerie.* (M.-Brun.)

COTONNANT (ko-to-nan) part. prés. du v. Cotonner : *On corrige les formes du corps en* COTONNANT *les vêtements.*

COTONNANT ANTE adj. (ko-to-nan, an-te — rad. *coton*). Techn. Se dit des lames de cuivre sur lesquelles on aperçoit des points blancs, semblables à des flocons de coton : *Lames* COTONNANTES. *Cuivre* COTONNANT.

COTONNE s. f. (ko-to-ne — rad. *coton*). Comm. Etoffe de coton de qualité commune, ordinairement tissée par l'armure taffetas, quelquefois cependant croisée et tissée par l'armure serge, dont on fait des robes, des jupons, des tabliers, quelquefois des pantalons à l'usage des ouvriers et des gens de la campagne : COTONNE *unie*, *rayée*. COTONNE *quadrillée*, *à carreaux*. ‖ On l'appelle aussi COTONNETTE.

COTONNÉ ÉE (ko-to-né) part. passé du v. Cotonner. Garni, rempli de coton : *Gilet* COTONNÉ. *Manches* COTONNÉES.

— Couvert d'un poil ou d'un duvet semblable à du coton : *Son menton est* COTONNÉ, *il est donc fils d'un homme d'Europe.* (Voit.) *Les tiges et les feuilles de cette plante sont plus ou moins colorées de purpurin, mais blanches et* COTONNÉES *à leur naissance.* (Tournefort.)

— Flocconneux et blanc comme le coton : *Le ciel était fort brouillé, et la lune était couverte de nuages* COTONNÉS, *qui empêchaient de voir bien distinctement ses taches.* (De La Hire.)

— Néol. Rembourré, adouci, amolli : *Il paraissait rond et facile, tant sa finesse était* COTONNÉE *d'embonpoint.* (Balz.) *Dinah se heurta contre une âme de bronze* COTONNÉE *des manières les plus douces.* (Balz.)

— *Cheveux cotonnés*, Cheveux courts, frisés et crépus.

— Mar. *Voile cotonnée*, Voile fort usée.

COTONNER v. a. ou tr. (ko-to-né — rad. *coton*). Garnir, remplir, bourrer de coton : COTONNER *un habit, le dos, les manches d'un habit.* COTONNER *un jupon.* COTONNER *une courte-pointe.*

— Par anal. Couvrir de poil follet ressemblant à un duvet : *Quelle est la main qui revêt les oiseaux et* COTONNE *les fruits?*

Mais quand la puberté, qui les rend plus nerveux, Eut d'un léger duvet cotonné leur visage...

DESAINTANOR.

— Techn. En termes de fleuriste artificiel. Garnir un fil de fer de coton cardé.

— v. n. ou intr. Se dit des étoffes qui se couvrent d'une sorte de bourre : *Du drap qui* COTONNE, *qui commence à* COTONNER.

Se cotonner v. pr. Se couvrir d'un duvet cotonneux, en parlant des étoffes : *Le drap d'Espagne est sujet à* SE COTONNER. ‖ Se couvrir de poil follet ou d'une autre matière semblable à du coton : *Son menton, ses joues* SE COTONNENT. *Certains végétaux* SE COTONNENT *pour se protéger.*

— Hortic. Se dit des fruits, des légumes dont la pulpe, la substance, devient mollasse et spongieuse : *Des navets, des poires, des pommes qui* SE COTONNENT.

COTONNERIE s. f. (ko-to-ne-ri — rad. *coton*). Agric. Culture du coton : *S'occuper de* COTONNERIE. *S'entendre à la* COTONNERIE. ‖ Terrain planté de cotonniers : *Visiter une* COTONNERIE. *Bien que cette* COTONNERIE *fût la plus importante de l'île, il était facile de voir que l'œil du maître lui faisait défaut.* (Roger de Beauv.)

COTONNETTE s. f. (ko-to-ne-te — rad. *coton*). Comm. Sorte d'étoffe de coton. V. COTONNE.

COTONNEUX, EUSE adj. (ko-to-neu, eu-ze — rad. *coton*). Recouvert d'une sorte de duvet semblable au coton : *Tige* COTONNEUSE. *Feuilles* COTONNEUSES. *La peau des coings est toujours plus ou moins* COTONNEUSE. *Le bourgeon* COTONNEUX *du pommier s'enfle et se crève.* (B. de St-P.) *Les pêches des espaliers sont velues et comme* COTONNEUSES. (Raspail.)

— Par anal. Qui est disposé en flocons : *Des nuages* COTONNEUX.

Et l'on voit dans l'estompe
Du brouillard *cotonneux*,
Si loin que l'œil s'y trompe,
Madrid, point lumineux.
TH. GAUTIER.

— Fig. Mou, flasque, sans vigueur : *Style* COTONNEUX.

— Hortic. Se dit des fruits et des légumes dont la pulpe est devenue mollasse et fade : *Poires* COTONNEUSES. *Navets* COTONNEUX. *On dit qu'un fruit est* COTONNEUX *lorsqu'il est pâteux et sans goût.* (Rozier.)

— **Antonymes.** Glabre, lisse, uni.

COTONNIER s. m. (ko-to-nié — rad. *coton*). Bot. Genre de plantes, de la famille des malvacées et de la tribu des hibiscées, comprenant une douzaine d'espèces, originaires des régions chaudes des deux continents, et qui sont remarquables par le coton qui enveloppe leurs graines. Les espèces de ce genre sont : *Rien de plus difficile qu'une détermination précise du nombre des espèces de* COTONNIERS. (F. Gérard.) *La culture du* COTONNIER *a pris naissance dans l'Inde.* (P. Madinier.) Le COTONNIER *ne saurait croître, comme la vigne, sur les rochers et parmi les pierres.* (Dutour.)

— Nom donné à des végétaux appartenant à divers genres. ‖ *Cotonnier de Jéan*, Nom vulgaire d'une espèce de bombax ou fromager. ‖ *Cotonnier de Mahot*. Nom vulgaire de la ketmie filiacée. ‖ *Cotonnier de Mapou*, Nom vulgaire du bombax céiba. ‖ *Cotonnier sifleur*, Nom vulgaire de plusieurs espèces de ketmies.

— **Encycl.** Le genre *cotonnier* comprend des arbres, des arbrisseaux et des herbes vivaces, quelquefois annuelles, formant une douzaine d'espèces. La propension du *cotonnier* à varier est telle que suivant plusieurs auteurs, notamment Lamarck, qui en a fait l'histoire la plus complète, les individus, dans aucune des espèces admises, n'offrent de constance dans les découpures des feuilles et des involucelles, dans les stipules, les glandes, les poils, les taches, la durée, la couleur des fleurs et des graines, caractères sur lesquels les espèces ont cependant été fondées. Ajoutons que ces espèces peuvent être d'autant moins différentes entre elles que le genre lui-même est plus naturel. Tous les *cotonniers* paraissent originaires des régions voisines de l'équateur ; mais ils entrent, à s'en croire l'espèce la plus large zone, car ils sont cultivés en grand à Pékin, par 41° de latitude nord ; ils ont été portés, d'après le témoignage de Gmelin, à 4 degrés plus au nord sur les rives de la Kouma, dans le voisinage de la mer Caspienne. Humboldt pose, comme limites de température au-dessous desquelles cesse le climat favorable au *cotonnier* herbacé, espèce qui, par sa nature, doit le moins redouter le froid, une chaleur moyenne de 22 à 24° centigrades en été, et de 7 à 9° en hiver. Dans les régions équatoriales, le *cotonnier* est cultivé dans des contrées situées jusqu'à une hauteur de 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Dans l'Himalaya, entre le Gange et la Jumna, de 28 à 30° de latitude, Royle en a vu quelques pieds, cultivés pour la consommation locale, à une hauteur de 4,000 pieds. Le centre principal de la culture du coton longue soie, dans les Carolines, est dans les environs de Charleston, entre cette ville et Savannah (Géorgie) au sud, et Georgetown (Caroline du Sud) au nord. On peut donc prendre le climat de cette ville (lat. 32° 46' N.) comme point de départ et comme type favorable à la végétation du *cotonnier*. Là on sème dans les premiers jours d'avril, les balles entrent en maturité vers la fin d'août et le commencement de septembre, et la récolte se continue très-tard jusqu'en novembre, quelquefois même jusqu'en décembre. La limite de la culture du coton sur le littoral des Etats-Unis est à peu près vers 37° de latitude, non loin de Richmond, en Virginie ; mais elle y est très-incertaine, et n'a du reste qu'une importance tout à fait secondaire. Dans la Caroline du Nord, elle n'a pas plus d'extension, quoique le climat soit plus favorable. En résumé, on peut conclure que le climat le plus favorable à la production du coton sera celui qui fournira à la plante une quantité de calorique au moins égale à celle qu'il trouve là où sa culture réussit le mieux. En outre, il devra présenter cette circonstance, qu'à partir de l'époque de la première cueillette, il s'écoulera encore une période de deux ou trois mois sans froids, ni pluies diluviennes, afin que le *cotonnier* puisse donner de nouvelles fleurs et les amener à maturité.

Quelques botanistes, se fondant sur la grande ressemblance des *cotonniers* entre eux, et sur l'instabilité de leurs caractères, les ont considérés comme de simples variétés d'une seule et même espèce primitive, que les migrations et la culture ont modifiée de différentes manières ; mais cette opinion n'a pas prévalu. En conséquence, il est nécessaire d'exposer ici en abrégé les caractères par lesquels la majorité des botanistes distinguent les principales espèces de *cotonniers* qu'ils admettent.

1° *Cotonnier herbacé* (*gossypium herbaceum*, L.) : tiges rougeâtres, herbacées et hautes de 2 pieds dans les climats tempérés, ligneuses et hautes de 4 à 6 pieds dans les régions tropicales ; rameaux, pétioles et pédoncules velus, fréquemment ponctués de noir ; feuilles molles, pubescentes, assez grandes, moins longues cependant que leur pétiole, ordinairement munies d'une glande à leur face inférieure, sur leur nervure médiane, et divisées en trois ou plus généralement en cinq lobes larges, arrondis et mucronés dans les variétés herbacées, sublancéolés et aigus dans les variétés ligneuses ; stipules lancéolées ; involucelle plus ou moins profondément denté en scie ; pétales arrondis, crenelés, longs de 2 ou 3 pouces, d'un jaune clair, avec une tache pourpre près des onglets ; stigmates soudés ; graines au nombre de cinq environ dans chaque cellule, revêtues d'un duvet grisâtre qui y adhère fortement, et que recouvre un coton blanc et court. Cette espèce est celle dont la culture est la plus répandue dans l'Inde et dans le bassin de la Méditerranée.

2° *Cotonnier arborescent* (*gossypium arboreum*, L.) : tiges hautes de 15 à 20 pieds, rameaux et pétioles velus, d'une teinte rougeâtre ; feuilles velues, d'un vert foncé, ponctuées de noir, munies d'une glande ou quelquefois de trois, à lame plus longue que le pétiole, et à trois ou cinq lobes allongés, lancéolés, ordinairement terminés par une courte soie ; stipules subulées ; pédoncules courts ; folioles de l'involucelle entières ou quelquefois dentées ; pétales d'un rouge brun, roux à la base ; capsules de la grosseur d'une aveline, graines recouvertes d'un duvet verdâtre et enveloppé d'un coton fin, soyeux, d'un blanc jaunâtre, plus estimé que celui de l'espèce précédente. Le *cotonnier arborescent* croît dans les lieux sablonneux de l'Inde, en Egypte, en Arabie, dans les îles Célèbes.

3° Le *cotonnier religieux* (*gossypium religiosum*, L.), arbuste de 3 à 4 pieds de haut, fournit un coton ordinairement jaune, qui paraît être celui avec lequel se fabrique le nankin, et qu'on récolte dans l'Inde, en Chine et dans le royaume de Siam.

4° Le *cotonnier hérissé* ou *velu* (*gossypium hirsutum*, L.) porte des graines nombreuses, libres, recouvertes d'un duvet vert qui y adhère fortement et d'un coton soyeux, fin et long ; il est fort estimé et fort répandu dans les îles de l'Amérique, où il est indigène.

5° Le *cotonnier de la Barbade* (*gossypium barbadense*, L.) a au contraire des graines noires, sans duvet, revêtues seulement d'un coton long et fin, qu'on peut facilement en séparer. Suivant Swartz, c'est l'espèce la plus large zone, car ils sont cultivés en grand à Pékin, par 41° de latitude nord ; ils ont été portés, d'après le témoignage de Gmelin, à 4 degrés plus au nord sur les rives de la Kouma, dans le voisinage de la mer Caspienne. Humboldt pose, comme limites de température au-dessous desquelles cesse le climat favorable au *cotonnier* herbacé, espèce qui, par sa nature, doit le moins redouter le froid, une chaleur moyenne de 22 à 24° centigrades en été, et de 7 à 9° en hiver. Dans les régions équatoriales, le *cotonnier* est cultivé dans des contrées situées jusqu'à une hauteur de 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Dans l'Himalaya, entre le Gange et la Jumna, de 28 à 30° de latitude, Royle en a vu quelques pieds, cultivés pour la consommation locale, à une hauteur de 4,000 pieds. Le centre principal de la culture du coton longue soie, dans les Carolines, est dans les environs de Charleston, entre cette ville et Savannah (Géorgie) au sud, et Georgetown (Caroline du Sud) au nord. On peut donc prendre le climat de cette ville (lat. 32° 46' N.) comme point de départ et comme type favorable à la végétation du *cotonnier*. Là on sème dans les premiers jours d'avril, les balles entrent en maturité vers la fin d'août et le commencement de septembre, et la récolte se continue très-tard jusqu'en novembre, quelquefois même jusqu'en décembre. La limite de la culture du coton sur le littoral des Etats-Unis est à peu près vers 37° de latitude, non loin de Richmond, en Virginie ; mais elle y est très-incertaine, et n'a du reste qu'une importance tout à fait secondaire. Dans la Caroline du Nord, elle n'a pas plus d'extension, quoique le climat soit plus favorable. En résumé, on peut conclure que le climat le plus favorable à la production du coton sera celui qui fournira à la plante une quantité de calorique au moins égale à celle qu'il trouve là où sa culture réussit le mieux. En outre, il devra présenter cette circonstance, qu'à partir de

l'époque de la première cueillette, il s'écoulera encore une période de deux ou trois mois sans froids, ni pluies diluviennes, afin que le *cotonnier* puisse donner de nouvelles fleurs et les amener à maturité.

Quelques botanistes, se fondant sur la grande ressemblance des *cotonniers* entre eux, et sur l'instabilité de leurs caractères, les ont considérés comme de simples variétés d'une seule et même espèce primitive, que les migrations et la culture ont modifiée de différentes manières ; mais cette opinion n'a pas prévalu. En conséquence, il est nécessaire d'exposer ici en abrégé les caractères par lesquels la majorité des botanistes distinguent les principales espèces de *cotonniers* qu'ils admettent.

1° *Cotonnier herbacé* (*gossypium herbaceum*, L.) : tiges rougeâtres, herbacées et hautes de 2 pieds dans les climats tempérés, ligneuses et hautes de 4 à 6 pieds dans les régions tropicales ; rameaux, pétioles et pédoncules velus, fréquemment ponctués de noir ; feuilles molles, pubescentes, assez grandes, moins longues cependant que leur pétiole, ordinairement munies d'une glande à leur face inférieure, sur leur nervure médiane, et divisées en trois ou plus généralement en cinq lobes larges, arrondis et mucronés dans les variétés herbacées, sublancéolés et aigus dans les variétés ligneuses ; stipules lancéolées ; involucelle plus ou moins profondément denté en scie ; pétales arrondis, crenelés, longs de 2 ou 3 pouces, d'un jaune clair, avec une tache pourpre près des onglets ; stigmates soudés ; graines au nombre de cinq environ dans chaque cellule, revêtues d'un duvet grisâtre qui y adhère fortement, et que recouvre un coton blanc et court. Cette espèce est celle dont la culture est la plus répandue dans l'Inde et dans le bassin de la Méditerranée.

2° *Cotonnier arborescent* (*gossypium arboreum*, L.) : tiges hautes de 15 à 20 pieds, rameaux et pétioles velus, d'une teinte rougeâtre ; feuilles velues, d'un vert foncé, ponctuées de noir, munies d'une glande ou quelquefois de trois, à lame plus longue que le pétiole, et à trois ou cinq lobes allongés, lancéolés, ordinairement terminés par une courte soie ; stipules subulées ; pédoncules courts ; folioles de l'involucelle entières ou quelquefois dentées ; pétales d'un rouge brun, roux à la base ; capsules de la grosseur d'une aveline, graines recouvertes d'un duvet verdâtre et enveloppé d'un coton fin, soyeux, d'un blanc jaunâtre, plus estimé que celui de l'espèce précédente. Le *cotonnier arborescent* croît dans les lieux sablonneux de l'Inde, en Egypte, en Arabie, dans les îles Célèbes.

3° Le *cotonnier religieux* (*gossypium religiosum*, L.), arbuste de 3 à 4 pieds de haut, fournit un coton ordinairement jaune, qui paraît être celui avec lequel se fabrique le nankin, et qu'on récolte dans l'Inde, en Chine et dans le royaume de Siam.

4° Le *cotonnier hérissé* ou *velu* (*gossypium hirsutum*, L.) porte des graines nombreuses, libres, recouvertes d'un duvet vert qui y adhère fortement et d'un coton soyeux, fin et long ; il est fort estimé et fort répandu dans les îles de l'Amérique, où il est indigène.

5° Le *cotonnier de la Barbade* (*gossypium barbadense*, L.) a au contraire des graines noires, sans duvet, revêtues seulement d'un coton long et fin, qu'on peut facilement en séparer. Suivant Swartz, c'est l'espèce la plus large zone, car ils sont cultivés en grand à Pékin, par 41° de latitude nord ; ils ont été portés, d'après le témoignage de Gmelin, à 4 degrés plus au nord sur les rives de la Kouma, dans le voisinage de la mer Caspienne. Humboldt pose, comme limites de température au-dessous desquelles cesse le climat favorable au *cotonnier* herbacé, espèce qui, par sa nature, doit le moins redouter le froid, une chaleur moyenne de 22 à 24° centigrades en été, et de 7 à 9° en hiver. Dans les régions équatoriales, le *cotonnier* est cultivé dans des contrées situées jusqu'à une hauteur de 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Dans l'Himalaya, entre le Gange et la Jumna, de 28 à 30° de latitude, Royle en a vu quelques pieds, cultivés pour la consommation locale, à une hauteur de 4,000 pieds. Le centre principal de la culture du coton longue soie, dans les Carolines, est dans les environs de Charleston, entre cette ville et Savannah (Géorgie) au sud, et Georgetown (Caroline du Sud) au nord. On peut donc prendre le climat de cette ville (lat. 32° 46' N.) comme point de départ et comme type favorable à la végétation du *cotonnier*. Là on sème dans les premiers jours d'avril, les balles entrent en maturité vers la fin d'août et le commencement de septembre, et la récolte se continue très-tard jusqu'en novembre, quelquefois même jusqu'en décembre. La limite de la culture du coton sur le littoral des Etats-Unis est à peu près vers 37° de latitude, non loin de Richmond, en Virginie ; mais elle y est très-incertaine, et n'a du reste qu'une importance tout à fait secondaire. Dans la Caroline du Nord, elle n'a pas plus d'extension, quoique le climat soit plus favorable. En résumé, on peut conclure que le climat le plus favorable à la production du coton sera celui qui fournira à la plante une quantité de calorique au moins égale à celle qu'il trouve là où sa culture réussit le mieux. En outre, il devra présenter cette circonstance, qu'à partir de

6° Le *cotonnier à feuilles de vigne* ou *cotonnier d'Egypte*, suivant Heudelot (*gossypium vitifolium*, Lamk), espèce qui, par sa nature, doit le moins redouter le froid, une chaleur moyenne de 22 à 24° centigrades en été, et de 7 à 9° en hiver. Dans les régions équatoriales, le *cotonnier* est cultivé dans des contrées situées jusqu'à une hauteur de