afin de marquer aussi rigoureusement que possible la place qu'occupe et le sens que prend l'*espèce* dans cette classification, ses rapports avec le genre, la famille, l'ordre, etc. Selon le savant américain, les *embranchements* sont caractérisés par le plan de la structure; les *classes*, par le mode d'exécution du plan, en ce qui concerne les voies et moyens; les *ordres*, par le degré de complication de la structure; les *genres*, par les détails de l'exécution des parties; les *espèces*, par les rapports des individus, soit entre eux, soit avec le monde ambiant, aussi bien que par les proportions des parties, l'ornementation, etc. Pour bien comprendre les considérations sur lesquelles doit être basée la délimitation de l'*espèce*, il importe de reconnaître tout d'abord que l'*espèce* ne jouit que d'une existence limitée, qu'elle appartient à une période donnée de l'histoire du globe. Il en résulte qu'elle se trouve dans des rapports définis avec les conditions physiques alors prédominantes, ainsi qu'avec les animaux et les végétaux contemporains. Ce sont ces rapports qui fournissent les traits essentiels et qui fixent les limites naturelles de l'*espèce*. Ces rapports sont nombreux et se montrent : 1° dans la *portée* géographique naturelle à chaque *espèce*, aussi bien que dans son aptitude à s'acclimater dans les contrées où elle ne se rencontrait pas primitivement; 2° dans les relations qu'elle entretient avec les éléments ambiants, suivant qu'elle habite l'eau ou la terre, les mers profondes, les ruisseaux, les fleuves, les lacs, les bas-fonds, les bancs, les côtes sablonneuses, limoneuses, rocheuses, les bancs de calcaire, les récifs coralins, les marais, les prairies, les jachères, les landes, les déserts salés, les déserts sablonneux, les terres humides, les forêts, les vallées ombreuses, les coteaux exposés au soleil, les régions basses, les plaines, les steppes, les hauts plateaux, les pics élevés, ou les terres glacées des pôles, etc.; dans la dépendance où elle est de tel ou tel aliment pour subsister; 4° dans la durée de la vie; 5° dans le mode d'association des individus qui vivent en troupes, en petites sociétés ou isolément; 6° dans la durée et le retour de la période de reproduction; 7° dans les changements subis par les individus durant l'accroissement, et la périodicité de ces changements pendant la métamorphose; 8° dans le mode d'association de ses représentants avec les autres êtres, mode qui est plus ou moins intime et constitue chez quelques-uns une association constante, et chez d'autres le parasitisme; 9° dans toutes les particularités qui résultent de la stature définitive, des proportions des parties, de l'ornementation et de toutes les variations auxquelles l'individu peut se prêter.

M. Agassiz se prononce nettement pour la fixité des *espèces* : il la regarde comme acquise à la science et démontrée par Cuvier. « La science fit un grand pas en avant, dit-il, le jour où elle s'assura que les *espèces* ont des caractères fixes et ne changent point dans le cours du temps; mais ce fait, dont on doit la démonstration à Cuvier, a acquis une importance plus grande encore depuis qu'il a été également établi que les changements, même les plus extraordinaires, dans le mode d'existence d'un animal et dans les conditions où il est placé, n'ont pas plus d'influence sur ses caractères essentiels que le cours du temps. » M. Agassiz invoque « les preuves que nous ont conservées les monuments de l'Égypte et la comparaison minutieuse qu'on a pu faire des animaux trouvés dans les sépultures égyptiennes avec les spécimens vivants de la même *espèce* et du même pays. » Cette comparaison, faite pour la première fois par Cuvier, et d'où il résulte qu'il n'y a pas ombre de différence entre les uns et les autres, au bout d'une période de cinq mille ans, a prouvé que, « sauf le loin que nous puissions porter nos recherches en arrière, nous ne découvrons pas même un léger indice pouvant porter à croire que les *espèces* se modifient dans le cours des siècles, lorsque nous bornons nos comparaisons à une seule et même grande époque cosmique. »

M. Agassiz appelle l'attention sur certaines circonstances qui montrent que les animaux actuellement vivants habitent la terre depuis un temps infiniment plus long qu'on ne le suppose généralement. Il a été possible de déterminer le mode de formation des récifs de coraux, nommément de ceux de la Floride, avec une rigueur qui permet d'affirmer que huit mille ans environ sont nécessaires pour qu'un de ces bancs s'élève du fond de l'Océan au niveau de sa surface. Or, la pointe la plus méridionale de la Floride est entourée par quatre de ces bancs, concentriquement disposés les uns au-dessus des autres, et dont on peut démontrer que la formation a été successive. Cela fait remonter l'origine première de ces récifs à plus de trente mille ans, et cependant les coraux qui les ont construits sont partout de la même *espèce*. Voilà donc un fait qui fournit, aussi directement qu'on la puisse obtenir dans n'importe quelle branche des recherches physiques, la preuve que quelques-unes, au moins, des *espèces* animales actuellement vivantes remontent à plus de trente mille ans, et n'ont pas, dans tout le cours de cette période, subi la plus légère modification. Et encore, ces quatre récifs concentriques sont seulement les plus distincts de cette contrée; il y en a, un peu plus au nord, d'autres moins bien étudiés jusqu'ici. De fait, la presqu'île tout entière de la Floride est simplement formée de bancs de coraux agglomérés, réunis les uns aux autres dans le cours des siècles, et qui ne contiennent que des débris de coraux, de coquilles ou d'autres animaux, identiques avec ceux qui vivent actuellement sur les côtes de cette péninsule. En admettant donc qu'une étendue de cinq milles géographiques soit le terme moyen du développement d'un banc de coraux, dans les circonstances où l'on voit se succéder les récifs concentriques de la Floride, et que la succession régulière des bancs se prolonge jusqu'au lac Ogéochobée, sur deux degrés de latitude, on aurait environ deux cent mille ans pour la période de temps nécessaire à faire émerger de l'Océan la partie de la péninsule de la Floride située au sud du lac Ogéochobée, dans ses limites actuelles; et, durant cette immense période, aucune modification n'aurait eu lieu dans les caractères des animaux du golfe du Mexique.

On a coutume de mettre en avant nos animaux domestiques et nos plantes cultivées comme fournissant la preuve de la mutabilité des *espèces*. Mais, remarque M. Agassiz, pour autoriser l'argument qu'on en tire contre la fixité, un premier point devrait être établi : il faudrait démontrer que tous les animaux que nous désignons par un même nom sont issus d'un tronc commun. Or, loin que ce soit le cas, c'est chose nettement contredite par la connaissance positive où nous sommes que les variétés de plusieurs d'entre eux, tout au moins, proviennent d'un mélange complet de différentes *espèces*. Les monuments de l'Égypte font d'ailleurs voir que plusieurs de ces variétés, qu'on est disposé à supposer être le produit du temps, sont aussi anciennes que n'importe quel autre animal contemporain des hommes; en tous cas, nous ne possédons, ni n'avons besoin d'aucun fait à l'existence d'un animal sauvage, plus anciens que ceux qui nous représentent les animaux domestiques avec les mêmes différences qu'ils ont de nos jours, pour donc fort possible que les différentes races d'animaux domestiques aient été originellement des *espèces* distinctes, dont le mélange est, de nos jours, plus ou moins complet, comme celui des différentes races humaines. On doit, à ce sujet, distinguer les races que nous savons avoir été produites de main d'homme, et qui ont besoin pour subsister de nos soins constants, des races qui sont permanentes et que rien ne nous autorise à ne pas considérer comme primitives.

M. Agassiz voit la source unique de l'idée transformiste dans l'observation des différences individuelles chez les êtres vivants. Ces différences sont réelles, mais on ne doit point les exagérer. Sans doute, quelque semblables que soient entre eux les animaux ou les plantes d'une même *espèce*, il y a toujours chez tout individu, même en dehors des différences sexuelles, des traits particuliers plus ou moins prononcés par lesquels l'individualité s'accuse plus nettement. Toutefois, si grandes que soient ces différences, si tranchées que soit l'individualité, et bien qu'à la raison de cette absence d'uniformité parfaite, il soit permis de dire jusqu'à un certain point qu'aucun individu ne reproduit exactement son semblable, il n'en est pas moins vrai que l'*espèce*, dans son essence, est représentée par la somme de ces individus divers; que ces différences dépassent pas ce qu'on peut appeler les bornes de la flexibilité, de la *pliabilité* de l'*espèce*. Jamais, dans la succession de ces individus non entièrement semblables, mais immédiatement ou médiatement les uns des autres, une observation rigoureuse n'a constaté des différences de la catégorie de celles qui, pour le naturaliste pratique, constituent l'*espèce* animale ou végétale. Les extrêmes de différences remarqués parmi les individus d'une *espèce* bien étudiée en font connaître l'amplitude, et à mesure que les *espèces* sont mieux connues, on définit avec plus de précision ces limites. L'école transformiste, selon le naturaliste américain, va donc au delà des faits lorsqu'elle affirme que ces différences individuelles constituent des transitions d'une *espèce* à l'autre. Elle oublie que, dans certaines familles, les caractères spécifiques sont très-tranchés, les *espèces* peu nombreuses, et, par conséquent, la distinction facile, tandis que, dans d'autres, les différences sont faibles, souvent difficiles à saisir et néanmoins constantes. Pour reconnaître les limites des *espèces*, il faut ici exercer toute patiente et prolongée qui, à force de comparaisons répétées, aboutit finalement à nous enseigner la fixité de ces petites différences; c'est ainsi que, dans le monde minéral, certains métaux sont tellement semblables que les maîtres seuls ont pu, par une étude longue et minutieuse, en saisir et nous en faire connaître les différences, tandis que d'autres diffèrent au point d'être distingués tout d'abord l'un de l'autre par l'homme le moins exercé. « J'ai pris la peine, dit M. Agassiz, de comparer entre eux des milliers d'individus de la même *espèce;* j'ai poussé dans un cas la minutie jusqu'à placer les uns à côté des autres 27,000 exemplaires d'une même coquille, dont les *espèces* congénères sont fort voisines les unes des autres. Je puis affirmer que, sur ces 27,000 exemplaires, je n'en ai pas rencontré deux qui fussent parfaitement identiques; mais, sur ce grand nombre, je n'en ai pas non plus trouvé un seul qui dévînt du type de l'*espèce* au point d'en laisser douter sans les limites. Il y a donc lieu de reconnaître que, dans le règne animal, l'individualité joue un rôle aussi considérable que dans l'humanité même; et je ne doute pas que ce ne soit la connaissance, plus ou moins avancée pour différentes *espèces*, de la variabilité des individus, qui a conduit à supposer possible la transition d'un type spécifique à l'autre. »

L'espèce organique selon Lamarck et M. Darwin. Lamarck fut conduit par ses travaux de méthode et de classification à embrasser sur l'*espèce* organique, des opinions absolument contraires à celles dont Cuvier venait d'établir pour longtemps la domination. On sait que la botanique lui doit une ingénieuse méthode d'analyse dichotomique, à l'aide de laquelle l'élève, n'ayant jamais à choisir qu'entre deux caractères opposés, c'est-à-dire entre la présence ou l'absence d'un organe, entre une affirmation et une négation, peut arriver d'abord et directement, par la détermination successive de chacun des caractères d'une plante, au nom spécifique qu'elle porte dans les nomenclatures. L'invention et l'application de cette méthode supposaient nécessairement la comparaison des caractères attribués aux divers groupes de nos classifications. Lamarck constata d'abord ce grand fait, qu'aucun caractère constant et exclusif ne peut servir à distinguer les groupes supérieurs; puis il reconnut que ce caractère distinctif manquait également aux groupes inférieurs, c'est-à-dire au genre et à l'*espèce;* que celle-ci se ramifie en variétés plus ou moins flottantes et protéennes; que la culture, le sol, le climat, leur font éprouver les transformations les plus étranges, les plus rapides et les plus inattendues. Qu'était-ce donc que cette forme spécifique, dite jusque-là immuable, qui, à l'exemple d'un nombre surprenant de formes ont été rangées par les uns comme de véritables *espèces*, et par d'autres comme de pures variétés. Dans le seule France et la Grande-Bretagne, M. Watton a compté cent quatre-vingt-deux plantes qui ont passé tour à tour pour des variétés ou pour des *espèces* distinctes. La simple rapprochement des travaux de MM. Balington et Bentham ne donne pas moins de cent trente-neuf *espèces* douteuses sur deux cent cinquante et une. « Il y a bien des années, dit M. Darwin, que, comparant les oiseaux des îles Galapagos, soit les uns avec les autres, soit avec ceux de la terre ferme américaine, je fus vivement frappé du vague et de l'arbitraire de toutes les distinctions entre les *espèces* et les variétés. Sur les îlots du petit groupe de Madère se trouvent beaucoup d'insectes décrits comme variétés dans l'admirable ouvrage de M. Wollaston, mais qui certainement seraient élevés au rang d'*espèces* par beaucoup d'entomologistes. L'Irlande même a quelques animaux qui ont été généralement considérés comme des variétés, mais qui ont été considérés comme des *espèces* par quelques zoologistes. Plusieurs des ornithologistes les plus expérimentés considèrent notre coq de bruyère écossais seulement comme une race bien marquée de l'*espèce* norvégienne, tandis que le plus grand nombre en font une *espèce* bien distincte et particulière à la Grande-Bretagne. Une grande distance entre les stations occupées par deux formes douteuses dispose beaucoup de naturalistes à les regarder l'une et l'autre comme *espèces* distinctes. Mais quelle distance doit être regardée comme suffisante, s'est-on demandé avec juste raison? Si l'Amérique est assez éloignée de l'Europe pour justifier une distinction spécifique entre les formes de l'une et de l'autre contrée, en sera-t-il de même pour les Açores, Madère, les Canaries ou l'Islande? Quelques naturalistes soutiennent que les animaux ne présentent jamais de variétés; en conséquence, ils considèrent les plus légères différences comme ayant une valeur scientifique, et bien même qu'une forme identique se rencontre en deux contrées éloignées, ils vont jusqu'à supposer que deux *espèces* distinctes sont cachées sous le même vêtement. En fin de compte, on ne saurait contester que beaucoup de formes, considérées comme des variétés par des juges hautement compétents, ont si parfaitement le caractère d'*espèces*, qu'elles sont rangées comme telles par d'autres juges d'égal mérite. »

Mais cette ligne de démarcation précise, sur les seuls caractères morphologiques ne permettent pas de tracer entre la variété et l'*espèce*, ne la trouvons-nous pas dans la différence essentielle des phénomènes du mélissage et de ceux de l'hybridation? M. Darwin examine avec soin les lois qui président au croisement des variétés et des *espèces*, et de cet examen croit pouvoir conclure que les différences signalées par la plupart des naturalistes n'ont pas le caractère absolu qu'ils sont disposés à leur accorder. Il commence par poser que la stérilité des croisements entre *espèces* différentes, et la stérilité des croisements entre leurs hybrides ne sauraient être considérées comme une règle sans exception. On observe, en réalité, dans ces croisements tous les degrés, depuis la stérilité la plus absolue, jusqu'à la stérilité seulement très-grande, mais jamais complète. Cela est fréquente ou même exceptionnelle. Cela est si vrai, que les deux observateurs les plus versés dans la question de l'hybridation, Kolreuter et Gartner sont arrivés à des résultats diamétralement opposés, en se basant sur ce principe de distinction. Ils considèrent souvent les deux mêmes formes, l'un comme deux *espèces* distinctes. Pour ce qui concerne les hybrides féconds, Gartner a trouvé que la fécondité diminue rapidement dans les premières générations, pourvu qu'on évite tout croisement nouveau avec l'une des souches pures. D'après M. Darwin, cette diminution de fécondité peut provenir de cause très-distincte de la diversité spécifique, savoir : du croisement d'individus consanguins. Ce savant s'est, en effet, assuré, par un grand nombre d'expériences, que le croisement répété d'individus consanguins diminue la fécondité, tandis que le croisement d'individus non consanguins, ou même appartenant à des variétés différentes, l'augmente. Cette observation est d'ailleurs conforme aux opinions généralement en vogue parmi les éleveurs. Les hybrides végétaux sont rarement élevés en très-grand nombre par les expérimentateurs. Ils se trouvent d'ordinaire dans la même jardin que les *espèces* desquelles ils descendent, et l'on prend en conséquence des précautions pour qu'ils ne soient point fécondés par le pollen de ces dernières. Or, ces précautions ont généralement pour effet la fécondation de chaque hybride par son propre pollen, circonstance qui, au bout de plusieurs générations, devient très-défavorable à la fécondité. Cette action fâcheuse ou sont les naturalistes pour éviter cette question, et de la manière différente dont le plus souvent ils la résolvent. Il est peu de variétés bien marquées et bien connues qui aient été rangées au nombre des *espèces*, au moins par quelques juges compétents. Si l'on compare les diverses flores d'Angleterre, de France ou des États-Unis, dressées par différents botanistes, on voit qu'un nombre surprenant de formes ont été rangées par les uns comme de véritables *espèces*, et par d'autres comme de pures variétés. Dans la seule France et la Grande-Bretagne, M. Watton a compté cent quatre-vingt-deux plantes qui ont passé tour à tour pour des variétés ou pour des *espèces* distinctes. La simple rapprochement des travaux de MM. Balington et Bentham ne donne pas moins de cent trente-neuf *espèces* douteuses sur deux cent cinquante et une. « Il y a bien des années, dit M. Darwin, que, comparant les oiseaux des îles Galapagos, soit les uns avec les autres, soit avec ceux de la terre ferme américaine, je fus vivement frappé du vague et de l'arbitraire de toutes les distinctions entre les *espèces* et les variétés. Sur les îlots du petit groupe de Madère se trouvent beaucoup d'insectes décrits comme variétés dans l'admirable ouvrage de M. Wollaston, mais qui certainement seraient élevés au rang d'*espèces* par beaucoup d'entomologistes. L'Irlande même a quelques animaux qui ont été généralement considérés comme des variétés, mais qui ont été considérés comme des *espèces* par quelques zoologistes. Plusieurs des ornithologistes les plus expérimentés considèrent notre coq de bruyère écossais seulement comme une race bien marquée de l'*espèce* norvégienne, tandis que le plus grand nombre en font une *espèce* bien distincte et particulière à la Grande-Bretagne. Une grande distance entre les stations occupées par deux formes douteuses dispose beaucoup de naturalistes à les regarder l'une et l'autre comme *espèces* distinctes. Mais quelle distance doit être regardée comme suffisante, s'est-on demandé avec juste raison? Si l'Amérique est assez éloignée de l'Europe pour justifier une distinction spécifique entre les formes de l'une et de l'autre contrée, en sera-t-il de même pour les Açores, Madère, les Canaries ou l'Islande? Quelques naturalistes soutiennent que les animaux ne présentent jamais de variétés; en conséquence, ils considèrent les plus légères différences comme ayant une valeur scientifique, et bien même qu'une forme identique se rencontre en deux contrées éloignées, ils vont jusqu'à supposer que deux *espèces* distinctes sont cachées sous le même vêtement. En fin de compte, on ne saurait contester que beaucoup de formes, considérées comme des variétés par des juges hautement compétents, ont si parfaitement le caractère d'*espèces*, qu'elles sont rangées comme telles par d'autres juges d'égal mérite. »

Mais cette ligne de démarcation précise, sur les seuls caractères morphologiques ne permettent pas de tracer entre la variété et l'*espèce*, ne la trouvons-nous pas dans la différence essentielle des phénomènes du mélissage et de ceux de l'hybridation? M. Darwin examine avec soin les lois qui président au croisement des variétés et des *espèces*, et de cet examen croit pouvoir conclure que les différences signalées par la plupart des naturalistes n'ont pas le caractère absolu qu'ils sont disposés à leur accorder. Il commence par poser que la stérilité des croisements entre *espèces* différentes, et la stérilité des croisements entre leurs hybrides ne sauraient être considérées comme une règle sans exception. On observe, en réalité, dans ces croisements tous les degrés, depuis la stérilité la plus absolue, jusqu'à la stérilité seulement très-grande, mais jamais complète. Cela est fréquente ou même exceptionnelle. Cela est si vrai, que les deux observateurs les plus versés dans la question de l'hybridation, Kolreuter et Gartner sont arrivés à des résultats diamétralement opposés, en se basant sur ce principe de distinction. Ils considèrent souvent les deux mêmes formes, l'un comme deux *espèces* distinctes. Pour ce qui concerne les hybrides féconds, Gartner a trouvé que la fécondité diminue rapidement dans les premières générations, pourvu qu'on évite tout croisement nouveau avec l'une des souches pures. D'après M. Darwin, cette diminution de fécondité peut provenir de cause très-distincte de la diversité spécifique, savoir : du croisement d'individus consanguins. Ce savant s'est, en effet, assuré, par un grand nombre d'expériences, que le croisement répété d'individus consanguins diminue la fécondité, tandis que le croisement d'individus non consanguins, ou même appartenant à des variétés différentes, l'augmente. Cette observation est d'ailleurs conforme aux opinions généralement en vogue parmi les éleveurs. Les hybrides végétaux sont rarement élevés en très-grand nombre par les expérimentateurs. Ils se trouvent d'ordinaire dans le même jardin que les *espèces* desquelles ils descendent, et l'on prend en conséquence des précautions pour qu'ils ne soient point fécondés par le pollen de ces dernières. Or, ces précautions ont généralement pour effet la fécondation de chaque hybride par son propre pollen, circonstance qui, au bout de plusieurs générations, devient très-défavorable à la fécondité. Cette action fâcheuse ou sont les naturalistes pour éviter cette question, et de la manière différente dont le plus souvent ils la résolvent. Il est peu de variétés bien marquées et bien connues qui aient été rangées au nombre des *espèces*, au moins par quelques juges compétents. Si l'on compare les diverses flores d'Angleterre, de France ou des États-Unis, dressées par différents botanistes, on voit qu'un nombre surprenant de formes ont été rangées par les uns comme de véritables *espèces*, et par d'autres comme de pures variétés. Dans la seule France et la Grande-Bretagne, M. Watton a compté cent quatre-vingt-deux plantes qui ont passé tour à tour pour des variétés ou pour des *espèces* distinctes. La simple rapprochement des travaux de MM. Balington et Bentham ne donne pas moins de cent trente-neuf *espèces* douteuses sur deux cent cinquante et une. « Il y a bien des années, dit M. Darwin, que, comparant les oiseaux des îles Galapagos, soit les uns avec les autres, soit avec ceux de la terre ferme américaine, je fus vivement frappé du vague et de l'arbitraire de toutes les distinctions entre les *espèces* et les variétés. Sur les îlots du petit groupe de Madère se trouvent beaucoup d'insectes décrits comme variétés dans l'admirable ouvrage de M. Wollaston, mais qui certainement seraient élevés au rang d'*espèces* par beaucoup d'entomologistes. L'Irlande même a quelques animaux qui ont été généralement considérés comme des variétés, mais qui ont été considérés comme des *espèces* par quelques zoologistes. Plusieurs des ornithologistes les plus expérimentés considèrent notre coq de bruyère écossais seulement comme une race bien marquée de l'*espèce* norvégienne, tandis que le plus grand nombre en font une *espèce* bien distincte et particulière à la Grande-Bretagne. Une grande distance entre les stations occupées par deux formes douteuses dispose beaucoup de naturalistes à les regarder l'une et l'autre comme *espèces* distinctes. Mais quelle distance doit être regardée comme suffisante, s'est-on demandé avec juste raison? Si l'Amérique est assez éloignée de l'Europe pour justifier une distinction spécifique entre les formes de l'une et de l'autre contrée, en sera-t-il de même pour les Açores, Madère, les Canaries ou l'Islande? Quelques naturalistes soutiennent que les animaux ne présentent jamais de variétés; en conséquence, ils considèrent les plus légères différences comme ayant une valeur scientifique, et bien même qu'une forme identique se rencontre en deux contrées éloignées, ils vont jusqu'à supposer que deux *espèces* distinctes sont cachées sous le même vêtement. En fin de compte, on ne saurait contester que beaucoup de formes, considérées comme des variétés par des juges hautement compétents, ont si parfaitement le caractère d'*espèces*, qu'elles sont rangées comme telles par d'autres juges d'égal mérite. »

Mais cette ligne de démarcation précise, sur les seuls caractères morphologiques ne permettent pas de tracer entre la variété et l'*espèce*, ne la trouvons-nous pas dans la différence essentielle des phénomènes du mélissage et de ceux de l'hybridation? M. Darwin examine avec soin les lois qui président au croisement des variétés et des *espèces*, et de cet examen croit pouvoir conclure que les différences signalées par la plupart des naturalistes n'ont pas le caractère absolu qu'ils sont disposés à leur accorder. Il commence par poser que la stérilité des croisements entre *espèces* différentes, et la stérilité des croisements entre leurs hybrides ne sauraient être considérées comme une règle sans exception. On observe, en réalité, dans ces croisements tous les degrés, depuis la stérilité la plus absolue, jusqu'à la stérilité seulement très-grande, mais jamais complète. Cela est fréquente ou même exceptionnelle. Cela est si vrai, que les deux observateurs les plus versés dans la question de l'hybridation, Kolreuter et Gartner sont arrivés à des résultats diamétralement opposés, en se basant sur ce principe de distinction. Ils considèrent souvent les deux mêmes formes, l'un comme deux *espèces* distinctes. Pour ce qui concerne les hybrides féconds, Gartner a trouvé que la fécondité diminue rapidement dans les premières générations, pourvu qu'on évite tout croisement nouveau avec l'une des souches pures. D'après M. Darwin, cette diminution de fécondité peut provenir de cause très-distincte de la diversité spécifique, savoir : du croisement d'individus consanguins. Ce savant s'est, en effet, assuré, par un grand nombre d'expériences, que le croisement répété d'individus consanguins diminue la fécondité, tandis que le croisement d'individus non consanguins, ou même appartenant à des variétés différentes, l'augmente. Cette observation est d'ailleurs conforme aux opinions généralement en vogue parmi les éleveurs. Les hybrides végétaux sont rarement élevés en très-grand nombre par les expérimentateurs. Ils se trouvent d'ordinaire dans le même jardin que les *espèces* desquelles ils descendent, et l'on prend en conséquence des précautions pour qu'ils ne soient point fécondés par le pollen de ces dernières. Or, ces précautions ont généralement pour effet la fécondation de chaque hybride par son propre pollen, circonstance qui, au bout de plusieurs générations, devient très-défavorable à la fécondité. Cette action fâcheuse ou sont les naturalistes pour éviter cette question, et de la manière différente dont le plus souvent ils la résolvent. Il est peu de variétés bien marquées et bien connues qui aient été rangées au nombre des *espèces*, au moins par quelques juges compétents. Si l'on compare les diverses flores d'Angleterre, de France ou des États-Unis, dressées par différents botanistes, on voit qu'un nombre surprenant de formes ont été rangées par les uns comme de véritables *espèces*, et par d'autres comme de pures variétés. Dans la seule France et la Grande-Bretagne, M. Watton a compté cent quatre-vingt-deux plantes qui ont passé tour à tour pour des variétés ou pour des *espèces* distinctes. La simple rapprochement des travaux de MM. Balington et Bentham ne donne pas moins de cent trente-neuf *espèces* douteuses sur deux cent cinquante et une. « Il y a bien des années, dit M. Darwin, que, comparant les oiseaux des îles Galapagos, soit les uns avec les autres, soit avec ceux de la terre ferme américaine, je fus vivement frappé du vague et de l'arbitraire de toutes les distinctions entre les *espèces* et les variétés. Sur les îlots du petit groupe de Madère se trouvent beaucoup d'insectes décrits comme variétés dans l'admirable ouvrage de M. Wollaston, mais qui certainement seraient élevés au rang d'*espèces* par beaucoup d'entomologistes. L'Irlande même a quelques animaux qui ont été généralement considérés comme des variétés, mais qui ont été considérés comme des *espèces* par quelques zoologistes. Plusieurs des ornithologistes les plus expérimentés considèrent notre coq de bruyère écossais seulement comme une race bien marquée de l'*espèce* norvégienne, tandis que le plus grand nombre en font une *espèce* bien distincte et particulière à la Grande-Bretagne. Une grande distance entre les stations occupées par deux formes douteuses dispose beaucoup de naturalistes à les regarder l'une et l'autre comme *espèces* distinctes. Mais quelle distance doit être regardée comme suffisante, s'est-on demandé avec juste raison? Si l'Amérique est assez éloignée de l'Europe pour justifier une distinction spécifique entre les formes de l'une et de l'autre contrée, en sera-t-il de même pour les Açores, Madère, les Canaries ou l'Islande? Quelques naturalistes soutiennent que les animaux ne présentent jamais de variétés; en conséquence, ils considèrent les plus légères différences comme ayant une valeur scientifique, et bien même qu'une forme identique se rencontre en deux contrées éloignées, ils vont jusqu'à supposer que deux *espèces* distinctes sont cachées sous le même vêtement. En fin de compte, on ne saurait contester que beaucoup de formes, considérées comme des variétés par des juges hautement compétents, ont si parfaitement le caractère d'*espèces*, qu'elles sont rangées comme telles par d'autres juges d'égal mérite. »

Mais cette ligne de démarcation précise, sur les seuls caractères morphologiques ne permettent pas de tracer entre la variété et l'*espèce*, ne la trouvons-nous pas dans la différence essentielle des phénomènes du mélissage et de ceux de l'hybridation? M. Darwin examine avec soin les lois qui président au croisement des variétés et des *espèces*, et de cet examen croit pouvoir conclure que les différences signalées par la plupart des naturalistes n'ont pas le caractère absolu qu'ils sont disposés à leur accorder. Il commence par poser que la stérilité des croisements entre *espèces* différentes, et la stérilité des croisements entre leurs hybrides ne sauraient être considérées comme une règle sans exception. On observe, en réalité, dans ces croisements tous les degrés, depuis la stérilité la plus absolue, jusqu'à la stérilité seulement très-grande, mais jamais complète. Cela est fréquente ou même exceptionnelle. Cela est si vrai, que les deux observateurs les plus versés dans la question de l'hybridation, Kolreuter et Gartner sont arrivés à des résultats diamétralement opposés, en se basant sur ce principe de distinction. Ils considèrent souvent les deux mêmes formes, l'un comme deux *espèces* distinctes. Pour ce qui concerne les hybrides féconds, Gartner a trouvé que la fécondité diminue rapidement dans les premières générations, pourvu qu'on évite tout croisement nouveau avec l'une des souches pures. D'après M. Darwin, cette diminution de fécondité peut provenir de cause très-distincte de la diversité spécifique, savoir : du croisement d'individus consanguins. Ce savant s'est, en effet, assuré, par un grand nombre d'expériences, que le croisement répété d'individus consanguins diminue la fécondité, tandis que le croisement d'individus non consanguins, ou même appartenant à des variétés différentes, l'augmente. Cette observation est d'ailleurs conforme aux opinions généralement en vogue parmi les éleveurs. Les hybrides végétaux sont rarement élevés en très-grand nombre par les expérimentateurs. Ils se trouvent d'ordinaire dans le même jardin que les *espèces* desquelles ils descendent, et l'on prend en conséquence des précautions pour qu'ils ne soient point fécondés par le pollen de ces dernières. Or, ces précautions ont généralement pour effet la fécondation de chaque hybride par son propre pollen, circonstance qui, au bout de plusieurs générations, devient très-défavorable à la fécondité. Cette action fâcheuse ou sont les naturalistes pour éviter cette question, et de la manière différente dont le plus souvent ils la résolvent. Il est peu de variétés bien marquées et bien connues qui aient été rangées au nombre des *espèces*, au moins par quelques juges compétents. Si l'on compare les diverses flores d'Angleterre, de France ou des États-Unis, dressées par différents botanistes, on voit qu'un nombre surprenant de formes ont été rangées par les uns comme de véritables *espèces*, et par d'autres comme de pures variétés. Dans la seule France et la Grande-Bretagne, M. Watton a compté cent quatre-vingt-deux plantes qui ont passé tour à tour pour des variétés ou pour des *espèces* distinctes. La simple rapprochement des travaux de MM. Balington et Bentham ne donne pas moins de cent trente-neuf *espèces* douteuses sur deux cent cinquante et une. « Il y a bien des années, dit M. Darwin, que, comparant les oiseaux des îles Galapagos, soit les uns avec les autres, soit avec ceux de la terre ferme américaine, je fus vivement frappé du vague et de l'arbitraire de toutes les distinctions entre les *espèces* et les variétés. Sur les îlots du petit groupe de Madère se trouvent beaucoup d'insectes décrits comme variétés dans l'admirable ouvrage de M. Wollaston, mais qui certainement seraient élevés au rang d'*espèces* par beaucoup d'entomologistes. L'Irlande même a quelques animaux qui ont été généralement considérés comme des variétés, mais qui ont été considérés comme des *espèces* par quelques zoologistes. Plusieurs des ornithologistes les plus expérimentés considèrent notre coq de bruyère écossais seulement comme une race bien marquée de l'*espèce* norvégienne, tandis que le plus grand nombre en font une *espèce* bien distincte et particulière à la Grande-Bretagne. Une grande distance entre les stations occupées par deux formes douteuses dispose beaucoup de naturalistes à les regarder l'une et l'autre comme *espèces* distinctes. Mais quelle distance doit être regardée comme suffisante, s'est-on demandé avec juste raison? Si l'Amérique est assez éloignée de l'Europe pour justifier une distinction spécifique entre les formes de l'une et de l'autre contrée, en sera-t-il de même pour les Açores, Madère, les Canaries ou l'Islande? Quelques naturalistes soutiennent que les animaux ne présentent jamais de variétés; en conséquence, ils considèrent les plus légères différences comme ayant une valeur scientifique, et bien même qu'une forme identique se rencontre en deux contrées éloignées, ils vont jusqu'à supposer que deux *espèces* distinctes sont cachées sous le même vêtement. En fin de compte, on ne saurait contester que beaucoup de formes, considérées comme des variétés par des juges hautement compétents, ont si parfaitement le caractère d'*espèces*, qu'elles sont rangées comme telles par d'autres juges d'égal mérite. »

Mais cette ligne de démarcation précise, sur les seuls caractères morphologiques ne permettent pas de tracer entre la variété et l'*espèce*, ne la trouvons-nous pas dans la différence essentielle des phénomènes du mélissage et de ceux de l'hybridation? M. Darwin examine avec soin les lois qui président au croisement des variétés et des *espèces*, et de cet examen croit pouvoir conclure que les différences signalées par la plupart des naturalistes n'ont pas le caractère absolu qu'ils sont disposés à leur accorder. Il commence par poser que la stérilité des croisements entre *espèces* différentes, et la stérilité des croisements entre leurs hybrides ne sauraient être considérées comme une règle sans exception. On observe, en réalité, dans ces croisements tous les degrés, depuis la stérilité la plus absolue, jusqu'à la stérilité seulement très-grande, mais jamais complète. Cela est fréquente ou même exceptionnelle. Cela est si vrai, que les deux observateurs les plus versés dans la question de l'hybridation, Kolreuter et Gartner sont arrivés à des résultats diamétralement opposés, en se basant sur ce principe de distinction. Ils considèrent souvent les deux mêmes formes, l'un comme deux *espèces* distinctes. Pour ce qui concerne les hybrides féconds, Gartner a trouvé que la fécondité diminue rapidement dans les premières générations, pourvu qu'on évite tout croisement nouveau avec l'une des souches pures. D'après M. Darwin, cette diminution de fécondité peut provenir de cause très-distincte de la diversité spécifique, savoir : du croisement d'individus consanguins. Ce savant s'est, en effet, assuré, par un grand nombre d'expériences, que le croisement répété d'individus consanguins diminue la fécondité, tandis que le croisement d'individus non consanguins, ou même appartenant à des variétés différentes, l'augmente. Cette observation est d'ailleurs conforme aux opinions généralement en vogue parmi les éleveurs. Les hybrides végétaux sont rarement élevés en très-grand nombre par les expérimentateurs. Ils se trouvent d'ordinaire dans le même jardin que les *espèces* desquelles ils descendent, et l'on prend en conséquence des précautions pour qu'ils ne soient point fécondés par le pollen de ces dernières. Or, ces précautions ont généralement pour effet la fécondation de chaque hybride par son propre pollen, circonstance qui, au bout de plusieurs générations, devient très-défavorable à la fécondité. Cette action fâcheuse ou sont les naturalistes pour éviter cette question, et de la manière différente dont le plus souvent ils la résolvent. Il est peu de variétés bien marquées et bien connues qui aient été rangées au nombre des *espèces*, au moins par quelques juges compétents. Si l'on compare les diverses flores d'Angleterre, de France ou des États-Unis, dressées par différents botanistes, on voit qu'un nombre surprenant de formes ont été rangées par les uns comme de véritables *espèces*, et par d'autres comme de pures variétés. Dans la seule France et la Grande-Bretagne, M. Watton a compté cent quatre-vingt-deux plantes qui ont passé tour à tour pour des variétés ou pour des *espèces* distinctes. La simple rapprochement des travaux de MM. Balington et Bentham ne donne pas moins de cent trente-neuf *espèces* douteuses sur deux cent cinquante et une. « Il y a bien des années, dit M. Darwin, que, comparant les oiseaux des îles Galapagos, soit les uns avec les autres, soit avec ceux de la terre ferme américaine, je fus vivement frappé du vague et de l'arbitraire de toutes les distinctions entre les *espèces* et les variétés. Sur les îlots du petit groupe de Madère se trouvent beaucoup d'insectes décrits comme variétés dans l'admirable ouvrage de M. Wollaston, mais qui certainement seraient élevés au rang d'*espèces* par beaucoup d'entomologistes. L'Irlande même a quelques animaux qui ont été généralement considérés comme des variétés, mais qui ont été considérés comme des *espèces* par quelques zoologistes. Plusieurs des ornithologistes les plus expérimentés considèrent notre coq de bruyère écossais seulement comme une race bien marquée de l'*espèce* norvégienne, tandis que le plus grand nombre en font une *espèce* bien distincte et particulière à la Grande-Bretagne. Une grande distance entre les stations occupées par deux formes douteuses dispose beaucoup de naturalistes à les regarder l'une et l'autre comme *espèces* distinctes. Mais quelle distance doit être regardée comme suffisante, s'est-on demandé avec juste raison? Si l'Amérique est assez éloignée de l'Europe pour justifier une distinction spécifique entre les formes de l'une et de l'autre contrée, en sera-t-il de même pour les Açores, Madère, les Canaries ou l'Islande? Quelques naturalistes soutiennent que les animaux ne présentent jamais de variétés; en conséquence, ils considèrent les plus légères différences comme ayant une valeur scientifique, et bien