des cristaux jaunes, un peu solubles dans l'alcool et indécomposables par l'eau, qui se forment lorsqu'on traite la trimercuro-diamine par l'iodure d'éthyle.

$Hg''^3Az^2 + 8C^2H^5I = [(C^2H^5)^4AzI]^2,3Hg''I^2$.
Trimercuro-diamine. Iodure d'éthyle. Iodomercurate ß.

— *Composé* $_7$. $[(C^2H^5)^4AzI]^2,2Hg''I^2$. Ce composé prend naissance lorsqu'on fait agir le mercure métallique sur le triiodure de tétréthyl-ammonium.

$2(C^2H^5)^4AzI,I^2 + 2Hg''$
Triiodure de tétréthyl-ammonium. Mercure.

$= [(C^2H^5)^4AzI]^2Hg''I^2$.
Iodomercurate.

Il se dissout peu dans l'eau. L'alcool bouillant le dissout avec plus de facilité, en donnant une liqueur de laquelle il se sépare sous la forme d'écailles cristallines brillantes, d'une nuance jaune pâle.

— IODURE DE MERCURE, DE TÉTRÉTHYL-AMMONIUM ET DE MERCUROTÉTRÉTHYL-AMMONIUM

$C^{32}H^{78}Az^4Hg''^6I^{18}$
$= (C^8H^{20}AzI)^2 [(C^8H^{19}AzI)^2Hg'']_2 + 7Hg''I^2$.

On l'obtient, en même temps que quelques autres produits, par l'action de l'iodure d'éthyle sur le chloromaïdure de mercure $AzH^2Hg''Cl$. Il se présente sous la forme de cristaux jaunes, qui, après avoir été purifiés par des lavages à l'alcool froid, ont l'aspect d'une mosaïque dorée, et apparaissent au microscope comme formés de cubes modifiés par les facettes de l'octaèdre et du dodécaèdre. La lumière directe du soleil les détruit avec séparation de mercure métallique. Ils sont insolubles dans l'eau, l'alcool et l'éther, fondent à 150°, et se décomposent à une température plus élevée. Ce composé se dissout dans les solutions d'iodure de tétréthyl-ammonium, en se décomposant en grande partie avec réduction de mercure à l'état métallique. L'acide azotique en sépare de l'iodure mercurique. L'acide chlorhydrique bouillant le dissout et le transforme en cristaux soyeux d'un jaune verdâtre. Le chlore et le brome en séparent la totalité de l'iode, et le transforment en cristaux qui ressemblent à la naphtaline. L'oxyde d'argent récemment précipité y donne de l'iodure d'argent et forme une liqueur alcaline qui, après avoir été débarrassée de l'excès d'argent au moyen de l'acide sulfhydrique, renferme de l'hydrate de tétréthyl-ammonium. Si, au lieu de traiter cette solution alcaline par l'hydrogène sulfuré, on la traite d'abord par l'acide chlorhydrique, on obtient un chlorure double de tétréthyl-ammonium et de mercure

$[(C^2H^5)^4AzCl]^2,Hg''Cl^2$.

— CHLORURE DE TÉTRÉTHYL-AMMONIUM. On le prépare en neutralisant la solution de l'hydrate au moyen de l'acide chlorhydrique. Il forme des sels doubles avec les chlorures d'or, de mercure et de platine. Le *chloraurate*

$C^8H^{20}AzClAuCl^3$

est un précipité jaune citron qui se forme lorsqu'on mêle les solutions des deux chlorures. Il se dissout peu dans l'eau froide et dans l'acide chlorhydrique. Les *chloromercurates* sont au nombre de deux : on connaît un chloromercurate $\alpha(C^8H^{20}AzCl)^2Hg''Cl^2$ et un chloromercurate $\beta(C^8H^{20}AzCl)^2Hg''Cl^2$. Le composé α se sépare en plaques onctueuses en apparence, lorsqu'on laisse refroidir la solution faite à chaud de ses deux constituants. C'est un corps blanc soluble dans l'eau et l'acide chlorhydrique, surtout à la température de l'ébullition. Le composé β résulte de l'action de l'oxyde d'argent sur le composé

$C^{32}H^{78}Az^4Hg''^6I^{18}$

décrit plus haut. Nous avons déjà vu qu'il se dépose en cristaux lorsqu'on évapore la liqueur qui provient de cette réaction après l'avoir neutralisée par l'acide sulfhydrique sans lui faire subir aucun traitement préalable. Le *chloroplatinate* $(C^8H^{20}AzCl)^2P^tCl^4$ est un précipité de couleur orange, qui se forme immédiatement lorsqu'on mélange une solution aqueuse de ses deux chlorures constituants. Il ressemble aux sels de potasse et d'ammoniaque correspondants. Il est peu soluble dans l'eau et moins soluble encore dans l'alcool et l'éther. On peut l'obtenir cristallisé en très-beaux octaèdres.

— BROMURE DE TÉTRÉTHYL-AMMONIUM. Il se présente sous la forme de cristaux blancs granulaires et opaques.

— ÉTHYL-AMMONIUMS COMPLEXES. Nous désignerons sous ce nom des ammoniums quaternaires, qui renferment trois fois le radical éthyle et un radical étranger, soit acide, soit alcoolique.

— *Triéthyl-amyl-ammonium* $(C^2H^5)^3C^5H^{11}Az$. Hofmann a obtenu l'iodure de cet ammonium en faisant agir l'iodure d'amyle sur la triéthylamine. Cet iodure forme des cristaux d'un éclat gras, onctueux au toucher, très-solubles dans l'eau et l'alcool et insolubles dans l'éther. Les dissolutions ont une saveur amère prononcée, qui rappelle le goût de la quinine. Chauffé avec de l'oxyde d'argent humide et récemment précipité, cet iodure donne de l'iodure d'argent en même temps qu'une liqueur franchement alcaline et très-amère, qui, lorsqu'on l'évapore, laisse un sirop épais. Par la distillation, l'hydrate de triéthyl-amyl-ammonium se résout en eau, éthylène et diéthyl-amylamine. Il donne avec l'acide chlorhydrique un chlorhydrate cristallisable en petites lames. Ce sel s'unit au perchlorure de platine en formant un chloroplatinate qui cristallise en magnifiques aiguilles jaune orangé; avec l'acide azotique, l'hydrate donne un azotate en aiguilles très-dures, et avec les acides sulfurique et oxalique, il donne un sulfate et un oxalate qui s'obtiennent sous la forme de masse gommeuse lorsqu'on évapore leur solution dans le vide.

— *Triéthyl-oxéthyl-acétyl-ammonium*

$C^{10}H^{22}Az^2O \quad = Az\left\{\begin{matrix}(C^2H^5)^3\\(CH^3OOC^2H^5.\end{matrix}\right.$

Lorsqu'on chauffe pendant plusieurs heures à 100°, dans un tube scellé, un mélange de triéthylamine et d'éther chloracétique, on obtient, outre une petite quantité d'un gaz brûlant avec une flamme verte et du chlorure de tétréthyl-ammonium, le chlorure d'un ammonium contenant, à la place de l'hydrogène, trois molécules d'éthyle et une molécule d'oxéthylacétyle, c'est-à-dire du résidu

C^2H^3OOH

de l'acide glycolique, dans lequel H est remplacé par C^2H^5. Le *chloroplatinate* de cet ammonium se sépare très-facilement, sous la forme d'une poussière peu soluble, lorsqu'on ajoute du bichlorure de platine à la solution du chlorure précédent. Ce chlorure platinique, une fois purifié, donne le chlorure par de la base; si on lui enlève son platine, au moyen de l'hydrogène sulfuré, c'est un sel déliquescent. Le chloraurate cristallise en aiguilles qui fondent à 100°.

— *Triéthyl-oxacétyl-ammonium*

$Az\left\{\begin{matrix}(C^2H^5)^3\\C^2H^3O^2\end{matrix}\right.$

Le chlorure de triéthyl-oxéthyl-acétyl-ammonium, traité par l'oxyde d'argent, donne du chlorure d'argent et une solution alcoolique qui laisse déposer une substance cristallisée. Quoique parfaitement neutre aux réactifs colorés, cette substance s'unit aux acides azotique et iodhydrique pour former des sels bien définis; mais ces sels appartiennent à une autre série que le chlorure dont ils proviennent; ils diffèrent de ce dernier en ce que leur ammonium renferme l'oxacétyle

$C^2H^3O \quad = \quad C^2H^3OOH$

au lieu de l'oxéthyl-acétyle $C^2H^3OOC^2H^5$, différence rendue, d'ailleurs, évidente par l'élimination de l'alcool pendant la transformation.

Le *sel de platine* offre de magnifiques prismes rhomboïdaux

$[(C^2H^5)^3(C^2H^3O^2)AzCl]PtCl^4$.

Le *sel d'or* cristallise en aiguilles assez solubles dans l'eau bouillante. L'*azotate* se forme en dissolvant le sel correspondant de l'ammonium précédent dans l'acide azotique, évaporant à siccité, reprenant par l'alcool et ajoutant de l'éther qui détermine la précipitation du sel en belles aiguilles. L'iodure est en cristaux très-solubles dans l'eau; sa composition est intéressante : elle est représentée par la formule

$(C^2H^5)^3(C^2H^3O^2)AzI(C^8H^{17}Az)O^2$.

La substance cristalline qui reste après le traitement du chlorure tétréthylique par l'oxyde d'argent pourrait être la base monoatomique

$C^8H^{19}AzO^3 \quad = \quad (C^2H^5)^3 \quad - \quad (C^2H^3O^2)AzOH.$

Il est permis de croire cependant que cette combinaison se détruit au moment de la formation et que ces cristaux contiennent une molécule d'hydrogène en moins, et ont, par conséquent, pour formule $C^8H^{17}AzO^2$. Ce corps serait celui qui s'unit à l'iodure dans la combinaison décrite plus haut. S'il en est ainsi, ce corps serait du glycocolle triéthylique $C^2H^2(C^2H^5)^3AzO^2$; car on sait que le glycocolle normal manifeste une tendance à former des composés semblables à l'iodure décrit plus haut.

Ce composé triéthyl-oxacétylique n'est attaqué ni par la potasse ni par l'acide sulfurique à l'ébullition. L'acide azoteux est également sans action sur lui. Soumis à l'influence de la chaleur, il donne du charbon, ainsi qu'un liquide très-alcalin, qui n'est pas de la triéthylamine. Il existe encore d'autres ammoniums éthyliques, beaucoup plus complexes que les précédents. Ces ammoniums renferment du méthyle et du phényle. Nous renvoyons leur étude au MOT MÉTHYL-AMMONIUM.

ÉTHYL-ANILINE. V. PHÉNYLAMINE (dérivés de).

ETHYL-BENZOÏQUE adj. (é-til-bain-zo-i-ke). Chim. Se dit d'un acide découvert par Kekulé, et dans lequel on admet qu'un atome d'hydrogène de l'acide benzoïque est remplacé par le radical éthyle.

— **Encycl.** On donne le nom d'acide *éthyl-benzoïque* à un acide $C^6H^4(C^2H^5)CO.OH$ qui représente de l'acide benzoïque dont un atome d'hydrogène du radical serait remplacé par le radical monoatomique, éthyle. Cet acide a été obtenu synthétiquement par Kekulé, il y a quelques années, par l'action d'un courant d'anhydride carbonique sur une solution éthérée d'éthyl-benzol monobrome; mais il n'avait pas été sérieusement étudié. Plus tard, Fittig et Kœnig obtinrent également un acide qu'ils nommèrent *éthyl-benzoïque*, en oxydant le diéthyl-benzol au moyen de l'acide azotique. Les deux acides devaient naturellement être identiques, parce que le diethyl-benzol se prépare lui-même avec le monobromure de benzol, et que, par conséquent, dans les deux cas, le point de départ est le même. Aussi Fittig et Kœnig étaient-ils décidés à considérer les deux acides comme identiques, tout en conservant un certain doute sur le succès des expériences synthétiques de Kekulé. En présence de ce doute, et aussi pour trancher la question de l'identité des deux acides, MM. Kekulé et Thorpe résolurent, en 1869, de soumettre la question à une épreuve expérimentale. A cet effet, ils étudièrent plus complètement un échantillon d'acide provenant de l'ancienne préparation, et firent une préparation nouvelle par la méthode ci-dessus indiquée, qui appartient à Kekulé. On place environ 20 grr. de monobromèthyl-benzol, $C^6H^5Br.C^2H^5$, dans un large flacon, et on l'étend de six ou sept fois son volume d'éther parfaitement anhydre, de façon que le liquide s'élève à un centimètre et demi au-dessus du fond du flacon. On ajoute alors la quantité théorique de sodium coupé en morceaux aussi fins que possible, et l'on dirige à travers le liquide un courant assez lent d'anhydride carbonique bien sec. L'appareil est surmonté d'un réfrigérant de Liebig renversé (appareil à reflux), qui permet aux vapeurs condensées de refluer dans le flacon, et, s'il est nécessaire, on règle l'action en plongeant de temps à autre le flacon dans l'eau froide. Au bout de vingt-quatre heures environ, l'opération est achevée. On épuise à plusieurs reprises par de l'éther la masse vert foncé qui reste comme résidu, on en retire avec soin l'excès de sodium, on dissout le sel restant dans une petite quantité d'eau, et l'on filtre la solution. Un léger excès d'acide chlorhydrique ajouté à la liqueur filtrée en précipité l'acide, que l'on recueille sur un filtre et qu'on lave avec une petite quantité d'eau froide. Cet acide, toutefois, est encore impur. Pour le purifier, on dissout la masse dans l'eau de baryte tiède, on éloigne l'excès de baryte par un courant d'anhydride carbonique, on filtre la liqueur, et on reprécipite l'acide de la solution chaude au moyen de l'acide chlorhydrique. La substance est alors tout à fait pure.

La réaction qui permet de faire la synthèse de l'acide *éthyl-benzoïque* est représentée par l'équation suivante :

$C^6H^4Br(C^2H^5) + 2Na + CO^2$
Monobromèthyl-benzol. Sodium. Anhydride carbonique.

$= NaBr + C^6H^4(CO^2Na)(C^2H^5)$
Bromure de sodium. Ethyl-benzoate sodique.

En fait, toutefois, la réaction paraît être beaucoup plus compliquée que cette équation ne l'indique. Quoique l'on emploie toujours les mêmes proportions d'éther et de sodium, on est loin, très-loin même, d'obtenir toujours la même quantité de produits dans deux expériences successives. Les conditions de formation de l'acide *éthyl-benzoïque* n'ont pas été étudiées avec assez de soin pour qu'il soit actuellement possible d'établir les causes de ces différences. Il paraît cependant que la présence d'une petite quantité d'eau favorise la production du sel sodique, que une action dont la nature nous est complétement inconnue.

L'acide *éthyl-benzoïque*, préparé comme nous venons de le dire, est entièrement identique avec celui qui a été décrit par Fittig et Kœnig. Il cristallise dans l'eau bouillante en petites feuilles qui ont un grand degré de ressemblance avec l'acide benzoïque. La solubilité dans l'eau froide est toutefois beaucoup moins forte que celle de ce dernier acide. L'acide *éthyl-benzoïque* pur fond entre 110° et 111° (Kekulé, Fittig et Kœnig), et se prend en une masse cristalline confuse par le refroidissement. Il commence à se sublimer à quelques degrés au-dessous de son point de fusion. Traité par une quantité d'eau chaude insuffisante pour le dissoudre, il fond en une huile lourde et incolore. L'*alcool* et l'*éther* le dissolvent facilement. Purifié par une série de cristallisations dans l'alcool, il fond toujours à trois ou quatre degrés plus bas que lorsqu'on le purifie par cristallisation dans l'eau.

Le *sel de baryum* $(C^9H^9O^2)^2Ba'',2H^2O)$, préparé par la neutralisation de l'acide au moyen du carbonate de baryum, cristallise en plaque, quoique assez difficilement. Il est soluble dans environ 45 parties d'eau froide et dans une quantité beaucoup moindre d'eau bouillante. Abandonné sous une cloche au-dessus d'un vase rempli d'acide sulfurique, il perd la totalité de son eau de cristallisation.

Le *sel de cuivre* $(C^9H^9O^2)^2Cu'')$ est une poudre amorphe d'un vert bleuâtre et presque insoluble dans l'eau, que l'on obtient en ajoutant du sulfate de cuivre à une solution étendue d'éthyl-benzoate de sodium.

ÉTHYL-CROTONIQUE adj. (é-til-kro-to-ni-ke — de *éthyle* et *crotonique*). Chim. Se dit d'un acide crotonique, dans lequel une molécule d'hydrogène est remplacée par une molécule d'éthyle.

— **Encycl.** L'acide *éthyl-crotonique*, découvert en 1865 par MM. Frankland et Dupa, représente de l'acide crotonique dont un atome d'hydrogène est remplacé par de l'éthyle. Il s'obtient par la déshydratation du diéthoxalate (leucate) d'éthyle, ou plutôt par la saponification de l'éther qui se forme dans cette déshydratation. Le composé primitif perd un OH et un H qui s'éliminent à l'état d'eau. L'atome d'hydrogène, pris à un des atomes d'éthyle, transforme ce dernier en éthylène ou éthylidène, qui sature et l'atomicité de carbone saturé d'abord par l'éthyle, et l'atomicité du même métalloïde préalablement saturé par l'oxhydryle. Le corps déshydratant dont on fait ordinairement usage est le protochlorure de phosphore.

$$3C^2\left\{\begin{matrix}OH\\C^2H^5\\C^2H^5\\O''\\OC^2H^5\end{matrix}\right. + 2PCl^3 =$$
Diéthoxalate d'éthyle. Protochlorure de phosphore.

$$2P(OH)^3 + 6HCl + 3C^2\left\{\begin{matrix}C^2H^5\\C^2H^5\\O''\\OC^2H^5\end{matrix}\right.$$
Acide phosphoreux. Acide chlorhydrique. Ethyl-crotonate d'éthyle.

On mêle le trichlorure de phosphore et le diéthoxalate ou leucate d'éthyle dans un ballon surmonté d'un appareil à reflux, et l'on fait bouillir le tout pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que tout dégagement d'acide chlorhydrique ait cessé. On jette alors le produit dans l'eau, on décante la couche éthérée qui surnage, on la lave à l'eau plusieurs fois, puis au carbonate de soude, puis enfin on la dessèche sur une couche de chlorure de calcium et on la rectifie. Le produit ainsi obtenu n'est encore que de l'éthyl-crotonate d'éthyle. Pour en retirer l'acide libre, on saponifie l'éther en le faisant bouillir avec une solution alcoolique de potasse. Il se décompose entièrement en alcool et éthyl-crotonate potassique $C^6H^5KO^2$. On distille l'éthyl-crotonate avec de l'acide sulfurique étendu. Il passe une grande quantité d'eau ainsi qu'un liquide huileux qui se solidifie avant de sortir du condenseur, lequel solidifie avant de sortir du condenseur, lequel solidifie avant de sortir du condenseur, lequel

peut sans danger mener un peu plus rapidement l'opération. Quand tout le brome a été introduit dans l'appareil, on retourne le réfrigérant de Liebig et l'on distille le produit au bain-marie. La réaction s'accomplit en deux phases : il se forme d'abord du bromure de phosphore, et ce composé se détruit ensuite au contact de l'alcool en donnant naissance à de l'acide phosphoreux et à de l'éther bromhydrique.

Le bromure d'*éthyle* est un liquide incolore plus lourd que l'eau, d'une densité de 1,40 et d'une densité de vapeurs de 3,754. Il bout à 40°,7 sous une pression de 0m,757. Son odeur est éthérée ; sa saveur est à la fois piquante et doucâtre, mais désagréable. Il est peu soluble dans l'eau, soluble en toutes proportions dans l'alcool et l'éther. Respirées, les vapeurs amènent l'anesthésie. Les caractères chimiques du bromure d'*éthyle* sont les mêmes que ceux de l'éther chlorhydrique. Il brûle toutefois plus difficilement, mais avec une flamme d'un beau vert qui n'est pas fuligineuse, et répand une odeur désagréable et forte d'acide bromhydrique.

— *Iodure d'éthyle* (C^2H^5I). Bien que l'iodure d'*éthyle* puisse être préparé par l'action de l'acide iodhydrique sur l'alcool, les difficultés que l'on éprouve à se procurer cet acide à l'état de concentration convenable font qu'on prépare ordinairement cet éthyle à l'aide de l'alcool et de l'iodure de phosphore. Le meilleur procédé consiste en ceci : on place dans un ballon une partie de phosphore et de dix à quatorze parties d'alcool ; on adapte au ballon une allonge bouchée par un tampon de coton dont la panse renferme un mélange d'iode et de verre pilé, le verre étant destiné seulement à maintenir la porosité de la matière ; l'allonge est, à son tour, mise en contact avec un réfrigérant de Liebig disposé de manière que le liquide condensé puisse refluer dans le ballon. Cela fait, on chauffe le ballon au bain-marie de manière à déterminer une ébullition lente de l'alcool. Par suite de cette ébullition, les vapeurs d'alcool s'élèvent dans l'allonge et même dans le réfrigérant, puis se condensent et retombent dans le ballon en traversant la couche d'iode, dont une partie se trouve ainsi dissoute et entraînée. Cette partie d'iode réagit sur le phosphore et donne du bromure de phosphore, lequel, au contact de l'alcool, donne de l'acide phosphoreux et de l'iodure d'*éthyle*. Quand tout l'iode contenu dans l'allonge a été dissous, on démonte l'appareil et l'on distille le contenu du ballon. Si le produit distillé est coloré, on l'agite avec de la potasse faible, on le dessèche sur du chlorure calcique et on le distille de nouveau. L'iodure d'*éthyle* est un liquide incolore, d'une odeur forte et éthérée. Sa densité égale 1,9206 à 23° et 1,97546 à 0°. Il bout à 70° sous la pression de 0m,751 d'après Pierre et à 72°,2 sous la pression de 0m,7465 suivant Frankland. Sa densité de vapeur a été trouvée de 5,475 ; la théorie exigerait 5,405. Il est peu soluble dans l'eau, mais se mêle facilement à l'alcool et à l'éther.

L'iodure d'*éthyle* est difficilement inflammable. Toutefois il prend feu et répand des vapeurs violettes d'iode lorsqu'on le fait tomber goutte à goutte sur des charbons chauffés au rouge. Dirigé en vapeurs à travers un tube chauffé au rouge sombre, il se décompose avec production d'éthylène, d'hydrogène et d'iodure d'éthylène. Quelquefois on rencontre aussi de l'iode parmi ces produits, et si l'on songe à la facilité avec laquelle l'iodure d'éthylène se détruit à chaud, il sera peut-être plus rationnel de supposer qu'un rouge il se forme seulement de l'éthylène, de l'hydrogène et de l'iode. Ce serait ensuite par une action ultérieure à froid que l'iode libre s'unirait à une partie de l'éthylène.

Le chlore décompose l'iodure d'*éthyle* avec séparation d'iode et formation d'iodure d'*éthyle ;* l'acide azotique et l'acide sulfurique séparent également de l'iode de ce corps. La potasse agit peu sur lui. Les métaux, au contraire, agissent énergiquement sous l'influence de la chaleur et donnent des iodures métalliques en même temps que des composés organo-métalliques. V. ÉTHYLIUM.

L'iodure d'*éthyle* fait la double décomposition avec une foule de corps. Avec les alliages de sodium, il donne généralement de l'iodure de sodium et un composé organo-métallique ; avec les combinaisons de sodium et d'arsenic, d'antimoine ou de phosphore, il donne les composés éthylés de ces métalloïdes (triéthyl-phosphine, triéthyl-arsine, triéthyl-stibine). Les sels d'argent le décomposent facilement avec précipitation d'iodure d'argent et formation d'un oxysel d'*éthyle* (éther composé). Ce procédé de préparation des éthers composés éthyliques est même le meilleur pour beaucoup de ces corps, comme l'orthophosphate, le pyrophosphate, le sulfate, etc. d'*éthyle*. MM. Louguinine et Naquet ont néanmoins constaté qu'avec les acides facilement réductibles cette réaction ne peut pas servir. Ainsi, ils ont reconnu qu'en chauffant du molybdate d'argent avec de l'iodure d'*éthyle*, il y a réduction de l'acide molybdique et formation des composés bleus qui prennent naissance toutes les fois que les composés molybdiques sont soumis à l'influence des agents réducteurs.

L'iodure d'*éthyle*, chauffé avec une solution alcoolique d'ammoniaque, dans un tube scellé à la lampe, se transforme en un mélange d'iodhydrates des divers ammoniums éthylés. Avec la triéthylamine, il fournit l'iodure de tétréthyl-ammonium parfaitement pur.

— *Fluorure d'éthyle* (syn. *éther fluorhydrique* C^2H^5Fl). On le prépare en distillant un mélange d'alcool, de fluorure de calcium et d'acide sulfurique, ou en dirigeant un courant d'acide fluorhydrique gazeux bien sec à travers de l'alcool absolu, placé dans une cornue de platine ou de plomb entourée de glace. Quand le liquide est saturé, on le distille de manière à ne recueillir que le premier quart de ce qui passe, et l'on verse dans l'eau le produit distillé. Il se produit ainsi une couche éthérée qui s'élève à la surface du liquide et qui paraît être du fluorure d'*éthyle*. C'est un liquide incolore, très-volatil, d'une odeur particulière qui rappelle le raifort. Il brûle avec une flamme bleuâtre en répandant des vapeurs d'acide fluorhydrique. On ne peut pas le conserver dans des vases de verre, surtout si ceux-ci sont humides ; car il se décompose dans ces conditions avec formation d'alcool et de silicofluorure de potassium. Ce corps n'a jamais été obtenu assez pur pour qu'on ait pu en faire l'analyse.

— *Cyanure d'éthyle* (syn. *éther cyanhydrique, propionitrine* $C^2H^5.CAz = C^3H^5.Az$). L'éther cyanhydrique peut être considéré sans doute comme forme par la combinaison du cyanogène CAz avec l'*éthyle* C^2H^5. Mais comme, dans le cyanogène, c'est l'atome de carbone qui possède une atomicité libre, et comme, dans l'*éthyle*, c'est aussi une atomicité du carbone qui est vacante, dire que le cyanogène se combine à l'*éthyle*, c'est comme si l'on disait qu'un nouvel atome de carbone vient s'ajouter à ceux qui constituaient la chaîne C^2 dans C^2H^5. Dans le cyanure d'*éthyle*, on a donc une nouvelle chaîne C^3 octoatomique dont les huit affinités sont saturées, cinq par l'*éthyle* et trois par de l'azote ; de là la formule $(C^2H^5)'''Az$ de l'éther cyanhydrique. L'identité du carbone contenu dans le cyanogène et du carbone contenu dans l'*éthyle* nous montre de plus qu'il n'y a aucune raison pour que le carbone se sépare de la chaîne de préférence aux autres. En nous rapportant dès lors à ce que nous avons dit au début de cet article sur les radicaux composés, nous serons conduits à considérer le cyanure d'*éthyle*, non plus comme résultant de la combinaison du radical *éthyle* avec un radical négatif, mais bien comme formant un tout unique, à trois atomes de carbone, comme constitué, en un mot, par l'union de l'azote Az''' avec un radical triatomique, l'allyle C^3H^5. L'azote, en effet, diffère par ses propriétés du carbone et de l'hydrogène, et peut se séparer de la molécule sans que pour cela le groupe principal s'altère ou se détruise. On doit donc s'attendre à trouver au cyanure d'*éthyle* des réactions tout à fait différentes de celles qui caractérisent les autres éthers haloïdes.

Préparation. On peut obtenir le cyanure d'*éthyle* par plusieurs méthodes. 1° On fait un mélange bien intime de cyanure de potassium pur et de sulfovinate de potasse, tous deux bien secs et bien pulvérisés ; on place ce mélange dans une cornue de verre lutée et on le distille à feu nu. L'*éthyle* du sulfovinate abandonne ce sel pour se porter sur le cyanogène, qu'il convertit ainsi en cyanure d'*éthyle*, tandis que le potassium, abandonné par le cyanogène, vient remplir le vide laissé par l'*éthyle* dans la molécule du sulfovinate, et transforme ce dernier corps en sulfate neutre de potassium. Le cyanure d'*éthyle* formé passe à la distillation. On le lave avec de l'eau saturée de chlorure de sodium, on le dessèche sur du chlorure de calcium fondu, et on le distille en distillant ce qui passe vers 97° (Gauthier). Ce procédé ne donne de bons résultats qu'autant qu'on opère avec du cyanure de potassium pur : si l'on fait usage du sel du commerce, qui renferme toujours du cyanate, on obtient un mélange de cyanure et de cyanate d'*éthyle* qu'il est ensuite presque impossible de séparer par distillation fractionnée. 2° On fait un mélange de cyanure de potassium pur, d'alcool ordinaire et de bromure d'*éthyle ;* on place le mélange dans un ballon muni d'un réfrigérant propre à faire retomber les vapeurs dans l'appareil, ou mieux dans un matras scellé à la lampe, et l'on chauffe pendant 24 ou 48 heures. Au bout de ce temps, on arrête l'opération, on filtre pour séparer le bromure de sodium qui s'est déposé, et l'on précipite le cyanure d'*éthyle* de la liqueur au moyen de l'eau. Toutefois, comme cet éther n'a pas un point d'ébullition fort éloigné de celui de l'alcool, et qu'il est un peu soluble dans l'eau, il est à peu près impossible de séparer ces deux liquides l'un du l'autre ; aussi cette méthode ne peut-elle jamais donner de cyanure d'*éthyle* pur du premier coup, et ne doit-elle être considérée que comme une première phase de l'opération qui peut conduire à ce résultat (voy. 3° ci-dessous). On a essayé de substituer le cyanure d'argent au cyanure de potassium pour éviter l'emploi de l'alcool, mais il se forme alors un composé solide de cyanure d'argent et de cyanure ou d'iodure d'*éthyle*. Ce dernier composé dégage, il est vrai, du cyanure d'*éthyle* lorsqu'on le chauffe ; malheureusement, ce cyanure ainsi obtenu est très-impur et renferme, entre autres produits étrangers, de la méthylamine. On distille le produit dans un appareil avec de l'anhydride phosphorique. A cet effet, on prépare d'abord, par la méthode précédente, une solution alcoolique de cyanure d'*éthyle*, et, après avoir filtré pour séparer le bromure de sodium, on dissout quelques morceaux de potasse dans la liqueur, et on la porte à l'ébullition dans un appareil disposé de manière que les vapeurs puissent se condenser et refluer dans le liquide. On continue l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'ammoniaque. On distille alors l'alcool, et lorsque le résidu est bien sec, on y ajoute de l'acide sulfurique étendu et on le distille de nouveau. Il passe alors de l'acide propionique étendu, que l'on amène à son maximum de concentration au moyen de la distillation, ce qui est facile, puisqu'il bout à 140°. On transforme ensuite cet acide en sel d'ammonium au moyen d'un courant de gaz ammoniac ; on dessèche bien le sel, on le pulvérise et on le distille après l'avoir mélangé avec un excès d'anhydride sulfurique. Il passe alors du cyanure d'*éthyle* très-pur dans le récipient. Au lieu du propionate d'ammonium, on pourrait prendre la propionamide, mais ce produit serait plus difficile à obtenir.

Propriétés. Le cyanure d'*éthyle* est un liquide incolore, d'une odeur alliacée désagréable lorsqu'il est impur, et d'une odeur éthérée suave lorsqu'il est pur. Il est très-vénéneux. Sa densité égale 0,78 (Pelouze) ; 0,7889 à 12°,6 (Frankland et Buttlef). Il bout à 82° d'après Pelouze ; mais, d'après les expériences de M. Gauthier, qui ne laissent aucun doute, son vrai point d'ébullition est fixé à 97°. L'eau le dissout assez facilement, mais cesse de la dissoudre lorsqu'elle est saturée de sel marin. L'alcool et l'éther le dissolvent en toutes proportions.

Les trois réactions fondamentales du cyanure d'*éthyle* sont celles qu'il éprouve sous l'influence des agents d'hydratation, de l'hydrogène naissant et des hydracides de la famille du chlore.

1° Les hydratants, acides étendus boullants ou solutions alcooliques alcalines également bouillantes, fixent sur lui les éléments de deux molécules d'eau et le convertissent en propionate ammonique $C^3H^5O.OAzH^4$, ou plutôt dans les produits de la décomposition de ce sel par les réactifs employés, c'est-à-dire en propionate alcalin et ammoniaque si l'on fait usage des acides.

$$\underset{\text{Cyanure d'éthyle.}}{C^3H^5.Az} + \underset{\text{Potasse.}}{KHO} + \underset{\text{Eau.}}{H^2O} = \underset{\text{Propionate potassique.}}{C^3H^5O.OK} + \underset{\text{Ammoniaque.}}{AzH^3}$$

Nous avons vu ailleurs (V. CYANOGÈNES COMPOSÉS) que cette réaction est générale et appartient à tous les éthers cyanyhdriques. Il en est de même des deux suivantes.

2° Lorsqu'on fait agir sur le cyanure d'*éthyle* de l'hydrogène naissant développé au moyen de l'acide sulfurique et du zinc, 4 atomes de ce métalloïde se fixent sur l'éther, et du sulfate de propylamine prend naissance.

$$\underset{\text{Cyanure d'éthyle.}}{C^3H^5.Az} + \underset{\text{Hydrogène.}}{2H^2} = \underset{H^2}{(C^3H^7)'}Az.$$

3° L'éther cyanyhdrique s'unit directement à l'acide chlorhydrique, à l'acide bromhydrique et à l'acide iodhydrique gazeux ; les produits sont cristallisables et répondent aux formules :

$C^3H^5.Az,HCl$, C^3H^5Az,HBr et C^3H^5Az,HI.

Ils n'ont pas une stabilité très-grande ; mais leur existence prouve néanmoins que le cyanure d'*éthyle* a réellement une constitution analogue à celle des ammoniaques composées.

4° Chauffé avec de l'acide sulfurique fumant, le cyanure d'*éthyle* donne de l'acide disulféthylique $C^2H^5SO^6$, en même temps qu'il se dégage de l'anhydride carbonique et du sulfate d'ammonium.

5° Soumis à l'action du potassium à la température ordinaire, le cyanure d'*éthyle* se décompose en cyanure de potassium, hydrure d'*éthyle* et cyanéthine (polymère du cyanure d'*éthyle*). Nous avons déjà dit qu'on ne peut s'expliquer la formation de l'hydrure d'*éthyle* qu'en admettant, ou que les produits n'étaient pas secs, ou que l'*éthyle* s'est décomposé en éthylène et en hydrure d'*éthyle*.

6° Le chlore agit avec assez de vivacité sur le cyanure d'*éthyle* et donne des produits de substitution; il se forme, en outre, un corps cristallisé dont la nature est mal connue et dont la formule paraît être $C^3H^{16}Cl^5Az^3O^3$. On s'expliquerait la formation d'un corps $C^3H^{16}Cl^5Az^3$, en admettant que c'est du trichlorhydrate de cyanéthine bichlorée

$$C^3H^{13}Cl^2Az^3.3HCl ;$$

mais on ne s'explique pas d'où peut venir l'oxygène dans un corps obtenu par l'action du chlore sur le cyanure d'*éthyle*. Il est évident que l'on avait opéré sur des produits humides et impurs.

— *Oxyde d'éthyle*. V. ÉTHER SULFURIQUE.

— *Hydrate d'éthyle*. V. ALCOOL.

— *Sulfhydrate d'éthyle*. V. MERCAPTAN.

— *Séléhydrate d'éthyle*. V. MERCAPTAN SÉLÉNIÉ.

— *Sulfure d'éthyle* [syn. *éther sulfhydrique* $(C^2H^5)^2S$]. On prépare le sulfure d'*éthyle* en distillant du sulfure de potassium pur avec du sulfovinate de potasse, ou en mélangeant le sulfure de potassium à l'acétate de bromure ou de l'iodure d'*éthyle*. Il se forme dans le premier cas du sulfate, et, dans le second cas, du bromure ou de l'iodure de potassium.

Le sulfure d'*éthyle* peut être considéré comme l'éther proprement dit du mercaptan. C'est un liquide incolore, huileux, d'une odeur piquante, alliacée et désagréable. Sa densité égale 0,835 à 20°; il bout à 73°; sa densité de vapeur est 3,00, le calcul exigeant 3,12. Il est insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool. C'est un corps très-inflammable qui brûle avec une flamme bleue. Il s'enflamme spontanément dans une atmosphère de chlore. Il brûle azotique l'oxyde et le convertit, particulièrement au moins, en acide sulfureux $S'O \left\{ \begin{matrix} O^2 \\ O.H \end{matrix} \right.$.

La potasse le transforme en alcool et sulfure potassique. Enfin les chlorures métalliques se combinent avec lui, en donnant des composés de sels doubles cristallisables.

Lorsqu'on fait agir le chlore avec ménagement sur le sulfure d'*éthyle*, la réaction, être modérée, de manière que ce corps prenne pas feu. On obtient alors des produits de substitution, bichlore, trichlore, tétrachlore et perchloré :

$(C^2H^3Cl)^2S$,
$(C^2H^2Cl^3)^2S$,
$(C^2HCl^4)S$,
$(C^2Cl^5)^2S$.

Le cyanure d'*éthyle* s'unit à l'iodure d'*éthyle* et donne le composé $(C^2H^5)^3S.I$.

Lorsque, dans la préparation du sulfure d'*éthyle*, on remplace le sulfure précédente. bisulfure de potassium, on obtient un bisulfure d'*éthyle* $(C^2H^5)^2S^2$ analogue, par sa composition et ses propriétés, à l'hydrogène sulfuré.

— *Séléniure d'éthyle* [syn. *éther sélénhydrique, séléniéthyle* $[(C^2H^5)^2Se]$. Il s'obtient par une réaction analogue à celle qui produit le sulfure d'*éthyle*. Il suffit de substituer le sélénium au sulfure de potassium. C'est un liquide d'un jaune pâle et d'une odeur insupportable ; il est beaucoup plus lourd que l'eau et se mêlange pas avec ce liquide. Lorsqu'on l'enflamme, il brûle en répandant des vapeurs rouges de sélénium.

Le sélénium étant beaucoup plus manifestement tétratomique que le soufre, le sélénéthyle jaune, beaucoup plus facilement que l'éther sulfhydrique, le rôle d'un radical composé. On connaît un chlorure, un bromure, un iodure, un azotate et un oxychlorure de sélénéthyle. Toutefois, les analyses de ces corps ne paraissent pas concluantes, car on leur attribue généralement les formules

$(C^2H^5)^2SCl$, etc.,

tandis que, d'après l'atomicité du sélénium, leurs vraies formules doivent être

$(C^2H^5)^2S.Cl^2$, etc.

— *Tellurure d'éthyle* [syn. *telluréthyle* $(C^2H^5)^2Te$]. On obtient ce corps en distillant une dissolution concentrée et bien privée d'air de sulfovinate de potasse avec du telluriure de potassium récemment préparé. On doit opérer dans un courant d'anhydride carbonique pour éviter l'oxydation du telluréthyle. Le telluréthyle est un liquide plus lourd que l'eau, d'un rouge jaunâtre foncé. Il bout à 116°, son odeur est forte, désagréable et persistante ; il paraît être très-vénéneux. L'eau ne le dissout pas.

Le telluréthyle manifeste les caractères d'un radical organo-métallique à un degré plus élevé encore que le sélénéthyle. Il se combine avidement avec l'oxygène de l'air, de sorte qu'on ne peut le conserver que sous l'eau, ou dans un récipient rempli d'un gaz inerte. On connaît des chlorure, bromure, iodure, fluorure, azotate, oxalate, oxyde, sulfure, bromure, oxychlorure, oxyiodure, sulfure, telluriure... de telluréthyle. Dans tous ces corps, le telluréthyle fonctionne comme un radical diatomique donnant des composés de la formule générale $(C^2H^5)^2Te^2R^2$.

— *Sulfates d'éthyle*. Il en existe deux : un sulfate acide, l'acide sulfovinique $SO^2 \left\{ \begin{matrix} OH \\ OC^2H^5 \end{matrix} \right.$, et un sulfate neutre, le sulfate d'*éthyle* $SO^4 \left\{ \begin{matrix} C^2H^5 \\ C^2H^5 \end{matrix} \right.$.

— *Acide éthyl-sulfurique ou sulfovinique* $SO^4 \left\{ \begin{matrix} C^2H^5 \\ H \end{matrix} \right.$. Pour obtenir ce corps, on ajoute petit à petit de l'acide sulfurique à un volume d'alcool égal à peu près à celui de l'acide employé. Les deux liquides s'échauffent considérablement par le mélange, et l'on doit refroidir pour éviter que le produit ne se détruise. Lorsque le mélange est terminé, on le porte à une température voisine de 100°, et on le maintient pendant une demi-heure. A ce moment, l'acide sulfovinique est entièrement formé :

$$\underset{\text{Alcool.}}{C^2H^5OH} + \underset{\text{Acide sulfurique.}}{SO^2H^2} = \underset{\text{Eau.}}{H^2O} + \underset{\text{Acide sulfovinique.}}{SO^2 \left\{ \begin{matrix} OH \\ OC^2H^5 \end{matrix} \right.}$$

Cet acide reste toutefois mélangé avec un

excès d'acide sulfurique. Pour le retirer de ce mélange, on étend d'eau ce dernier et l'on sature les acides libres par le carbonate de chaux, ou mieux par le carbonate de baryte. Il se forme une masse de sulfate de baryte insoluble et du sulfovinate soluble de la même base. La liqueur filtrée renferme le sel barytique ; ce sel, traité par les carbonates ou par les sulfates des divers métaux, donne du sulfate ou du carbonate de baryte et un sulfovinate métallique soluble. Si, au lieu d'un sulfovinate soluble, c'est l'acide sulfovinique que l'on veut préparer, on précipite le sel de baryte par une quantité exactement équivalente d'acide sulfurique étendu, on filtre et on évapore la liqueur dans le vide jusqu'à consistance sirupeuse. Il ne faudrait pas chauffer, l'acide sulfovinique se décomposant dans ces conditions.

L'acide sulfovinique concentré dans le vide se présente sous la forme d'un liquide sirupeux, incolore et fort aigre. Il se dissout en toutes proportions dans l'eau et dans l'alcool ; l'éther ne le dissout pas. Il s'altère à la longue. Sous l'influence de la chaleur, il donne de l'éther, de l'acide sulfurique et de l'eau ; si la chaleur devient plus forte, il se charbonne en dégageant de l'éthylène et de l'anhydride sulfureux. Lorsqu'au lieu de chauffer l'acide concentré on chauffe l'acide étendu, il se dégage de l'éther et donne de l'acide sulfurique et de l'alcool. C'est sur cette réaction que M. Berthelot a fondé la synthèse de l'alcool au moyen de l'éthylène. Ce chimiste, en agitant de l'éthylène avec de l'acide sulfurique, a obtenu, par union directe de ces deux corps, de l'acide sulfovinique, lequel, mêlé à de l'éther et de l'alcool, fournit de l'alcool et de l'acide sulfurique régénéré. Chauffé avec de l'alcool, l'acide sulfovinique donne lieu à une réaction semblable à celle précédente. Lorsque, dans la préparation du sulfure d'*éthyle*, on remplace le sulfure précédente. bisulfure de potassium, on obtient un bisulfure d'*éthyle* $(C^2H^5)^2S^2$ analogue, par sa composition et ses propriétés, à l'hydrogène sulfuré.

— *Sélénure d'éthyle* [syn. *éther sélénhydrique, séléniéthyle* $[(C^2H^5)^2Se]$. Il s'obtient par une réaction analogue à celle qui produit le sulfure d'*éthyle*. Il suffit de substituer le sélénium au sulfure de potassium. C'est un liquide d'un jaune pâle et d'une odeur insupportable ; il est beaucoup plus lourd que l'eau et ne se mêlange pas avec ce liquide. Lorsqu'on l'enflamme, il brûle en répandant des vapeurs rouges de sélénium.

Le sélénium étant beaucoup plus manifestement tétratomique que le soufre, le sélénéthyle jaune, beaucoup plus facilement que l'éther sulfhydrique, le rôle d'un radical composé. On connaît un chlorure, un bromure, un iodure, un azotate et un oxychlorure de sélénéthyle. Toutefois, les analyses de ces corps ne paraissent pas concluantes, car on leur attribue généralement les formules

$(C^2H^5)^2SCl$, etc.,

tandis que, d'après l'atomicité du sélénium, leurs vraies formules doivent être

$(C^2H^5)^2S.Cl^2$, etc.

— *Tellurure d'éthyle* [syn. *telluréthyle* $(C^2H^5)^2Te$]. On obtient ce corps en distillant une dissolution concentrée et bien privée d'air de sulfovinate de potasse avec du telluriure de potassium récemment préparé. On doit opérer dans un courant d'anhydride carbonique pour éviter l'oxydation du telluréthyle. Le telluréthyle est un liquide plus lourd que l'eau, d'un rouge jaunâtre foncé. Il bout à 116°, son odeur est forte, désagréable et persistante ; il paraît être très-vénéneux. L'eau ne le dissout pas.

Le telluréthyle manifeste les caractères d'un radical organo-métallique à un degré plus élevé encore que le sélénéthyle. Il se combine avidement avec l'oxygène de l'air, de sorte qu'on ne peut le conserver que sous l'eau, ou dans un récipient rempli d'un gaz inerte. On connaît des chlorure, bromure, iodure, fluorure, azotate, oxalate, oxyde, sulfure, bromure, oxychlorure, oxyiodure, sulfure, telluriure... de telluréthyle. Dans tous ces corps, le telluréthyle fonctionne comme un radical diatomique donnant des composés de la formule générale $(C^2H^5)^2Te^2R^2$.

— *Sulfates d'éthyle*. Il en existe deux : un sulfate acide, l'acide sulfovinique $SO^2 \left\{ \begin{matrix} OH \\ OC^2H^5 \end{matrix} \right.$, et un sulfate neutre, le sulfate d'*éthyle* $SO^4 \left\{ \begin{matrix} C^2H^5 \\ C^2H^5 \end{matrix} \right.$.

— *Acide éthyl-sulfurique ou sulfovinique* $SO^4 \left\{ \begin{matrix} C^2H^5 \\ H \end{matrix} \right.$. Pour obtenir ce corps, on ajoute petit à petit de l'acide sulfurique à un volume d'alcool égal à peu près à celui de l'acide employé. Les deux liquides s'échauffent considérablement par le mélange, et l'on doit refroidir pour éviter que le produit ne se détruise. Lorsque le mélange est terminé, on le porte à une température voisine de 100°, et on le maintient pendant une demi-heure. A ce moment, l'acide sulfovinique est entièrement formé :

$$\underset{\text{Alcool.}}{C^2H^5OH} + \underset{\text{Acide sulfurique.}}{SO^2H^2} = \underset{\text{Eau.}}{H^2O} + \underset{\text{Acide sulfovinique.}}{SO^2 \left\{ \begin{matrix} OH \\ OC^2H^5 \end{matrix} \right.}$$

Les *sulfovinates métalliques* $SO^4 \left\{ \begin{matrix} C^2H^5 \\ M' \end{matrix} \right.$ sont solubles dans l'eau, ordinairement nacrés et gras au toucher. Ils se décomposent à la distillation sèche, en donnant du gaz oléfiant, des huiles qui sont un mélange de polymères de l'éthylène, et auxquelles on a donné le nom d'*huile de vin pesante*, de l'eau, de l'anhydride carbonique et du gaz sulfureux. Ils laissent un résidu de sulfate mélangé de charbon. Quand on les distille à l'état sec avec de l'hydrate de potasse, ils donnent de l'alcool ; distillés à l'état sec avec de l'acide sulfurique étendu d'un quart d'eau, ils fournissent un mélange d'alcool et d'éther.

La solution aqueuse des sulfovinates se décompose par l'ébullition. Quelques gouttes de potasse ajoutées à la solution de l'éthyl-sulfate potassique empêchent complètement cette décomposition. Les éthyl-sulfates alcalins sont solubles dans l'alcool. Ce sont des corps très-employés dans les laboratoires pour préparer d'autres combinaisons éthylées, par double décomposition, des oxalates, etc., à base d'alcali. On a étudié et analysé les sulfovinates d'ammoniaque, de potasse, de soude, de lithine, de baryte, de strontiane, de chaux, de magnésie, de zinc, de cadmium, de nickel, de cobalt, de cuivre, de manganèse, de plomb et d'argent ; on a préparé, mais non analysé, les sulfovinates d'alumine, de fer au minimum, de fer au maximum, d'uranyle et de mercure au maximum.

— *Sulfate neutre d'éthyle* (syn. *éther sulfurique vrai* $SO^4 \left\{ \begin{matrix} C^2H^5 \\ C^2H^5 \end{matrix} \right.$). Il se produit par la combinaison directe de l'oxyde d'*éthyle* avec l'acide sulfurique anhydre. Pour le préparer, on entoure d'un mélange de glace et de sel marin un ballon contenant de l'éther pur, et l'on y fait arriver les vapeurs de l'anhydride sulfurique, telles que les dégage l'acide sulfurique fumant sous l'influence de la chaleur. Quand le liquide est devenu sirupeux, on l'agite avec son volume d'éther et avec quatre fois son volume d'eau. Le mélange se sépare en deux couches, dont la supérieure renferme du sulfate d'*éthyle* en solution éthérée. On la décante, on l'agite avec un lait de chaux pour la débarrasser de l'anhydride sulfureux et de quelques traces d'acide sulfurique, en même temps que pour la décolorer ; puis on la lave avec de l'eau, on la filtre et on la chauffe dans une petite cornue, pour volatiliser l'éther ordinaire. Le résidu est ensuite introduit dans une capsule, lavé avec un peu d'eau qu'on enlève au moyen de bandes de papier joseph, et finalement desséché dans le vide sur de l'acide sulfurique.

Le sulfate d'*éthyle* est un liquide oléagineux, d'une saveur âcre et brûlante et d'une odeur de menthe poivrée. Il donne des taches sur le papier, qui ne persistent que pendant un temps assez court. Sa densité égale 1,120. Incolore quand il est tout à fait pur, il se présente le plus souvent avec une légère teinte jaune. On ne parvient à le distiller qu'avec de grandes précautions, car il nourcit déjà à 130° ou 140°, en donnant du gaz sulfureux, de l'alcool, et plus tard du gaz oléfiant. Le chlore ne le décompose pas à froid, mais il est absorbé par lui. L'acide sulfurique n'y agit pas non plus à froid. Le sulfhydrate de potassium le convertit en sulfate de potasse et sulfhydrate d'*éthyle*. L'eau décompose le sulfate d'*éthyle* à froid ; et plus facilement encore sous l'influence de la chaleur. La liqueur devient acide, dégage de l'alcool lorsqu'on la fait bouillir, et donne, si on la sature avec du carbonate de baryte, des sels de baryte solubles. Evaporée doucement, la solution filtrée dépose, avant qu'elle soit bien concentrée, une petite quantité de paillettes, dont le nombre augmente par une addition d'alcool au liquide. M. Wetherill suppose que cette substance est du méthionate de baryte. L'eau mère d'où ce sel s'est déposé contient un autre corps qui cristallise dans l'alcool en fines aiguilles, et qui a la même composition que l'éthyl-sulfate ou l'iséthionate de baryte.

Le sulfate d'*éthyle* absorbe le gaz ammoniac en s'échauffant vivement, sans dégager ni alcool ni eau. Le produit est facilement soluble dans l'eau et dans l'alcool, et donne, lorsqu'on évapore les solutions, des cristaux feuilletés de sulféthamate d'ammoniaque $C^2H^{22}(AzH^3)AzS^2O^6$. V. SULFÉTHAMIQUE ACIDE.

— *Azotite d'éthyle* (syn. *éther nitreux* $AzO^2C^2H^5$). Cet éther se produit par l'action de l'acide azoteux sur l'alcool ou sur l'éthylamine. On l'obtient aussi par l'action de l'acide azotique sur l'alcool ou sur la brucine. Dans le cas où l'on fait agir l'acide azotique sur l'alcool, il se produit, en même temps que l'éther nitreux, de l'aldéhyde et plusieurs autres substances. D'après M. Liebig, la meilleure manière de préparer l'azotite d'*éthyle* consiste à faire passer un courant de gaz nitreux dans de l'alcool étendu, en condensant le produit dans un récipient convenablement refroidi. On obtient ce courant de gaz nitreux en chauffant de l'acide azotique dans une cornue tubulée qui amène les vapeurs d'azotite d'*éthyle* dans le récipient refroidi, de manière que le produit puisse y distiller. Si l'on ne refroidissait pas l'alcool, il s'échauffe-rait assez pour entrer en ébullition. Le produit recueilli dans le récipient est agité avec son volume d'eau, décanté et desséché sur du chlorure de calcium.

Beaucoup d'autres méthodes ont été indiquées comme conduisant à la préparation de l'éther nitreux ; nous nous en tiendrons à la précédente.

L'azotite d'*éthyle* est un liquide d'une couleur jaune pâle, d'une odeur de pomme de reinette fort agréable, d'une saveur très-piquante et d'une densité de 0,947 à 15°. Il est très-inflammable et brûle avec une flamme blanche. Il bout à 21°. Sa densité de vapeur égale 2,627. Il produit assez de froid en s'évaporant à l'air pour que, si on le verse sur un volume d'eau égal au sien et qu'on souffle dessus, l'eau se congèle. L'eau en dissout 1/48 de son poids en donnant une solution acide si elle est chaude. L'alcool et l'éther le dissolvent en toutes proportions. Il colore en noir la solution du sulfate ferreux. L'éther nitreux est excessivement altérable au contact de l'eau et surtout au contact des solutions alcalines. D'après Berzélius, l'acide malique se rencontrerait au nombre de ses produits de décomposition. L'éther nitreux est employé en médecine, comme excitant et diurétique, contre le hoquet et la colique flatulente. Sa grande volatilité et sa prompte décomposition rendent plus commode l'emploi d'un mélange à volumes égaux d'alcool rectifié et d'éther nitreux (éther nitrique alcoolisé, ou liqueur anodine nitreuse).

— *Azotate d'éthyle* (syn. *éther azotique, éther nitrique* $AzO^2OC^2H^5$). Pour préparer ce corps, on ajoute 2 volumes d'alcool à 35° à 1 volume d'acide azotique de 1,401 de densité, dans lequel on a eu soin d'introduire 1 ou 2 grammes d'azotate d'urée pour éviter la formation de vapeurs nitreuses. Il convient de ne pas opérer sur de trop grandes masses ; on conseille ordinairement de ne pas distiller à la fois plus de 120 grammes de mélange : toutefois, M. Febvre en a distillé sans inconvénient jusqu'à 1 kilogramme. On chauffe légèrement et l'on recueille dans un récipient les vapeurs qui se produisent. Les premiers produits sont presque exclusivement formés d'alcool affaibli ; mais bientôt une odeur particulière annonce que l'éther nitrique commence à distiller. Il suffit alors d'ajouter de l'eau au produit, pour que cet éther se sépare sous forme d'une huile plus dense que l'eau. On lave ce produit et on le rectifie après l'avoir desséché pendant quelque temps sur du chlorure de calcium. Il ne faudrait pas pousser trop loin la distillation, sans quoi la réaction se compliquerait. L'éther azotique a une odeur douce et suave ; il possède une saveur très-sucrée, qui laisse un arrière-goût d'amertume légère. Il bout à 85°, a une densité de 1,112 à +17°, brûle avec une flamme blanche très-prononcée, et se décompose souvent avec explosion à une température un peu supérieure à son point d'ébullition. On peut, dans tous les cas, déterminer facilement cette explosion en surchauffant la vapeur. Il est entièrement insoluble dans l'eau, mais se dissout avec facilité dans l'alcool. Une solution aqueuse de potasse caustique concentrée est sans action sur lui ; mais la potasse alcoolique le décompose même à froid et donne des cristaux abondants d'azotate de potasse. L'acide azotique et l'acide sulfurique le détruisent. Le chlore l'attaque promptement en le colorant en violet. Lorsqu'on le dissout dans l'alcool ammoniacal et qu'on y fait passer de l'acide sulfhydrique, en chauffant légèrement, le mélange dépose beaucoup de soufre, et donne, à la distillation, de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'*éthyle*.

On connaît une combinaison d'azotate d'*éthyle* et d'azotate mercurique

$$2AzO^2OC^2H^5, Hg''(AzO^2)^2 + 2H^2O.$$

— *Borates d'éthyle*. On connaît plusieurs borates d'*éthyle*, dont le plus important est l'éther neutre $B \left\{ \begin{matrix} OC^2H^5 \\ OC^2H^5 \\ OC^2H^5 \end{matrix} \right.$ déjà étudié par Ebelmen. MM. Hugo Schiff et Becchi ont démontré tout récemment qu'il existe deux autres éthers boriques répondant aux formules $BO(C^2H^5)^2$ et $B^2O^3OC^2H^5$.

— *Silicates d'éthyle*. Il existe plusieurs éthers siliciques. Depuis longtemps,