vivants). Ichthyol. Nom vulgaire des diverses espèces du genre leucisque.

— Encycl. Les *gardons* ou leucisques sont compris dans ce qu'on appelle vulgairement les *poissons blancs*. Ils se distinguent des autres par leurs corps assez élevé ou leur profil large, leur nageoire dorsale plus longue, mais surtout par leurs dents pharyngiennes, disposées sur un seul rang, au nombre de cinq ou six de chaque côté, et dont les antérieures sont coniques, tandis que les postérieures sont comprimées, crochues au bout et trèsfinement entaillées aux bords. Le nombre des espèces de ce genre est moins considérable qu'on ne l'avait cru d'abord; on en reconnaît que plusieurs de celles-ci étaient de simples variétés du *gardon* commun. Ce poisson, qui ressemble un peu à la chevaine ou meunier, est connu aussi sous les noms de *roche*, *rosse*, *rossette*, *rousse*, etc., tous noms qui dérivent par altération du mot *rouge* et font allusion à la couleur caractéristique de cette espèce. Sa longueur totale ne dépasse guère 0m, 30. Son corps est comprimé; la tête assez forte, à museau arrondi; la bouche assez petite, la lèvre supérieure un peu saillante; l'œil généralement grand. Vu de profil, le *gardon* présente une forme ovale plus ou moins allongée, suivant l'âge, le sexe et l'état de développement de la laitance ou des ovaires; le dos est dans tous les cas assez élevé et d'une courbe à peu près régulière. Le *gardon* a des couleurs variées et toujours très-vives. Son dos est d'un noir verdâtre, d'un vert foncé ou d'un beau bleu, a reflets dorés ou irisés; les côtés sont argentés, à reflets bleuâtres, souvent colorés ou ponctués de jaune; le ventre est rougeâtre ou d'un blanc d'argent; l'iris rouge, ainsi que les nageoires, dont la teinte varie d'ailleurs d'intensité, suivant les circonstances locales. On trouve quelquefois dans la Seine des individus auxquels leur teinte générale d'un bleu clair a fait donner le nom de *gardon bleu*. Les naturalistes, regardées par les anciens naturalistes comme des espèces distinctes, sont, d'après M. E. Blanchard : le *gardon rutiloide* ou *rouget*, le nageur des eaux inférieures; le *jesse*, qu'il ne faut pas confondre avec l'*ide mélanote*, souvent désigné sous le même nom; le *veuguron*, caractérisé par la pointe noire de toutes ses parties supérieures, et qui est propre aux lacs de la Suisse et de la Savoie; le *gardon de selys*, qui a tout le dessus du corps d'un beau bleu.

Le *gardon* est un des poissons les plus répandus dans les eaux douces de presque toute l'Europe; il habite les lacs, les étangs, les marais et les rivières, et on le trouve partout où on parle sous le nom de *rosse*, on le trouve aussi dans la mer. « Lorsque les rosses, dit-il, remontent les rivières pour frayer vers le milieu du printemps, une partie, et ce sont toujours des mâles, part quelques jours auparavant; ensuite viennent les femelles, puis encore une troupe de mâles. » On voit souvent ainsi les *gardons* nageant par bandes, surtout dans les mois d'avril et de mai, époque de leur frai, dans les eaux peu profondes et à courant peu rapide. Ils se nourrissent surtout de matières végétales, auxquelles ils ajoutent souvent des vers, des insectes, peut-être aussi de petits poissons. Leur fécondité est des plus grandes. La femelle dépose sur les fonds pierreux des œufs qui éclosent au bout de dix à quinze jours. Leur croissance est rapide.

On ne connaît du V. de Boisaro, aucune espèce de poisson qui se multiplie en aussi grande abondance et en aussi peu de temps. « Il