tement ses propriétés digestives pour les recouvrer en l'acidifiée à nouveau. Inversement, si on le fait bouillir, la pepsine se coagule et il redevient inactif sans cesser d'être acide. L'acide actif dans le suc *gastrique* est l'acide chlorhydrique. Les expériences de M. Claude Bernard prouvent que les follicules de la muqueuse *gastrique* éliminent très-promptement un certain nombre de sels solubles introduits dans le sang, et qui ne se décomposent pas dans ce liquide, attendu que leurs propriétés sont masquées par la matière albuminoïde. Le cyanure de potassium et le lactate de fer, injectés ensemble dans le sang, se retrouvent au bout de quelques instants dans le suc *gastrique* et dans l'urine, mais dans ces liquides seulement, et ils ne sortent jamais par les autres sécrétions. Ce n'est que quand ces deux composés passent du sang dans un liquide acide qu'ils se décomposent réciproquement et donnent du bleu de Prusse. En injectant du prussiate de potasse et du lactate de fer chacun dans une veine différente, il se produit, au bout de trois quarts d'heure, une coloration bleue à la surface de la muqueuse stomacale. Cette coloration étant toute superficielle, on en peut conclure que le suc *gastrique* n'acquiert sa réaction acide qu'au sortir des glandules sécrétoires. On ne sait pas encore si cette production de suc acide est due au mélange du suc gastrique avec quelque exsudation du réseau capillaire superficiel, ou si elle provient de l'action réciproque de quelques-uns des principes contenus dans ce suc, action qui aurait lieu au moment où ces principes abandonnent les épithéliums glandulaires.

On comprend qu'il ait été à peu près impossible jusqu'ici de se procurer le suc *gastrique* pur de l'homme; aussi en ignore-t-on la composition précise. Voici celle du suc *gastrique* d'un chien.

SUC GASTRIQUE DE CHIEN (OTTO).

1° *Sans salive.*	
Eau.	973,068
Chlorure de sodium. . . .	2,507
Chlorure de potassium. . .	1,125
Chlorure de calcium. . . .	0,024
Chlorhydrate d'ammoniaque.	0,468
Phosphate de chaux. . . .	1,729
Phosphate de magnesie. . .	0,226
Phosphate de fer.	0,083
Acide lactique (chlorhydrique).	3,050
Pepsine et albumine	17,127
2° *Mêlé de salive.*	
Eau..	971,171
Chlorure de sodium. . . .	3,147
Chlorure de potassium. . .	1,073

Plusieurs auteurs attribuent l'acidité normale du suc *gastrique* à de l'acide lactique, et croient que l'acide chlorhydrique libre qu'on y rencontre provient de la décomposition des chlorures par l'acide lactique. On pourrait tout d'abord demander la preuve du fait, attendu qu'on ignore dans quelle mesure l'acide lactique décomposa les chlorures et l'acide chlorhydrique les lactates. Mais les belles recherches de M. Lehmann sont de nature à mettre par toutes les incertitudes. Cet éminent hygrologiste a constaté que, si l'on dessèche à froid et dans le vide du suc *gastrique* normal, il s'en dégage de l'acide chlorhydrique qu'on peut recueillir et doser concurremment avec l'acide lactique. De plus, le suc *gastrique* artificiel, composé d'eau, de pepsine et d'acide chlorhydrique, agit comme le suc naturel tandis qu'il n'en est plus de même avec l'acide lactique.

Dans de nombreuses circonstances, le suc *gastrique* s'altère au point de n'être plus apte qu'imparfaitement à opérer la digestion des matières qu'il dissout très-bien à l'état normal. Ces maladies de causes diverses, et qu'on désigne sous le nom de *dyspepties*, sont caractérisées par une digestion imparfaite assez difficile à expliquer, il faut le dire. En effet, le suc *gastrique*, si altéré qu'il puisse être en conséquence, conserve toujours sa réaction acide. Même lorsqu'il est mélangé au sang, comme cela arrive dans le cancer de l'estomac, il manifeste sa réaction acide. C'est probablement à l'absence de pepsine qu'il faut attribuer l'impuissance du suc *gastrique* à dissoudre, dans certains cas, les matières albuminoïdes. Ce qui le prouve, c'est qu'en faisant prendre de la pepsine à certains dyspeptiques on remédie à leur état. Il y a néanmoins des dyspeptiques dont il est impossible d'améliorer l'état au moyen de la pepsine. Quand la sécrétion du suc *gastrique* est trop abondante ou quand l'acidité de celui-ci est excessive, on y peut remédier au moyen des alcalins.

On fabrique un suc *gastrique* artificiel avec de l'eau, de l'acide chlorhydrique et de la pepsine. Ce suc *gastrique* jouit exactement des mêmes propriétés que le suc naturel obtenu, soit par une ouverture fistuleuse pratiquée à l'estomac d'un animal, soit par infusion d'une muqueuse stomacale d'animal tué récemment.

Lorsqu'on connaîtra exactement la cause et la nature des altérations diverses du suc *gastrique*, on sera bien plus puissant dans la cure des dyspepsies stomacales.

GASTRITE s. f. (ga-stri-te — du gr. *gastér*, *gastros*, ventre). Pathol. Inflammation de la membrane interne de l'estomac : Gastrite *aiguë*. Gastrite *chronique*. *Etre atteint d'une* gastrite.

— **Encycl.** Pathol. Cette affection a dominé quelque temps, en France, toute la pathologie, et surtout pendant le règne éphémère de la doctrine physiologique de Broussais. L'inflammation de la membrane muqueuse de l'estomac était, d'après ce système, le point de départ de toutes les autres maladies. On comprend facilement les erreurs dans lesquelles pouvait entraîner une pareille doctrine, et les partisans de Broussais n'ont pas manqué d'y tomber. Aujourd'hui cependant on a fait justice de toutes ces idées, et l'on considère la *gastrite*, surtout la *gastrite* spontanée, comme une affection rare dont l'histoire est encore mal connue. La *gastrite* a été divisée, quant à sa marche, en aiguë et en chronique; relativement aux causes qui la produisent, on la distingue en *gastrite* spontanée et en *gastrite* toxique. (V. pour cette dernière le mot EMPOISONNEMENT.)

— *Gastrite aiguë.* « La plus grande incertitude, dit Grisolle, règne encore sur les causes de la *gastrite* aiguë. Tout ce qu'on a dit de l'influence du sexe masculin, de l'âge adulte, des climats chauds, de l'alimentation, des excès alcooliques, des émotions morales, etc., comme favorisant la manifestation de la maladie, est loin d'être encore démontré. Dans la plupart des cas, l'inflammation de l'estomac succède à une cause traumatique, comme une plaie, un coup sur l'épigastre, l'introduction d'un corps étranger, ou de substances irritantes et corrosives. »

Symptômes. Le premier symptôme caractéristique de la *gastrite* est une douleur obtuse, quelquefois vive et lancinante, ayant son siége fixe à la région épigastrique. Elle augmente par la pression et par l'ingestion des aliments ou des boissons. Les malades perdent l'appétit et sont tourmentés par une soif ardente. Ils ont la langue sèche, couverte d'un enduit blanc ou jaunâtre. Les nausées et les vomissements ne font jamais défaut; ceux-ci sont tantôt spontanés, tantôt provoqués par l'ingestion des aliments ou de boissons douces. Ils sont composés de substances alimentaires, mélangées à des matières aqueuses, bilieuses et jaunâtres. Il y a de la céphalalgie, de la dyspnée, de l'insomnie. Le pouls est accéléré et la chaleur du corps plus grande. On remarque en même temps une toux légère, sèche et anxieuse. La *gastrite* n'est pas toujours aussi intense. Le plus souvent les malades éprouvent seulement à l'estomac une espèce de pesanteur qui se change en une véritable douleur après les repas. L'appétit est conservé, mais les aliments sont difficilement digérés et presque toujours rejetés par les vomissements. C'est la *gastrite* subaiguë ligère ou érythémateuse des auteurs. Quant à la *gastrite* phlegmoneuse, si formidable pour les partisans de la doctrine physiologique, elle est tellement rare que les auteurs ne s'arrêtent pas à la décrire. La durée de la *gastrite* simple est très-variable; rarement elle se termine avant le quinzième jour, et sa terminaison est à peu près toujours heureuse. Les symptômes diminuent peu à peu d'intensité, et finissent bientôt par disparaître entièrement; mais l'estomac conserve toujours une grande susceptibilité, et il faut de grands ménagements pour éviter les récidives. La mort peut cependant être une suite directe de cette affection : c'est lorsque la maladie s'est développée sous l'influence d'une cause toxique et que les parois de l'estomac sont ulcérées ou perforées (V. ESTOMAC); mais alors on n'a plus affaire à une simple *gastrite*. Celle-ci est généralement peu grave chez l'adulte; mais il n'en est pas ainsi chez les très-jeunes enfants et les vieillards.

Traitement. Si la douleur est vive, on fait une application de sanguses sur la région épigastrique, que l'on recouvre ensuite de cataplasmes émollients. On place les malades dans des bains tièdes prolongés; on leur fait prendre des boissons acidules, mucilagineuses ou gommeuses, tièdes d'abord, et puis froides, si les vomissements venaient à persister. On donne quelques pilules d'extrait thébaïque, lorsqu'il y a insomnie ou douleurs trop vives. On ne doit commencer l'alimentation que lorsque les symptômes ont disparu, et encore faut-il débuter par les substances les plus faciles à digérer, comme le lait, le bouillon de poulet, etc.; on augmente ensuite progressivement, en raison directe des forces digestives de l'estomac. A tous ces moyens on ajoute encore l'usage de la pepsine et des eaux gazeuses naturelles ou artificielles.

— *Gastrite chronique.* Les causes en sont plus obscures peut-être que celles de la *gastrite* aiguë; mais on peut dire que cette affection est souvent le résultat d'écarts de régime ou l'effet d'une mauvaise nourriture.

L'invasion de la maladie est presque toujours marquée par un peu de malaise, des renvois acides, des régurgitations aqueuses, légres; les digestions sont pénibles; les malades éprouvent de la céphalalgie, du dégoût. Ces premiers accidents cessent ou diminuent sous l'influence d'un régime sévère et par l'abstinence de certains aliments. Cependant les digestions deviennent de plus en plus difficiles, et quelques douleurs se font sentir à l'épigastre, tantôt limitées à cette région, tantôt s'étendant dans les parties voisines et jusque dans le dos. Elles sont augmentées par l'ingestion des aliments et des boissons stimulantes. Quelquefois elles se réveillent, quand l'estomac est vide, par la pression extérieure, ou bien encore pendant la digestion; dans ce dernier cas, elles cessent quand les malades ont vomi. L'appétit, s'il n'est pas entièrement éteint, est au moins considérablement diminué; jamais il n'est exagéré comme dans la gastralgie. La soif est le plus souvent nulle ou peu vive, excepté pendant la digestion. Les vomissements sont âcres, brûlants, formés de liquides et de substances alimentaires plus ou moins digérées. Ils sont fréquemment accompagnés d'éructations fétides. On ne voit pas la langue couverte de cet enduit jaunâtre qu'on trouve dans la *gastrite* aiguë; mais elle paraît, à peu près constamment un grand développement des papilles. Une constipation opiniâtre est quelquefois remplacée par la diarrhée. Les malades ne tardent pas à éprouver les funestes effets des troubles digestifs. Ils maigrissent et dépérissent de jour en jour. Il en est qui vomissent invariablement après chaque repas et rejettent tous les aliments qu'ils prennent, ce qui amène bientôt d'épuisement. D'autres sont emportés tout à coup par une gastrorrhagie ou une péritonite consécutive à une perforation stomacale. Cependant les guérisons ne sont pas rares. L'ulcération se cicatrise, et, si la perte de substance n'est pas trop considérable, qu'elle ne siége pas surtout du côté du pylore ou le cicatrice pourrait diminuer de calibre, le malade peut recouvrer la santé comme par le passé. La durée de cette affection est indéterminée; elle est surtout sujette à récidive.

La première indication à remplir dans le traitement de la *gastrite* ulcéreuse, c'est de calmer les douleurs. L'opium réussit le plus souvent. On soumet ensuite les malades au régime lacté. Le lait agit comme tonique et comme adoucissant; il suffit ordinairement pour alimenter les individus. Graveilhier et Rokitanski le recommandent également. On le donne froid ou chaud, frais ou bouilli, selon que les malades le peuvent plus ou moins supporter. On le coupe quelquefois avec de l'eau de Vichy. Lorsque les malades ne peuvent pas le supporter, on le remplace par des gelées, des fécules, des bouillons de poulet, des boissons mucilagineuses, etc., jusqu'à ce que les aliments solides commencent à être tolérés. Rokitanski conseille en outre d'appliquer à l'épigastre des vésicatoires, des cautères et des moxas.

— Bibliogr. Andral, *Clinique médicale* (1837, 3e édition, t. IV, p. 14 166); Andral, *Cours de pathologie interne* (1843, 2e édit.); Frank, *Traité de pathologie interne* (t. V); Broussais, *Histoire des phlegmasies chroniques* (1836, 6e édit., 3 vol. in-8°); Louis, *Du ramollissement avec amincissement et de la destruction de la membrane muqueuse de l'estomac* (dans les *Mémoires et recherches anatomico-pathologiques*); Padioleau, *Traité de la gastrite* (1 vol. in-8°).

— **Art vétér.** Le chien est plus souvent affecté de *gastrite* que les autres animaux; après lui c'est le cheval qui est soumis le plus souvent à cette affection. Le ruminant, le gallinacé, le pachydermique soit éteint, l'estomac néanmoins ne reprend point ses fonctions; il semble alors que ce viscère soit frappé d'atonie. C'est dans ces conditions qu'il convient de prescrire une nourriture légèrement stimulante; en outre, on donnera les préparations de kina et les ferrugineux, etc.; mais on ne devra jamais employer ce moyen qu'avec prudence et comme *à tâtons*, jusqu'à ce qu'une amélioration évidente ayant suivi leur emploi, on puisse les prescrire avec plus de confiance. »

— *Gastrite chronique ulcéreuse.* Cette forme de *gastrite* est due à la présence d'une ulcération sur la paroi interne de l'estomac. C'est Cruveilhier qui, le premier, a distingua du cancer cette espèce d'ulcération.

L'ulcère de l'estomac se développe quelquefois à la suite d'une contusion violente ou après l'ingestion d'une substance irritante et caustique. Cette lésion s'observe rarement dans le jeune âge; elle est plus fréquente dans l'âge mûr et la vieillesse. Elle est moins commune en France qu'en Angleterre, en Allemagne et dans les pays du Nord. La différence tient peut-être aux habitudes de régime. La femme, d'après les observations de Brinton, y serait plus sujette que l'homme.

Dans la *gastrite* ulcéreuse, la douleur est constante, à moins que l'ulcération ne soit très-peu étendue. Elle siége toujours au voisinage de l'appendice xiphoïde; elle est exaspérée par la pression et par la présence des aliments. Elle diminue toujours lorsque, par les vomissements ou la digestion, l'estomac s'est débarrassé des matières solides en contact avec l'ulcère. Si celui-ci est peu étendu en largeur et en profondeur, il peut se produire sans accident et rester à l'état latent. Lorsque la douleur est vive, les malades la comparent à une brûlure, à une déchirure ou à une morsure. Ils la calment quelquefois en fléchissant le tronc sur les jambes, ou bien par la position horizontale. Elle correspond le plus souvent à un point douloureux du rachis. En même temps que la douleur, il existe des renvois acides, de la perte d'appétit, des nausées et des vomissements. Ceux-ci sont d'abord composés de matières alimentaires, mais bientôt ils sont mélangés avec du sang en plus ou moins grande quantité. Quelquefois il survient une véritable hémorragie, et les malades rejettent des flots de sang tantôt noir, tantôt rouge, liquide ou en caillots. S'il ne s'opère qu'un léger suintement sanguin à la surface de l'ulcère, le liquide épanché se mêle au mucus peu à peu aux substances alimentaires, et les vomissements sont alors noirâtres, semblables à de la suie. Si la digestion a lieu, ces matières s'échappent par les selles, qui sont noires, et l'hémorragie passe souvent inaperçue. Il se fait parfois une perforation de l'estomac, et le cas est inévitablement mortel, lorsque antérieurement il ne s'est pas opéré d'adhérences avec les organes voisins.

L'ulcère simple est toujours une lésion grave, en raison des accidents qu'il peut produire. Quoique sa marche soit ordinairement très-lente, les malades ne tardent pas à éprouver les funestes effets des troubles digestifs. Ils maigrissent et dépérissent de jour en jour. Il en est qui vomissent invariablement après chaque repas et rejettent tous les aliments qu'ils prennent, ce qui amène bientôt d'épuisement. D'autres sont emportés tout à coup par une gastrorrhagie ou une péritonite consécutive à une perforation stomacale. Cependant les guérisons ne sont pas rares. L'ulcération se cicatrise, et, si la perte de substance n'est pas trop considérable, qu'elle ne siége pas surtout du côté du pylore ou la cicatrice pourrait diminuer de calibre, le malade peut recouvrer la santé comme par le passé. La durée de cette affection est indéterminée; elle est surtout sujette à récidive.

La première indication à remplir dans le traitement de la *gastrite* ulcéreuse, c'est de calmer les douleurs. L'opium réussit le plus souvent. On soumet ensuite les malades au régime lacté. Le lait agit comme tonique et comme adoucissant; il suffit ordinairement pour alimenter les individus. Graveilhier et Rokitanski le recommandent également. On le donne froid ou chaud, frais ou bouilli, selon que les malades le peuvent plus ou moins supporter. On le coupe quelquefois avec de l'eau de Vichy. Lorsque les malades ne peuvent pas le supporter, on le remplace par des gelées, des fécules, des bouillons de poulet, des boissons mucilagineuses, etc., jusqu'à ce que les aliments solides commencent à être tolérés. Rokitanski conseille en outre d'appliquer à l'épigastre des vésicatoires, des cautères et des moxas.

— Bibliogr. Andral, *Clinique médicale* (1837, 3e édition, t. IV, p. 14 166); Andral, *Cours de pathologie interne* (1843, 2e édit.); Frank, *Traité de pathologie interne* (t. V); Broussais, *Histoire des phlegmasies chroniques* (1836, 6e édit., 3 vol. in-8°); Louis, *Du ramollissement avec amincissement et de la destruction de la membrane muqueuse de l'estomac* (dans les *Mémoires et recherches anatomico-pathologiques*); Padioleau, *Traité de la gastrite* (1 vol. in-8°).

— **Art vétér.** Le chien est plus souvent affecté de *gastrite* que les autres animaux; après lui c'est le cheval qui est soumis le plus souvent à cette affection. Le ruminant, le gallinacé, le pachydermique soit éteint, l'estomac néanmoins ne reprend point ses fonctions; il semble alors que ce viscère soit frappé d'atonie. C'est dans ces conditions qu'il convient de prescrire une nourriture légèrement stimulante; en outre, on donnera les préparations de kina et les ferrugineux, etc.; mais on ne devra jamais employer ce moyen qu'avec prudence et comme *à tâtons*, jusqu'à ce qu'une amélioration évidente ayant suivi leur emploi, on puisse les prescrire avec plus de confiance. »

— *Gastrite chronique ulcéreuse.* Cette forme de *gastrite* est due à la présence d'une ulcération sur la paroi interne de l'estomac. C'est Cruveilhier qui, le premier, a distingua du cancer cette espèce d'ulcération.

L'ulcère de l'estomac se développe quelquefois à la suite d'une contusion violente ou après l'ingestion d'une substance irritante et caustique. Cette lésion s'observe rarement dans le jeune âge; elle est plus fréquente dans l'âge mûr et la vieillesse. Elle est moins commune en France qu'en Angleterre, en Allemagne et dans les pays du Nord. La différence tient peut-être aux habitudes de régime. La femme, d'après les observations de Brinton, y serait plus sujette que l'homme.

Dans la *gastrite* ulcéreuse, la douleur est constante, à moins que l'ulcération ne soit très-peu étendue. Elle siége toujours au voisinage de l'appendice xiphoïde; elle est exaspérée par la pression et par la présence des aliments. Elle diminue toujours lorsque, par les vomissements ou la digestion, l'estomac s'est débarrassé des matières solides en contact avec l'ulcère. Si celui-ci est peu étendu en largeur et en profondeur, il peut se produire sans accident et rester à l'état latent. Lorsque la douleur est vive, les malades la comparent à une brûlure, à une déchirure ou à une morsure. Ils la calment quelquefois en fléchissant le tronc sur les jambes, ou bien par la position horizontale. Elle correspond le plus souvent à un point douloureux du rachis. En même temps que la douleur, il existe des renvois acides, de la perte d'appétit, des nausées et des vomissements. Ceux-ci sont d'abord composés de matières alimentaires, mais bientôt ils sont mélangés avec du sang en plus ou moins grande quantité. Quelquefois il survient une véritable hémorragie, et les malades rejettent des flots de sang tantôt noir, tantôt rouge, liquide ou en caillots. S'il ne s'opère qu'un léger suintement sanguin à la surface de l'ulcère, le liquide épanché se mélange