des copies. On en trouve à la Bibliothèque de la rue Richelieu une traduction française manuscrite sans date, portant le numéro 7.897, et ayant pour titre : *Colloque de Jean Bodin entre sept savants qui sont de différents sentiments. L'Heptaplomeres* a été réfuté par Huet, évêque d'Avranches, en 1679, dans l'ouvrage intitulé *Demonstratio evangelica*, et par Diocmann, dans une thèse de théologie, en 1684. Il a attiré l'attention de Milton, de la reine Christine, de Hugo Grotius et de Leibnitz. Grotius le déclare *legi dignissimum*. Leibnitz, après une première lecture (1671), écrit à Antoine Arnaud qu'il lui paraît *plus savant que pieux* (*plus habent doctrinæ quam pietatis*). Il ajoute même qu'il en craint la publication, comme un *danger public* pour la foi chrétienne (*Vereor ne edatur aliquando liber hic, magno publico damno*). Plus tard (1714), il revient sur ce jugement de sa jeunesse, et émet à trois reprises différentes le vœu que l'*Heptaplomeres* trouve enfin un éditeur. Jean Reynaud, dans l'*Encyclopédie nouvelle*, parle du mystérieux ouvrage de manière à prouver qu'il ne le connaissait pas même superficiellement. M. Baudrillart en a donné une analyse exacte et intéressante.

HEPTARCHIE s. f. (è-ptar-chî — du gr. *hepta*, sept; *archia*, commandement). Gouvernement simulané ou alternatif de sept personnes.

HEPTARCHIE, dénomination par laquelle on désigne les sept royaumes fondés par les Anglo-Saxons dans la Grande-Bretagne, du Ve au VIIe siècle. Vers la fin du IVe siècle, l'empire romain, attaqué sur tous les points par les Barbares d'Europe et d'Asie, fut contraint de retirer ses légions de la Grande-Bretagne pour faire face à ses nombreux assaillants; les Bretons, abandonnés à leur propre force, amollis et dépouillés d'énergie par la domination romaine, s'affaiblirent encore par des luttes intestines. Les Saxons s'établirent d'abord, puis les Angles, firent alors irruption dans la Grande Bretagne, et les premiers y formèrent les quatre États de Kent, Sussex, Essex et Wessex; les seconds formèrent les trois États de Northumberland, Estanglie et Mercie. Il serait aussi long que fastidieux de donner ici la nomenclature des rois qui ont successivement porté pendant près de quatre siècles les sept couronnes Egbert, dernier rejeton de toutes ces familles royales, régna seul sur les sept royaumes à l'ensemble desquels une assemblée nationale, origine des parlements, donna le nom d'*Angleterre*. L'Heptarchie finit ainsi, l'an 830, après une durée de 381 ans. Le grand Egbert, comme l'appellent les Anglais, se montra digne de sa fortune en repoussant l'invasion des Danois.

HEPTARCHIQUE adj. (è-ptar-chi-ke — rad. *heptarchie*). Qui a rapport à l'heptarchie : *Gouvernement* HEPTARCHIQUE. *La confédération* HEPTARCHIQUE.

HEPTASTÉRIE s. f. (è-pta-sté-rî — du gr. *hepta*, sept; *asterias*, étoile). Infus. Genre d'infusoires, de la famille des bacillariés.

HEPTASYLLABE adj. (è-pta-si-la-be — du gr. *hepta*, sept, et de *syllabe*). Prosod. Qui a sept syllabes : *Vers* HEPTASYLLABE.

HEPTATRÈME s. f. (è-pta-trè-me — du gr. *hepta*, sept; *trêma*, trou). Ichthyol. Syn. de MYXINE.

HEPTAULAQUE s. m. (è-ptô-la-ke — du gr. *hepta*, sept; *aulax*, sillon). Entom. Genre d'insectes coléoptères pentamères, de la famille des lamellicornes, tribu des scarabées, dont plusieurs espèces habitent l'Europe.

HEPTODONTE s. f. (è-pto-don-te — du gr. *hepta*, sept; *odous, odontos*, dent). Entom. Syn. d'HEPTODE.

HEPTYLAMINE s. f. (è-pti-la-mi-ne — de *heptyle*, et de *amine*). Chim. Ammoniaque composée, qui dérive de l'ammoniaque ordinaire par la substitution de l'heptyle $C^{7}H^{15}$ à l'hydrogène.

— Encycl. L'*heptylamine* a pour formule $C^{7}H^{15}AzH^{2}$. On peut l'obtenir en chauffant au bain d'huile de l'iodure d'heptyle saturé de gaz ammoniac, et soumettant le produit à l'action de l'oxyde d'argent pour en éliminer l'iode. On l'obtient encore en maintenant à 120°, pendant plusieurs jours, dans des tubes scellés, du chlorure d'heptyle saturé d'ammoniaque. Il se forme à la fois les chlorures des quatre heptyl-ammoniums, mais le chlorure d'heptyl-ammonium $C^{7}H^{15}AzH^{3}.Cl$ est de beaucoup le plus abondant. Ce sel est facilement soluble dans l'eau et l'alcool et cristallise en petites écailles. Distillé avec de la potasse caustique, il donne l'*heptylamine* libre.

L'*heptylamine* est une huile légère, d'une odeur ammoniacale aromatique et d'une saveur brûlante. Elle bout entre 145° et 147°, et se dissout modérément dans l'eau, d'où la potasse la précipite de nouveau.

Le chloroplatinate d'heptyl-ammonium $(C^{7}H^{15}.AzH^{3}.Cl)PtCl^{4}$ est légèrement soluble dans l'eau froide, très-soluble dans l'eau chaude, dans l'alcool et dans l'éther. Il se dépose de ces dernières dissolutions en petits cristaux jaunes, qui s'attachent la forme d'écailles.

HEPTYLE s. m. (è-pti-le). Chim. Nom donné au radical qui fonctionne dans l'alcool heptylique et ses dérivés. *L'Hydrure d'heptyle*, l'carbure d'hydrogène homologue avec le gaz des marais, et qui peut être considéré comme le pivot de toute la série saturée à 7 atomes de carbone.

— Encycl. L'hydrure *d'heptyle* a pour formule $C^{7}H^{16}$. C'est le septième hydrocarbure saturé de la série $C^{n}H^{2n+2}$ (v. HYDROCARBURES). Cet hydrocarbure est le pivot de tous les corps saturés à 7 atomes de carbone. En effet, si l'on y remplace H par un métalloïde ou par un résidu halogénique d'acide ou de l'oxhydryle, on obtient l'alcool ou les éthers heptyliques. Si maintenant, dans ces divers corps, on suppose un atome d'oxygène (O'' substitué à H^{2}), on obtient l'acide œnanthylique, le chlorure d'œnanthyle, les anhydrides doubles, etc.

— I. PRÉPARATION. L'hydrure *d'heptyle* fait partie du pétrole d'Amérique. Schorlemmer l'a rencontré dans les huiles légères extraites du goudron d'une houille anglaise (le *cannel-coal* de Wigan en Lancashire). Enfin, M. Wurtz a reconnu qu'il se forme, en même temps que plusieurs de ses homologues, dans la distillation de l'alcool amylique sur le chlorure de zinc.

1° *Extraction du pétrole d'Amérique.* MM. Pelouze et Cahours ont pu extraire, par distillation fractionnée, du pétrole d'Amérique, douze hydrocarbures saturés allant de l'hydrure de tétryle $C^{4}H^{10}$, bouillant à quelques degrés au-dessus de 0, jusqu'à l'hydrure de pentadécyle $C^{15}H^{32}$, qui bout entre 255° et 260°, et ils ont constaté la présence d'hydrocarbures moins volatils encore, qu'ils n'ont pas isolés. Quand on se propose de préparer l'hydrure *d'heptyle*, il faut recueillir ce qui passe à la distillation entre 85° et 105°, et répéter un grand nombre de fois les rectifications en fractionnant de nouveau ce premier produit. On obtient ainsi une huile qui, agitée avec de l'acide sulfurique, lavée à l'eau et desséchée, distille entre 92° et 94°. Cette huile peut être considérée comme de l'hydrure *d'heptyle* à peu près pur.

2° *Extraction de l'huile légère de cannel-coal.* Ces huiles renferment des hydrocarbures amylènes, benzine, toluène, etc., en même temps que les hydrocarbures saturés gras $C^{n}H^{2n+2}$. On les abandonne d'abord pendant plusieurs jours au contact de l'acide sulfurique, en agitant souvent, puis on les décante, on les lave, on les dessèche et on les distille. Le liquide distillé est agité à plusieurs reprises avec de l'acide azotique fumant, qui dissout les carbures aromatiques à l'état de produits nitrés. Quand l'acide nitrique, qui a servi au lavage de l'huile, ne précipite plus par l'eau, on peut être sûr qu'il ne renferme plus ni nitrobenzine, ni corps analogues, et que, par conséquent, l'hydrocarbure que l'on a est absolument exempt de composés aromatiques. On le lave à l'eau, on le dessèche et on le rectifie sur du sodium. Soumis à la distillation fractionnée, ce liquide donne de l'hydrure d'amyle $C^{5}H^{12}$, volatil à 39°-40°, de l'hydrure d'hexyle $C^{6}H^{14}$ volatil à 68°-70°, de l'hydrure *d'heptyle* volatil à 98°-99° et de l'hydrure d'octyle volatil à 119°-120°.

3° *Préparation au moyen de l'alcool amylique.* Lorsqu'on traite l'alcool amylique par le chlorure de zinc et qu'on distille le mélange pour préparer l'amylène, on obtient en fait un liquide très-complexe, qui renferme l'amylène $C^{5}H^{10}$, et un grand nombre de ses homologues supérieurs, l'hydrure d'amyle $C^{5}H^{12}$ et un grand nombre de ses homologues; enfin, des produits moins hydrogénés que l'amylène, et qui n'ont pas été étudiés. La production de ces corps explique celle des hydrures. Normalement, il devrait simplement se former de l'amylène par soustraction d'eau à l'alcool amylique; mais si une portion de l'amylène se transforme en un produit moins hydrogéné, on conçoit que l'hydrogène abandonné par cette portion de l'amylène se porte sur une autre partie du même corps ou de ses homologues et fournisse la série des hydrures.

Pour extraire l'hydrure *d'heptyle* de ce mélange, on le traite à froid par le brome. Ce liquide se combine avec l'amylène et ses homologues en donnant des produits peu volatils, dont on peut facilement séparer les hydrures par une distillation, en soumettant ensuite ces derniers à une série de distillations fractionnées, on en extrait les hydrures d'amyle $C^{5}H^{12}$, d'hexyle $C^{6}H^{14}$, *d'heptyle* $C^{7}H^{16}$, etc.

— II. PROPRIÉTÉS. L'hydrure *d'heptyle* est un liquide léger, mobile, d'une odeur à la fois faible et agréable. Il brûle avec une flamme brillante, quoique fuligineuse. Sa densité = 0,7122 à 16° et 0,709 à 179,5. Il bout entre 98° et 99° suivant Schorlemmer, entre 92° et 94° suivant Pelouze et Cahours. Sa densité de vapeur expérimentale est 3,49-3,59 d'après Schorlemmer, et 3,16 d'après Pelouze et Cahours; le calcul exigerait 3,46. Le chlore, ou mieux encore le chlorure d'iode, le convertit en chlorure *d'heptyle* (v. HEPTYLIQUES, ETHERS). Il se forme en même temps des produits de substitution plus avancés. Ces derniers composés, distillés sur du sodium, donnent un liquide volatil entre 95° et 100°, qui a l'odeur et la composition de l'heptylène.

$$C^{7}H^{14}Cl^{2} + Na^{2} = 2NaBr + C^{7}H^{14}$$
Hydrure d'heptyle bichloré. Sodium. Bromure de sodium. Heptylène.

Avec le brome, l'hydrure *d'heptyle* paraît se comporter comme avec le chlore, c'est-à-dire paraît donner du bromure *d'heptyle* $C^{7}H^{15}.Br$.

HEPTYLÈNE s. m. (è-pti-lè-ne — rad. *heptyle*). Chim. Hydrocarbure homologue de l'éthylène, qui dérive de l'alcool heptylique par soustraction d'une molécule d'eau.

— Encycl. L'*heptylène*, encore connu sous le nom d'œnanthylène, a pour formule $C^{7}H^{14}$; il appartient à la série des hydrocarbures homologues $C^{n}H^{2n}$, série dont fait aussi partie l'éthylène $C^{2}H^{4}$ ou gaz oléfiant. Cet hydrocarbure se rencontre dans l'huile qui provient de la distillation du boghead, où il est mélangé à plusieurs autres hydrogènes carbonés $C^{n}H^{2n+2}$ (hydrocarbures saturés), $C^{n}H^{2n-6}$ (hydrocarbures aromatiques) et $C^{n}H^{2n}$ (hydrocarbures amylogènes); enfin, on l'obtient encore, en outre, été obtenu au moyen du chlorure d'heptyle ou de l'alcool heptylique, et M. Wurtz l'a trouvé dans les produits de la distillation de l'alcool amylique en présence du chlorure de zinc.

— I. PRÉPARATION. 1° *Au moyen de l'huile de boghead.* On traite cette huile par le brome en présence de l'eau. Les hydrocarbures

$$C^{n}H^{2n}$$

se transforment en bromures peu volatils, tandis que les carbures

$$C^{n}H^{2n+2} \text{ et } C^{n}H^{2n-6}$$

restent inaltérés et peuvent être aisément séparés des bromures par distillation. Distillés en présence de la potasse alcoolique d'abord, puis sur du sodium, ces bromures abandonnent les éléments du bromure $C^{7}H^{15}.Br$ à l'état de liberté. On soumet ensuite ces hydrocarbures à la distillation fractionnée, de manière à en extraire l'hexylène, qui bout vers 71°, et l'*heptylène*, qui bout vers 99°.

2° *Au moyen de l'alcool amylique.* Après avoir distillé l'alcool amylique sur du chlorure de zinc, et rectifié à plusieurs reprises le produit huileux sur du sodium, on opère sur lui absolument de la même manière que sur l'huile de boghead.

3° *Au moyen de l'alcool heptylique.* On mélange l'alcool heptylique avec du chlorure de zinc et l'on distille. Le produit rectifié une fois ou deux est de l'*heptylène* pur

$$C^{7}H^{15}.OH = H^{2}O + C^{7}H^{14}.$$
Alcool heptylique. Eau. *Heptylène.*

4° *Au moyen du chlorure d'heptyle.* Nous avons déjà vu, en nous occupant de cet éther, que, chauffé à 180° pendant plusieurs jours, en vases clos, une lessive concentrée de potasse, il donne de petites quantités *d'heptylène*. Si, au lieu de chlorure d'heptyle, on prend du chlorure d'heptyle monochloré obtenu par l'action du chlore sur l'hydrure d'heptyle, et qu'on distille ce corps sur du sodium, on obtient aussi de l'*heptylène*.

$$C^{7}H^{14}Cl^{2} + Na^{2} = 2NaCl + C^{7}H^{14}.$$
Chlorure d'heptyle bichloré. Sodium. Chlorure de sodium. *Heptylène.*

— II. PROPRIÉTÉS. L'*heptylène* est un liquide incolore, mobile, d'une odeur alliacée pour préparer l'amylène, on obtient en fait un liquide très-complexe, qui renferme l'amylène $C^{5}H^{10}$, et un grand nombre de ses homologues supérieurs, l'hydrure d'amyle $C^{5}H^{12}$ et un grand nombre de ses homologues; enfin, des produits moins hydrogénés que l'amylène, et qui n'ont pas été étudiés. La production de ces corps explique celle des hydrures. Normalement, il devrait simplement se former de l'amylène par soustraction d'eau à l'alcool amylique; mais si une portion de l'amylène se transforme en un produit moins hydrogéné, on conçoit que l'hydrogène abandonné par cette portion de l'amylène se porte sur une autre partie du même corps ou de ses homologues et fournisse la série des hydrures.

Pour extraire l'hydrure *d'heptyle* de ce mélange, on le traite à froid par le brome. Ce liquide se combine avec l'amylène et ses homologues en donnant des produits peu volatils, dont on peut facilement séparer les hydrures par une distillation, en soumettant ensuite ces derniers à une série de distillations fractionnées, on en extrait les hydrures d'amyle $C^{5}H^{12}$, d'hexyle $C^{6}H^{14}$, *d'heptyle* $C^{7}H^{16}$, etc.

— II. PROPRIÉTÉS. L'hydrure *d'heptyle* est un liquide léger, mobile, d'une odeur à la fois faible et agréable. Il brûle avec une flamme brillante, quoique fuligineuse. Sa densité = 0,7122 à 16° et 0,709 à 179,5. Il bout entre 98° et 99° suivant Schorlemmer, entre 92° et 94° suivant Pelouze et Cahours. Sa densité de vapeur expérimentale est 3,49-3,59 d'après Schorlemmer, et 3,16 d'après Pelouze et Cahours; le calcul exigerait 3,46. Le chlore, ou mieux encore le chlorure d'iode, le convertit en chlorure *d'heptyle* (v. HEPTYLIQUES, ETHERS). Il se forme en même temps des produits de substitution plus avancés. Ces derniers composés, distillés sur du sodium, donnent un liquide volatil entre 95° et 100°, qui a l'odeur et la composition de l'heptylène.

$$C^{7}H^{14}Cl^{2} + Na^{2} = 2NaBr + C^{7}H^{14}$$
Hydrure d'heptyle bichloré. Sodium. Bromure de sodium. Heptylène.

Avec le brome, l'hydrure *d'heptyle* paraît se comporter comme avec le chlore, c'est-à-dire paraît donner du bromure *d'heptyle* $C^{7}H^{15}.Br$.

En même temps que l'*heptylène* obtenu, il se forme un hydrocarbure, qui paraît être $C^{7}H^{12}$. Cet hydrocarbure se serait formé par une réaction identique à la précédente, par l'action de l'*heptylène* monochloré déjà produit.

$$C^{7}H^{13}Cl + KHO = KCl + H^{2}O + C^{7}H^{12}.$$
Heptylène chloré. Potasse. Chlorure de potassium. Eau. Hydrocarbure.

Le chlorure d'heptylidène ne se décompose pas sensiblement sous l'influence de l'acétate d'argent, même à la température de 220°. Ce caractère démontre bien qu'il se rapproche plus du chlorure d'éthylidène que du chlorure de zinc.

— *Clorheptylène* $C^{7}H^{13}Cl$. Pour l'obtenir, on chauffe, pendant un temps considérable, dans des tubes scellés à la lampe, le chlorure d'heptylidène avec une solution alcoolique très-concentrée de potasse. On ouvre ensuite le tube et l'on en verse le contenu dans une grande quantité d'eau. Il se précipite du chlorheptylène impur, que l'on décante, que l'on dessèche et que l'on soumet à la distillation fractionnée. Le liquide commence à bouillir à 140°; puis la température monte à 150°, où elle se maintient constante pendant quelque temps, puis enfin elle s'élève à 190°. Le liquide qui passe à 190° est l'hydrocarbure $C^{7}H^{12}$, dont nous avons parlé. Celui qui passe vers 152° est le chlorheptylène, et les portions qui bouillent plus haut sont toutes composées de chlorure d'heptylidène échappé à la réaction. On ne parvient à séparer complétement ces trois liquides que par une série de distillations fractionnées.

Le chlorheptylène est un liquide qui ressemble beaucoup à son générateur, le chlorure d'heptylidène, dont il partage l'odeur. Il bout à 155°. Le sodium ne l'attaque point à la température ordinaire; mais, sous l'influence de la chaleur, il l'attaque avec violence en donnant naissance à du chlorure de sodium, ainsi qu'à un liquide qui paraît être opposé par la formule $C^{7}H^{12}$. Telle est, au moins, l'opinion de M. Faget; mais M. Wurtz a trouvé des résultats différents. En soumettant les réactions qui passent au-dessus de 122°, c'est-à-dire au-dessus du point d'ébullition de l'alcool amylique, il a vu ces portions se réduire en sels divers et en alcools amyliques. Il en a conclu que ces portions ne renfermaient que des éthers amyliques que l'on avait confondus avec les alcools supérieurs de la même série.

2° *Par l'action de l'hydrogène naissant sur l'œnanthol.* C'est la meilleure méthode pour

obtenir l'alcool *heptylique* pur. Elle est due à MM. Bouis et Carlet. Ces chimistes ont uni du zinc et de l'acide acétique, et obtiennent ainsi de l'acétate d'heptyle, qu'on distille avec une solution de potasse. Cet éther se saponifie et l'alcool, devenu libre, distille.

2° *Au moyen de l'hydrure d'heptyle.* Lorsqu'on soumet à l'action du chlore l'hydrure d'heptyle $C^{7}H^{16}$ que l'on extrait, par la distillation fractionnée, des pétroles d'Amérique, on obtient, entre autres produits, le chlorure d'heptyle $C^{7}H^{15}Cl$. Ce chlorure, soumis à l'action de l'acétate d'argent, donne du chlorure d'argent et de l'acétate d'heptyle. Ce dernier éther est ensuite saponifié comme ci-dessus.

— II. PROPRIÉTÉS DU MÉLANGE DES ALCOOLS OCTYLIQUE ET HEPTYLIQUE. C'est un liquide incolore, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Les nombres qui représentent le point d'ébullition, la densité et la densité de vapeur de ce liquide varient suivant les auteurs qui les ont donnés. Cela se comprend, le produit n'étant pas un composé défini, mais un mélange qui probablement varie avec chaque nouvelle préparation. Toutefois, comme le point d'ébullition est situé vers 178° et que, d'après la loi de Kopp, l'alcool *heptylique* devrait bouillir à 173°, on est porté à penser que l'alcool obtenu au moyen de l'huile de ricin est un alcool primaire, tandis que l'alcool obtenu au moyen des acétates de vin de marais serait un alcool secondaire, à cause de son point d'ébullition moins élevé (153°-160°); distillé avec le chlorure de zinc, l'alcool *heptylique* fournit de l'heptylène, $C^{7}H^{14}$; chauffé avec de la potasse, il dégage de l'hydrogène et se convertit en acide œnanthylique $C^{7}H^{14}O^{2}$. Le chlorure et l'iodure de phosphore le transforment en chlorure et iodure d'heptyle. Enfin l'acide sulfurique le convertit en acide heptyl-sulfurique $SO^{4}.C^{7}H^{15}.H$.

— **Ethers heptyliques.** Comme les alcools, les éthers *heptyliques* peuvent être divisés en trois classes : éthers proprement dits, éthers simples, éthers composés. La première classe devrait renfermer l'oxyde d'heptyle, mais ce corps n'est pas connu; la deuxième classe renferme les sels haloïdes, et la troisième les sels amphides qui ont pour base le radical d'alcool *heptylique*, $C^{7}H^{15}O$. Parmi les éthers simples, on connaît le chlorure, le bromure et l'iodure d'heptyle; parmi les éthers composés, l'acétate et l'acide heptyl-sulfurique. Enfin il existe un éther mixte heptyl-amylique qui, à lui seul, forme une quatrième classe. Nous passerons en revue ces divers corps.

— *Chlorure d'heptyle.* I. PRÉPARATION. On peut l'obtenir de diverses manières : 1° on traite l'alcool *heptylique* par le perchlorure de phosphore, on lave le produit de la réaction, on le dessèche et on le distille; 2° on fait agir le chlore, ou mieux le chlorure d'iode, sur l'hydrure d'heptyle. A cet effet, on dissout de l'iode dans cet hydrocarbure et l'on dirige un courant de chlore à travers la liqueur en ayant soin de ne pas employer ce gaz en excès. On distille ensuite pour le débarrasser de l'hydrure d'heptyle inattaqué, et l'on sépare le chlorure d'heptyle des produits de substitution plus avancés, en soumettant à la distillation fractionnée la portion de liquide qui passe entre 140° et 160° à la première rectification. Au lieu d'hydrure d'heptyle, on peut employer l'éthyl-amyle.

— II. PROPRIÉTÉS. Le chlorure d'heptyle est un liquide incolore d'une agréable odeur de fruit. Il brûle avec une flamme fuligineuse bordée de vert. Sa densité = 0,891 à 19° et 0,9983 à 55°. Ces deux densités prises par deux observateurs différents ne concordent pas, ce qui prouve que les auteurs n'ont opéré ni l'un ni l'autre sur des produits bien purs.

Le chlorure d'heptyle obtenu au moyen de l'alcool *heptylique* fourni par la distillation des ricinoléates bout à 175°. Celui que l'on prépare au moyen de l'hydrure d'heptyle et de l'éthyl-amyle bout, au contraire, à 150°. Cette différence entre les points d'ébullition semble indiquer qu'il existe deux chlorures d'heptyle isomères, l'un dérivant d'un alcool normal, le premier; l'autre dérivant d'un pseudo-alcool ou alcool secondaire. Toutefois, il est à remarquer que ni l'un ni l'autre de ces chlorures n'a le point d'ébullition que l'on pourrait calculer au moyen de la loi de Kopp. D'après cette loi, la différence entre les points d'ébullition de deux éthers chlorhydriques consécutifs est de 30° environ, le chlorure d'éthyle bouillant à 11° et le chlorure d'amyle à 101°; ce qui donne 90 degrés de différence pour 3 termes ou $\frac{90}{3} = 30$ pour un seul terme.

D'après cela, le chlorure d'heptyle devrait bouillir à 161°. Il est d'ailleurs fort possible qu'il en soit ainsi. Nous avons dit, en nous occupant de l'alcool *heptylique*, que le liquide regardé comme tel est vraisemblablement un mélange de deux alcools, les alcools *heptylique* et octylique. Il est donc probable que le chlorure d'heptyle volatil à 175° est un mélange de chlorure d'heptyle et de chlorure d'octyle. Il est à remarquer d'ailleurs que le 175e degré est une température intermédiaire entre 161°, point d'ébullition calculé du chlorure d'heptyle, et 191°, point d'ébullition calculé, de la même manière, du chlorure d'octyle.

Le chlorure d'heptyle est insoluble dans l'eau et facilement miscible à l'alcool et à l'éther. Chauffé en vase clos avec de l'acétate de potasse dissous aussi dans l'alcool, soit dans l'acide acétique cristallisable, il donne du chlorure de potassium et de l'acétate d'heptyle; l'acétate d'argent peut être substitué, dans cette réaction, à l'acétate de potasse. Avec la solution alcoolique du sulfhydrate de potassium, il fournit le mercaptan *heptylique* ou sulfhydrate d'heptyle. La potasse aqueuse l'altère peu, même à la température de 180°. Même au bout de plusieurs jours, on ne trouve pas qu'il se soit formé d'alcool *heptylique*, et tout au plus une petite quantité d'heptylène se produit-elle.

— III. CHLORURE D'HEPTYLE MONOCHLORÉ $C^{7}H^{14}Cl.Cl$. Ce corps est isomérique avec le chlorure d'heptylène $C^{7}H^{14}Cl^{2}$. On l'obtient en même temps que le chlorure d'heptyle dans l'action du chlorure d'iode sur l'éthyl-amyle. Il bout à 190°.

— *Bromure d'heptyle* $C^{7}H^{15}Br$. Pour préparer ce corps, on ajoute 2 molécules de brome à 1 molécule d'hydrure d'heptyle et l'on chauffe le mélange à 100° en vase clos, ou bien on l'expose aux rayons directs du soleil. De l'acide bromhydrique se dégage et du bromure d'heptyle prend naissance. La réaction est beaucoup plus facile si l'on ajoute un peu d'iode à la liqueur. En soumettant le produit à la distillation, on en extrait d'abord une grande quantité d'hydrure d'heptyle inaltéré. La température s'élève ensuite, et lorsqu'elle atteint 110° on remarque que le résidu dans la cornue noircit et commence à se décomposer.

— *Iodure d'heptyle* $C^{7}H^{15}I$. On prépare ce corps en faisant agir l'iode de phosphore sur l'alcool *heptylique*; c'est un liquide incolore plus lourd que l'eau, qui bout rapidement au contact de l'air et qui bout entre 190 et 192°. L'azotate d'argent le décompose instantanément, en en précipitant de l'iodure d'argent.

— *Acétate d'heptyle*

$$C^{7}H^{15}O.OC^{7}H^{15} = C^{7}H^{16}O^{2}.$$

— I. PRÉPARATION. On a obtenu cet éther soit par double décomposition au moyen du chlorure d'heptyle, soit en fixant de l'hydrogène naissant sur l'œnanthol en présence de l'acide acétique.

1° *Au moyen du chlorure d'heptyle.* On chauffe un mélange d'acétate de potasse, d'acide acétique cristallisable et de chlorure d'heptyle, entre 150 et 160° dans un tube scellé à la lampe, pendant douze heures. Les produits de la réaction sont le chlorure de potassium, l'acétate d'heptyle et l'heptylène. On ouvre les tubes, on ajoute de l'eau à leur contenu, on décante l'huile qui se précipite, on la dessèche sur du chlorure de calcium fondu et on la soumet à la distillation fractionnée pour en séparer l'heptylène, ce qui est facile, cet hydrocarbure bouillant à 95°, tandis que l'acétate d'heptyle bout vers 180°. On peut, dans cette opération, remplacer l'acide acétique cristallisable par l'alcool; mais la décomposition du chlorure est alors plus difficile et exige une température de 200 degrés pour devenir tout à fait complète.

2° *Au moyen de l'œnanthol.* Cette méthode fournit de l'acétate d'heptyle tout à fait pur. Elle consiste à chauffer l'aldéhyde œnanthylique $C^{7}H^{14}O$ avec du zinc et de l'acide acétique cristallisable. L'hydrogène naissant se porte sur l'œnanthol, qui se transforme en alcool *heptylique*, et ce dernier, au contact de l'acide acétique en excès, donne de l'acétate d'heptyle. On précipite la solution acide par l'eau, on débarrasse l'huile qui se sépare de l'aldéhyde œnanthylique indécomposée, en la lavant à plusieurs reprises avec du bisulfite de soude; enfin, on la dessèche et on la distille.

— II. PROPRIÉTÉS. L'acétate d'heptyle est un liquide incolore, plus léger que l'eau et d'une agréable odeur de fruit. Il bout à 180°, c'est-à-dire 10° plus haut qu'il ne devrait d'après la loi de Kopp. Distillé avec une lessive de potasse, il donne de l'acétate de potassium et de l'alcool *heptylique*.

— *Acide heptyl-sulfurique*

$$SO^{2}\Big\}\begin{matrix}OH\\OC^{7}H^{15}\end{matrix}.$$

On l'obtient en traitant par l'acide sulfurique l'alcool *heptylique*. On ajoute avec précaution 1 partie d'acide sulfurique concentré à 2 parties d'alcool *heptylique*; le mélange doit être refroidi, afin qu'il ne se dégage pas d'anhydride sulfureux. Il se sépare au bout d'un certain temps un deux couches dont la supérieure contient l'acide heptyl-sulfurique. On le neutralise par un léger excès d'eau de baryte, on précipite l'excès de cette base au moyen de l'anhydride carbonique, on filtre et l'on concentre à une douce chaleur. L'heptyl-sulfate de baryum se sépare en petits cristaux blancs, flexibles, en forme d'écailles. Leur éclat est nacré, leur saveur amère; ils sont solubles dans l'eau, d'où ils ne sont précipités ni par l'alcool ni par l'éther. La solution aqueuse d'heptyl-sulfate de baryum se décompose par l'évaporation, à moins que la température ne soit très-peu élevée. Le sel sec est stable au contact de l'air. Il commence à s'altérer vers 80° en prenant des teintes rouges d'abord, puis noires, et en émettant une odeur très-forte. D'après Bouis et Carlet, une odeur très-forte. D'après Bouis et Carlet, une odeur très-forte. D'après Bouis et Carlet,