

Malgré ses témoignages probants, quelques érudits, parmi lesquels Caillet, dans ses *Mémoires du Languedoc*, et La Faille, dans ses *Annales de Toulouse*, ont révoqué en doute l'existence même d'Isaïre. Il nous suffira de rappeler, avec dom Youssef, l'existence d'un séjour d'Isaïre au xv^e siècle, Benoît, qui fut son contemporain, examinant dans un traité de jurisprudence si l'on peut faire un legs à une ville pour la célébration de jeux annuels, s'en réfère à l'exemple des capitouls de Toulouse acceptant celui de Clémence Isaïre : *Prout illustris mulier illa fecit domina Clementia d'Alzama civis Tolosana*. D'un autre côté, Étienne Doler fit, en 1527, un éloge en vers latins de Clémence Isaïre; c'est presque un témoignage contemporain, puisque la mort de celle-ci doit se placer entre 1498 et 1513.

ISAURIE (*Isauria*), ancienne contrée de l'Asie Mineure, dans les montagnes du Taurus, entre la Pamphlie et la Cilicie, célèbre dans l'antiquité par les habitudes de brigandage de ses habitants. Suivant les géographes anciens, l'Isaurie n'avait primitivement que deux villages; mais ces deux villages commandaient à beaucoup d'autres. Les Romains ne subjuguèrent les Isauriens qu'après de terribles guerres, sous les régnes de Probus et de Gallus. Publius Servilius conquit tout le pays et détruisit la plupart des forts de pirates qui étaient sur la mer, ce qui valut le surnom d'Isaurique. Sous les empereurs grecs, l'Isaurie s'accrut considérablement, et compta jusqu'à 23 villes, parmi lesquelles Scétézie, la métropole, était fort importante.

Les Isauriens devinrent la terreur de Constantinople, comme les prétoriens furent celle de Rome. Mais leur pouvoir fut beaucoup moins long. Ils donnèrent l'empire à Zénon (474-491), vénére de Léon tel, qui avait lui-même été créé Auguste par un Bulgare. Ils rétablirent Zénon, quand la veuve de Léon I^{er} eut fait empereur Basileusos.

ISAURIENS, nom d'une dynastie qui a régné à Constantinople de 717 à 820. Elle reçut son nom de ce que son chef, Léon III l'Iconaste, était né en Isaurie.

ISAURIQUE s. m. (i-zo-ri-ke). Hist. Tribut que les empereurs d'Orient payaient aux Isauriens, pour les empêcher de faire incursion sur le territoire de l'empire.

ISBA s. f. (i-sba). Maison en bois de sapin, qui habite quelques peuples du nord de l'Europe et de l'Asie. *L'isba consiste généralement en deux maisonnettes reliées entre elles par une petite cour couverte*. (L. Puteaux).

ISOSETH, roi d'Israël, fils de Saül. Il régna sur les dix tribus pendant que David régna sur Juda, et fut tué par deux benjamites, qui portèrent sa tête à David, et furent livrés au supplice, au lieu de la récompense qu'ils attendaient.

ISCA, rivière de l'ancienne Bretagne romaine, aujourd'hui Exe.

ISCADIDE s. f. (i-ska-di-de). Entom. Genre d'insectes coléoptères tétramères, de la famille des cycliques, tribu des chrysolemes, comprenant trois espèces, qui vivent au Cap de Bonne-Espérance.

ISCA DUMONORIUM, ville de la Bretagne romaine, dans la Bretagne première, sur l'Isca; capitale des Dumoniis. C'est aujourd'hui Exeter.

ISCHALIS ou **ISCHALIS**, nom latin de **ILCHERSTER**.

ISCANUS (Joseph), moine et poète latin du xiv^e siècle, né à Exeter (en latin *Isca*), mort vers 1224. Il a composé un beau poème, *De bello Trojano*, qu'on a imprimé à Bâle, en 1541, in-8°, sous le nom de Cornelius Nepos. L'erreur a été reconnue par Dremesius, qui donna une nouvelle édition de ce poème à Francfort (1623, in-4°), avec le nom du véritable auteur.

ISCARIOTE adj. (i-ska-ri-ote). Géogr. Sont des habitants d'Israël; *On pense que Judas ISCARIOTE était ainsi dit à cause du lieu de sa naissance*.

ISCARIOTH, village de la Palestine, à l'E. de Samarie. Patrie de l'apôtre Judas, dit Iscariote.

ISCARIOTISTE s. m. (i-ska-ri-oti-ste). Hist. relig. Membre d'une secte religieuse qui vénérait Cain, Judas Iscariote et les autres personnages décriés de la Bible.

ISCA SHURUM, ville de la Bretagne romaine, dans la Bretagne IIe, chez les Silures. Aujourd'hui CARLETON.

ISCHAKI s. m. (i-scha-ki). Mamm. Un des noms de l'ongle, en Orient.

ISCHÉLITE s. f. (i-sché-li-te — du nom du bourg d'Ischël ou Ischl, dans la haute Autriche). Miner. Trisulfure de fer, hydrate naturel de potasse, de chaux et de magnésie, ainsi appelé du nom d'une des principales localités où on le trouve. *Syn.* de **POLYBALTRE**.

ISCHÉMIQUE adj. (i-sché-mi-ke — rad. *ischém*, artère; *hémis*, sang). Pathol. Suppression de la circulation du sang dans certaines parties.

ISCHÉMIQUE adj. (i-sché-mi-ke — rad. *ischém*, artère; *hémis*, sang). Pathol. Suppression de la circulation du sang dans certaines parties.

ISCHÉMIQUE adj. (i-sché-mi-ke — rad. *ischém*, artère; *hémis*, sang). Pathol. Suppression de la circulation du sang dans certaines parties.

ISCHÉMIQUE s. f. pl. (i-sché-mi). Antiq. gr. Fêtes qu'on célébrait annuellement à Olympie, en l'honneur d'Ischémus.

ISCHIA, en latin *Ænarja*, *Pithecuæ*, appelée aussi *Iuarina* par Virgile et Homère, île d'Italie, dans la Méditerranée, à l'entrée du golfe de Naples, à 12 kilom. S.-O. du cap Misène, dont la sépare le canal où se trouve la petite île de Procida; 80 kilom. carré, 24,000 hab. Au moyen âge, cette île s'appela *Ischia*, et par corruption Ischia. Quelques auteurs font venir ce mot du grec *isché* à cause de la force de la citadelle. A la diversité de ces noms, dit M. A.-J. Du Pays, a fourni matière à bien des interprétations. Le nom de *Pithecuæ* fut considéré par les Romains comme un indice que cette île était habitée par des singes. Plinè consigna cette étymologie, et prétend que ce nom vient des poteries qu'on y fabriquait. Les savants modernes ont prétendu à leur tour que les Romains n'y étaient rien, et que *Pithecuæ* vient de *pithekuai*, feu à découvert. Ses premiers habitants, venus d'Ébée, en furent chassés par les tremblements de terre : plus tard, une colonie de Syracusains fut aussi chassée par de terribles volcans. Le point le plus élevé de l'île est le mont Epomeo, à 816 mètres au-dessus du niveau de la mer. Du sommet, que couronne l'ermitage Saint-Nicolas, l'on embrasse les montanmas les plus grandioses du monde entier.

Les côtes de l'île sont très-escarpées. Les vallées sont d'une fertilité extraordinaire; il n'y a pas de moins d'une dizaine de cultures. L'Ar d'être heuveux (Saint-Petersbourg, 1831); *Histoire de Russie, mise en récit pour les enfants* (St-Petersbourg, 1836-1839, 3 vols., de la famille des lamellicornes, tribu des scorpions, dont l'espèce type habite la Mexique).

ISCHOPAGENS s. f. (i-sko-pa-je-n) — du gr. *ischos*, grêle; *pagos*, joint. Arachn. Genre d'insectes coléoptères tétramères, de la famille des cycliques, tribu des chrysolemes, formé aux dépens des clythres, et comprenant cinq ou six espèces qui habitent l'Amérique du Sud.

ISCHOPACHYS s. m. (i-ski-o-pa-kiss — du gr. *ischon*, hanche; *pnachis*, épais). Entom. Genre d'insectes coléoptères tétramères, de la famille des cycliques, tribu des chrysolemes, formé aux dépens des clythres, et comprenant cinq ou six espèces qui habitent l'Amérique du Sud.

ISCHOPHONIE s. f. (i-sko-pho-nie) — du gr. *ischos*, grêle; *phônê*, voix). Méd. Gracilité de la voix.

ISCHOPTÈRE s. f. (i-sko-pi-è-re) — du gr. *ischos*, grêle; *ptèra*, aile). Entom. Genre d'insectes orthoptères, formé aux dépens des blattes, et comprenant plusieurs espèces qui habitent l'Amérique du Sud et l'Afrique australe.

ISCHOSCELE s. f. (i-sko-sé-lé-de) — du gr. *ischos*, grêle; *skelos*, jambe). Entom. Genre d'insectes coléoptères pentamères, de la famille des cycliques, tribu des scorpions, dont l'espèce type habite la Mexique.

ISCHOSOME s. f. (i-sko-so-me) — du gr. *ischos*, grêle; *soma*, corps). Entom. *Syn.* de **MYCETOPHORE**.

ISCHOSTOME s. m. (i-sko-sto-me) — du gr. *ischos*, grêle; *stoma*, bouche). Entom. Genre d'insectes coléoptères tétramères, de la famille des lamellicornes, tribu des scarabées, qui habite l'Afrique australe.

ISCHOTÈS s. m. (i-sko-tès) — du gr. *ischos*, grêle; *thés*, trachelus, cou). Entom. Genre d'insectes coléoptères tétramères, de la famille des longicornes, tribu des cérambyx, dont l'espèce type habite l'Australie.

ISCHOTRACHELE s. m. (i-sko-tra-ke-le) — du gr. *ischos*, grêle; *trachelos*, cou). Entom. Genre d'insectes coléoptères tétramères, de la famille des charaçons, dont l'espèce type habite le Sénégal.

ISCHURE s. m. (i-sku-ré) — du gr. *ischos*, grêle; *ourè*, queue). Pathol. Rétenion d'urine; impossibilité d'uriner. *ISCHURE RÉNALE, vésicale, urétrale*.

— *Encecl.* Certains chirurgiens emploient ce mot pour désigner l'impossibilité absolue d'uriner; pour d'autres, le mot *ischurie* veut dire la difficulté extrême d'uriner. Dans la première acception, qui est la plus générale, l'ischurie dépend d'un obstacle existant sur un point du parcours de l'urine; depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein, ou ce liquide se forme, jusqu'au méat extérieur. Aussi distingue-t-on une *ischurie vésicale*, une *ischurie urétrale*, une *ischurie prostaticque* et une *ischurie stricte*. Les causes de cette dernière variété sont le développement de l'urètre, la présence de calculs dans le conduit ou sa contraction dans un point du parcours de l'urine, depuis le rein,

