monium, il reste dans l'appareil à l'état de solution plus ou moins concentrée. Pour le recueillir, il suffit de chauffer légèrement, afin de vaporiser le liquide, qui laisse des cristaux.

Le sulfocyanate d'ammonium obtenu de ses solutions aqueuses concentrées se présente sous forme de cristaux tabulaires, anhydres et très-déliquescents. Ce produit est très-soluble dans l'eau. Si on le mélange dans une proportion convenable avec du chlorure de sodium et qu'on dissolve le tout dans l'eau, il se produit un notable abaissement de température. Le sulfocyanate d'ammonium est également soluble dans l'alcool. Si l'on porte ce sel à une température de 150° environ et qu'on élève progressivement la chaleur de la masse jusqu'à ce point, il se, produit de la sulfonurhumide. Une réaction inverse se produit si l'on chauffe ce dernier composé à 160° environ. Mais, en ce dernier cas, il se produit une série de composés très-complexes et dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

Si, au lieu de s'arrêter vers 160°, on porte la température du sulfocyanate d'ammonium à 180° et même 185° et qu'on maintienne cette température pendant quinze à dix-huit heures environ, ce sel se décompose presque complétement et donne du sulfocyanate de guanidine et du dithiosulfocarbonate d'ammonium. Enfin, quand on soumet le même sulfocyanate à la distillation sèche, il se produit tout d'abord un dégagement d'hydrogène sulfuré et d'ammoniaque en même temps qu'il se forme du sulfure de carbone. Il reste comme résidu du melam qui, si l'on continue d'élever la température, se transforme en hydromellon. Il faut noter que le premier de ces produits résulte évidemment de la décomposition du sulfocyanate de guanidine qui s'est formé vers 185°, comme nous l'avons dit ci-dessus. Dans la distillation du sulfocyanate d'ammonium, il se forme donc, suivant la température à laquelle le produit est porté, des composés distincts. Claus, qui a particulièrement étudié cette intéressante question, nous apprend que, lorsque le sulfocyanate d'ammonium est porté à 200°, il se forme déjà du melam, dont la formule, d'après Gerhardt, est $2C_3H_6Az^6$. Il fait observer, toutefois, que la formation de ce produit marche très-lentement à cette température. Cette production augmente si l'on chauffe à 250°, et elle est d'autant plus active que la température est plus élevée. La production de sulfure de carbone suit la même marche ascensionnelle. En dessous de 200°, la décomposition du sulfocyanate d'ammonium ne présente plus les mêmes caractères; les produits obtenus diffèrent essentiellement et sont généralement volatils; parmi ces derniers, on peut citer l'acide sulfocyanurique.

Quand on traite le sulfocyanate d'ammonium par une solution éthérée de chlorure manganique, il se produit une belle coloration rouge. Avec le chlorure de cobalt, une solution de sulfocyanate d'ammonium se colore en bleu si l'on ajoute quelques gouttes d'éther. Enfin, l'acide molybdique, dissous dans l'acide chlorhydrique, prend une belle teinte rouge si l'on ajoute du sulfocyanate d'ammonium. Si ce mélange est additionné d'éther, celui-ci se sépare du produit coloré et peut être retiré de la masse teintée de rouge. Toutes ces colorations disparaissent si l'on ajoute aux solutions qui les présentent un fluorure alcalin. Le sulfocyanate d'ammonium en solution aqueuse présente des réactions analogues à celles des sulfocyanates sodiques et potassiques.

L'éther azotique décompose le sulfocyanate d'ammonium et met en liberté de l'azote, du protoxyde d'azote, et il reste du persulfocyanogène dont la formule est $C_3HAz_3S_3$.

Le sulfocyanate d'ammonium donne plusieurs sels doubles. Si on le mélange avec une solution de cyanure mercurique, ou mieux si l'on mélange des solutions de ces deux sels, il se forme un produit qui a pour formule $CAzS(AzH^4)+(CAz)^2Hg$ et qui se présente en belles aiguilles blanches. On obtient encore des sels doubles en portant à l'ébullition des solutions concentrées de sulfocyanate d'ammonium, auxquelles on a ajouté une quantité convenable d'oxyde de zinc, de cobalt, d'argent, de magnésium, etc. Il se produit un dégagement d'ammoniaque et il reste du sulfocyanate double d'ammonium et de zinc, d'ammonium et de cobalt, etc. Le sulfocyanate d'ammonium dissout les sels d'argent.

— *Sulfocyanate de potassium* CAzSK. On prépare ce composé : 1° en faisant un mélange de 17 parties de carbonate de potassium et de 32 parties de soufre; on introduit le tout dans une marmite de fer, puis on fond le mélange et on y introduit 46 parties de cyanoferrure de potassium bien sec. On chauffe le tout jusqu'au moment où ce dernier produit est complétement décomposé. On retire alors du feu, puis on ferme hermétiquement le vase et l'on maintient à une température relativement modérée pendant quelques heures. L'hyposulfite de potassium qui s'était formé tout d'abord se décompose. On retire alors la masse et on la reprend par l'eau. On filtre le produit, puis on ajoute de l'acide sulfurique, et enfin on enlève le produit au moyen de l'alcool, dans lequel on le fait cristalliser plusieurs fois afin de l'obtenir pur. Une méthode voisine de la précédente est celle qu'emploie Troehde et qui consiste à fondre 3 parties d'hyposulfite de potassium bien sec avec 1 partie de ferrocyanure de potassium. Ce produit est repris par l'eau, puis par l'alcool, d'où il cristallise très-pur.

2° En faisant un mélange de 2 parties de ferrocyanure de potassium et 1 partie de fleur de soufre, et en plaçant le tout dans un creuset fermé. On chauffe ce mélange au rouge sombre, et quand la masse est depuis quelques instants en fusion, il s'en dégage des bulles qui s'enflamment et brûlent avec une flamme rouge. Il faut prendre garde, durant cette réaction, de ne point dépasser la chaleur rouge. Il convient également d'attendre cette température. En effet, si l'on reste au-dessous, une partie du ferrocyanure n'est pas décomposée, et si le point utile est dépassé, une partie du sulfocyanate se décompose et donne du mellonure tripotassique. Quand on juge que le ferrocyanure est complétement décomposé, on arrête le feu, on laisse refroidir durant quelques instants, puis on reprend par l'eau bouillante. La solution est ensuite additionnée de carbonate de potassium, qui précipite le fer, qui est filtré et soumis à l'évaporation. Le résidu, parfaitement séché, est repris par l'alcool et cette nouvelle solution est abandonnée à l'évaporation lente. On a proposé quelques modifications à cette marche, mais il n'est pas utile que nous insistions sur ce point.

3° Enfin, en chauffant le dithiosulfocarbamate d'ammonium par le monosulfure de potassium. Ce procédé a été indiqué par Gelis, et il est plus économique que tous ceux que nous venons de décrire. Il se pratique comme il suit : on commence par préparer le dithiosulfocarbamate d'ammonium en faisant réagir le sulfure de carbone sur le sulfure d'ammonium. On ajoute au produit une quantité convenable de sulfure de potassium, puis on distille. Il se produit un dégagement d'acide sulfhydrique et de sulfure de carbone, et il reste comme résidu du chlorure de potassium et du mellon impur.

Quand on fait réagir sur une solution aqueuse de sulfocyanate de potassium soit de l'acide azotique de 1,42 de densité, soit de l'eau de chlore concentrée, le sel se décompose et il se forme du persulfocyanogène.

Le sulfocyanate qui nous occupe peut servir, comme nous l'avons vu plus haut, à la préparation de l'acide *sulfocyanique*. Il suffit, en effet, de traiter la solution aqueuse par l'acide sulfurique étendu. Il reste en solution dans la liqueur et, par une distillation bien conduite, on peut l'obtenir, car il passe avec les vapeurs aqueuses. Enfin, le sulfocyanate de potassium en solution donne, si on le chauffe avec des chlorures, bromures ou iodures alcooliques, des éthers *sulfocyaniques*. On obtient le même résultat si on le distille avec les sels de potassium des éthers sulfuriques acides dérivés des alcools.

Le sulfocyanate de potassium donne des sels doubles, parmi lesquels nous citerons le composé qui répond à la formule

$$CAzSK+(CAz)^2Hg+2H^2O.$$

Ce produit s'obtient en mélangeant une solution de sulfocyanate de potassium avec une solution de cyanure mercurique. La solution laisse déposer un précipité d'aspect informe, mais au sein duquel on voit bientôt apparaître de belles lamelles nacrées. La forme des cristaux varie, d'ailleurs, suivant que les solutions étaient plus ou moins concentrées. Les lamelles nacrées sont fournies par des solutions concentrées; on obtient avec des solutions étendues de beaux prismes allongés.

Quand on met de l'iodure mercurique dans du sulfocyanate de potassium en solution alcoolique, l'iodure se dissout, et si la quantité ajoutée petit à petit est suffisante pour saturer la liqueur, on voit se déposer un sel double qui a pour formule $2CAzSK+HgI^2+2H^2O$. Ce produit est jaune et tombe en déliquescence au contact de l'air humide. L'eau le décompose rapidement.

— *Sulfocyanate de sodium* $CAzSNa$. Ce composé présente une grande analogie avec le précédent. Il se prépare également comme le sel de potassium, à cela près, bien entendu, qu'on substitue dans les réactions décrites plus haut le sel sodique au sel potassique. Ce produit est jaune et tombe en déliquescence au contact de l'air humide. L'eau le décompose rapidement.

— *Sulfocyanate de chrome* $(CAzS)^6Cr^2$. Quand on met en solution dans l'acide *sulfocyanique* aqueux de l'hydrate chromique récemment obtenu, la masse prend une teinte violacée qui, sous l'influence de la chaleur, vire au vert. Si l'on évapore avec quelque précaution, il reste une poudre verte qui constitue le sel qui nous occupe.

Quand on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans une solution de chromosulfocyanate de potassium ou d'argent, on voit la solution prendre une teinte verte. On constate, au moyen des papiers réactifs, qu'elle est très-acide. Elle renferme en effet une acide que Rosler a découvert, et qui porte le nom d'acide chromosulfocyanique. Ce produit n'a pu être isolé jusqu'ici, mais il constitue des colorants de ses sels, dont nous allons dire quelques mots.

Le chromosulfocyanate d'ammonium a pour formule $(CAzS)^6Cr^2(AzH^4)^6 + 8H^2O$. Il s'obtient, ainsi que plusieurs autres, et notamment en chauffant un mélange de sulfocyanate ammonique et d'hydrate chromique, dans deux parties d'eau. Le chromosulfocyanate de potassium $(CAzS)^6Cr^2K^6 + 4H^2O$ se prépare en maintenant à 80° environ, et pendant quelques heures, un mélange formé de 6 parties de sulfocyanure de potassique et de 5 parties d'alun de chrome mis en solution dans peu concentrée. Quand on juge la réaction terminée, on laisse refroidir, puis on ajoute de l'alcool en quantités suffisantes pour précipiter les sulfates formés. On décante, puis on reprend le résidu par l'alcool fort et l'on fait cristalliser. Ce sel se présente en cristaux rouges inaltérables à l'air. Il se fond et chauffé à 110° environ, ils perdent leur eau. Ils sont plus solubles dans l'eau que dans l'alcool. Quand on traite ce produit par l'acide chlorhydrique, il se décompose, mais à chaud seulement, si l'acide était dilué; avec le même acide concentré, la décomposition se fait à froid. Il reste dans la liqueur du chlorure de potassium. Si l'on fait bouillir une solution aqueuse de chromosulfocyanate de potassium avec de la soude ou de l'ammoniaque, on voit se déposer, il se précipite de l'hydrate chromique. Les solutions de chromosulfocyanate de potassium sont précipitées rapidement à chaud, lentement à froid, par le sulfate de cuivre. La teinte vineuse de la solution du sel potassique passe au bleu violet, puis il se dépose de l'oxyde de cuivre. Les sels de nickel, de zinc, de cobalt, de fer, de nickel et de manganèse sont sans action sur les solutions du chromosulfocyanate potassique.

L'acétate de plomb agit sur cette solution et y détermine un précipité rosé tenu, mais sous l'influence d'un lavage à l'eau, passe au jaune et abandonne à ce liquide un chromosulfocyanate de plomb qui a pour formule $(CAzS)^{12}Cr^2Pb^3 + 4Pb^{II}O^{II} + 5H^2O$. Ce sel est décomposé par l'eau bouillante en sulfocyanate plombique, oxyde de chrome et oxyde de plomb.

Le chromosulfocyanate de sodium

$$(CAzS)^{12}Cr^2Na^6 + 14H^2O$$

s'obtient en chauffant pendant quelques instants un mélange de deux solutions de sulfate de chrome et de sulfocyanate de sodium. Pour recueillir le produit, il suffit de faire cristalliser le résidu d'abord dans l'eau, puis dans l'alcool. Ce composé se présente en lamelles très-minces et qui s'effleurissent rapidement à l'air.

Mentionnons encore le chromosulfocyanate d'argent, qui se présente sous forme d'un précipité brun rougeâtre et qui renferme une très-forte proportion d'eau, qu'il abandonne quand on le sèche sur l'acide sulfurique concentré; et enfin le chromosulfocyanate de baryum, qui s'obtient en faisant bouillir pendant quelques instants un mélange formé de deux solutions de sulfocyanate barytique et de chlorure de chrome. Le produit est séparé par cristallisation du chlorure de baryum qui se forme au cours de cette réaction. Les cristaux obtenus sont des prismes à quatre pans, très-déliquescents à l'air humide, et qui s'effleurissent si on les place au-dessus d'un corps qui renferme de l'acide sulfurique concentré.

Avant d'en finir avec les sels chromosulfocyaniques, il nous faut mentionner toute une série de composés ou sels doubles de chromammonium et d'autres métaux. Ces produits ont pour formule générale

$$(CAzS)^6(Az^2H^8Cr)HM'.$$

Le plus intéressant de ces composés est le sel double de chromammonium, d'ammonium et d'hydrogène. Il a pour formule

$$(CAzS)^6(Az^2H^8Cr)H(AzH^4)$$

et s'obtient en additionnant petit à petit de bichromate de potasse du sulfocyanate d'ammonium maintenu en fusion, puis en traitant le produit par l'eau et en ajoutant au liquide filtré des morceaux de sel ammoniac. Ce composé est soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. Il se dépose de ses solutions aqueuses en écailles brillantes et rouges. C'est un produit peu fixe et qui se décompose sous l'action de l'eau chaude et des alcalis. Chauffé à sec jusqu'à 120° environ, il se détruit. A l'aide de ce sel, on met en préparer plusieurs autres, qui appartiennent à la même série. Cette formation résulte de la substitution d'un métal au groupe AzH^4 qui figure dans la formule donnée plus haut. On obtient, notamment, le sel potassique, qui se forme quand on traite le sel ammoniacal par une lessive de potasse concentrée. Il se forme des cristaux cubiques ou lamellaires, qu'on purifie par une cristallisation dans l'eau bouillante. Ce produit est soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther.

— *Sulfocyanate de nickel*

$$(CAzS)^6(Az^2H^8Ni(AzH^4)^2.$$

Ce produit s'obtient en ajoutant à une solution aqueuse d'acide *sulfocyanique* de l'hydrate de nickel en quantité suffisante pour saturer bout l'acidité. On filtre et on évapore. On obtient intégrement transformée en une masse jaune cristalline. Ce sel double est soluble dans l'eau chaude, mais il se dissout mieux dans l'alcool et dans l'éther. L'eau froide en petite quantité ne le décompose pas; mais si l'on arrose le sel double d'une forte quantité de ce liquide, on régénère les deux sels primitifs.

2° Le sulfocyanate de mercure et de fer, qui a pour formule $(CAzS)^6Hg + (CAzS)^6Fe$ et qui s'obtient en mélangeant des solutions de chlorure ferreux et de sulfocyanate de mercure et en abandonnant le tout sous la cloche de la machine pneumatique. Le vide amène la formation d'une poudre cristalline, soluble dans l'eau et qui constitue le sel cherché.

3° Le sulfocyanate de mercure et de nickel, qui s'obtient par le mélange de solutions renfermant les sulfocyanates de mercure et de nickel. Ce produit cristallise en aiguilles petites et d'un beau bleu. Elles sont solubles dans l'eau bouillante.

4° Enfin, les sulfocyanates de mercure et d'ammonium. On en connaît deux : l'un se présente en prismes incolores et a pour formule $(CAzS)^2Hg + CAzS(AzH^4)$; l'autre présente une formule semblable à la précédente, à cette différence près toutefois qu'il renferme 2 atomes de sulfocyanate d'ammonium au lieu d'un seul. Ce dernier sel se présente en cristaux volumineux.

— *Sulfocyanate mercurammonique*. Ce composé se prépare en laissant tomber petit à petit dans une solution alcoolique bouillante de sulfocyanate d'ammonium de l'oxyde jaune de mercure. La réaction se fait avec violence; aussi convient-il de prendre certaines précautions; il se dégage une grande quantité d'ammoniaque. On cesse d'ajouter de l'oxyde de mercure lorsque ce dernier ne disparaît plus, puis on filtre, et on abandonne la solution au refroidissement; il se dépose alors des cristaux dont la formule est difficile à fixer. Ce produit se décompose rapidement en perdant une quantité notable d'ammoniaque. Quand on met ce produit en solution dans l'eau et qu'on porte le tout à l'ébullition, il se produit un dégagement abondant d'ammoniaque et, tandis qu'une quantité notable de sulfocyanate ammonique reste en solution, on voit se précipiter une poudre jaune qui constitue un sulfocyanate de mercurammonium, dont la formule est

$$(CAzS)^2Hg + 3HgO.$$

Ce produit est très-instable et se décompose sous l'action d'une chaleur relativement modérée.

— *Sulfocyanate d'argent* $CAzSAg$. Ce produit se prépare de plusieurs façons, et notamment en ajoutant à une solution bouillante de sulfocyanate de potassium un excès d'oxyde d'argent; on maintient la température d'ébullition tant qu'il se produit un dégagement d'ammoniaque; quand ce dégagement a cessé, on filtre, et, par refroidissement, il se dépose un sel double d'argent et d'ammonium. Il suffit de traiter ce sel par l'eau pour le décolorer. On obtient également le sel qui nous occupe en faisant dissoudre l'oxyde d'argent récemment précipité dans une solution d'acide *sulfocyanique*. Ce composé est insoluble dans l'eau, mais il se dissout très-facilement dans l'ammoniaque. Quand on fait agir sur ce sel un courant de chlore sec, il se décompose en donnant du chlorure d'argent, du chlorure de soufre et du chlorure de cyanogène solide. Avec le gaz chlorhydrique, on obtient, en outre, un sublimé rouge. On obtient un sulfocyanate d'argentammonium

$$CAzSAg,AzH^3$$

en mettant du sulfocyanate d'argent en solution dans du sulfocyanate d'ammonium et en ajoutant à la masse une quantité convenable d'ammoniaque. Ce composé est d'une grande instabilité; il perd son ammoniaque au contact de l'air et se décompose spontanément si on le met en présence de l'eau. Le sulfocyanate d'argent forme plusieurs sels doubles, un notamment avec le potassium; on le prépare en faisant dissoudre le sel d'argent dans celui de potassium, puis on évapore la solution dans le vide, ou mieux sur l'acide sulfurique; il reste des cristaux orthorhombiques, fusibles à 140°, et que l'eau décompose en donnant un précipité blanc de sulfocyanate d'argent. Ce sel double a pour formule $CAzSK + CAzSAg$.

— *Sulfocyanates d'or*. Il en existe deux : le sel aureux et le sel aurique; mais ils n'ont pu être isolés jusqu'à ce jour et ne sont connus qu'à l'état de sels auroso et aurico-potassiques. Le sulfocyanate auroso-potassique a pour formule $CAzSAu + CAzSK$. Il se prépare en ajoutant petit à petit à une solution de sulfocyanate potassique, maintenue à 80°, du chlorure aurique neutre; on ne cesse d'ajouter ce dernier produit que lorsque le précipité rouge qui se forme ne se dissout plus, même en agitant. Le produit se présente en cristaux prismatiques jaune pâle; si on les chauffe à plus de 100°, ils fondent et se décomposent en donnant de l'or, du sulfocyanate de potasse, du soufre et du sulfure de carbone. Ce sel est soluble dans l'eau. Si l'on ajoute à cette solution un sel d'argent, il se forme un précipité blanc, qui constitue un sulfocyanate auroso-argentique. Ce produit est insoluble dans l'eau, mais il se dissout dans l'ammoniaque; il noircit lentement sous l'influence de la lumière. Quand on ajoute à une solution aqueuse du sulfocyanate auroso-potassique une quantité convenable d'ammoniaque, il se forme un précipité blanc qui constitue du sulfocyanate d'aurammonium.

Le sulfocyanate aurico-potassique a pour formule $(CAzS)^3Au + CAzSK$. Il se prépare en ajoutant à une solution froide de sulfocyanate de potassium une quantité convenable de chlorure d'or. Si l'on chauffe légèrement la solution au moment de la former le précipité, on le voit se dissoudre, puis cristalliser par refroidissement en aiguilles fines et d'une belle couleur jaune orange; on n'obtient ainsi qu'une petite portion du produit formé, et, si l'on tente d'amener à cristallisation par évaporation de la solution, même à une douce chaleur, le sel aurico-potassique se détruit; il se dégage alors de l'acide *sulfocyanique*, et il reste dans la liqueur un mélange d'or métallique, de sulfocyanate auroso-potassique et de chlorure de potassium. Le sel auricopotassique est soluble dans l'alcool et dans l'éther; l'eau le décompose rapidement.

— *Sulfocyanates de platine*. Il existe deux sels résultant de la combinaison de l'acide *sulfocyanique* avec le platine, le sel platinique et le sel platineux. Le premier n'est pas connu à l'état de liberté, mais on peut l'envisager comme obtenu par plusieurs procédés que nous allons exposer ici. D'ailleurs, si ces composés n'ont point encore été étudiés d'une façon suffisante, on doit au chimiste Buckton des travaux très-complets sur un grand nombre de sels doubles du platine qui rappellent les chloroplatinates et les chloroplatinites. Nous traiterons de ces sels, les sulfocyanoplatinates et les sulfocyanoplatinites, après avoir dit ce qu'on sait des sels simples du même groupe.

Le sulfocyanate platineux a été obtenu par Buckton au moyen de l'action de l'acide nitrique ou du chlore sur les sulfocyanoplatinites ou les sulfocyanoplatinates. Les produits de cette réaction sont de l'acide cyanhydrique, de l'acide sulfurique et une matière qui présente la composition suivante :

$$(CAzS)^2Pt.$$

On obtiendrait le même produit en portant à la température de l'ébullition des solutions acides de sels sulfocyanoplatineux ou sulfocyanoplatinoses. Le sulfocyanate platineux présente la formule que nous avons donnée ci-dessus. Si on le traite par la potasse, il ne se décompose pas. L'ammoniaque en solution aqueuse le colore en jaune, mais sans le décomposer.

— *Sulfocyanoplatinates*. Ces composés ont pour formule générale $(CAzS)^4Pt_x2CAzSM$. L'acide qui leur donne naissance s'obtient en précipitant par une quantité strictement convenable d'acide sulfurique une solution chaude et concentrée de sulfocyanoplatinate de plomb. Il se dépose une liqueur rouge foncé qui donne une réaction très-acide au papier tournesol. Si l'on tente d'évaporer ce liquide sous le récipient de la machine pneumatique, il se dépose une masse cristalline assez mal définie et qui, abandonnée à l'air libre, ne tarde point à se décomposer en laissant un résidu assez mal étudié. Le liquide dont il est parlé ci-dessus décompose les carbonates et dissout le zinc avec dégagement d'hydrogène.

Le sulfocyanoplatinate d'ammonium a pour formule $(CAzS)^4Pt(AzH^4)^2$. Il se prépare en faisant un mélange d'une solution peu concentrée de sel de potassium et d'une solution de sulfate d'ammonium. On chauffe le tout à la température d'ébullition, puis on évapore la masse. On reprend la masse par l'alcool, puis on abandonne à l'évaporation. Le sel d'ammonium se présente sous forme de lames hexagonales, que l'air n'altère point et qui sont teintées de rouge. Ces cristaux, mis au contact de l'eau bouillante, se décomposent avec dégagement d'acide *sulfocyanique*.

Le sulfocyanoplatinate de potassium a pour formule $(CAzS)^4PtK^2$. Il s'obtient en versant dans une solution concentrée et chaude de sulfocyanate de potasse du chlorure platinique. Le liquide doit être maintenu entre 70° et 80°; au bout de quelques instants la liqueur se teinte en rouge sombre, puis laisse déposer par refroidissement des cristaux lamelliformes qui constituent du sulfocyanate de potassium. On obtient encore ce sel en traitant par du chloroplatinate de potasse une solution de sulfocyanate du même sel; ce dernier doit être employé à chaud et peu concentré. On fait cristalliser dans l'alcool bouillant le produit obtenu, et l'on a des lamelles hexagonales. Ce sel présente une odeur désagréable; il est peu soluble dans l'eau bouillante et se dissout mieux dans l'eau à 60°. Si on l'abandonne au contact de l'air, il ne se dissout pas; mais une température supérieure à 150° le détruit. Quand on traite le sulfocyanoplatinate par l'acide chlorhydrique ou par l'acide sulfurique, il se décompose très-rapidement. L'acide sulfhydrique le détruit également, avec production de sulfocyanate de potassium, d'acide *sulfocyanique* et de sulfure de platine. Le sulfure ammonique détermine une décomposition analogue. Quand on traite le sulfocyanoplatinate de potassium par du carbonate de potassium et qu'on chauffe le mélange à une douce température, on obtient du sulfocyanoplatinite de potasse.

Le sulfocyanoplatinate de sodium s'obtient en traitant le sulfocyanoplatinate de plomb par du sulfate de sodium. Il se présente sous forme de cristaux tabulaires, qui se dissolvent facilement dans l'eau et dans l'alcool.

Le sulfocyanoplatinate d'argent a pour formule $(CAzS)^4Pt_xAg^2$. C'est un précipité caillebotté présentant une belle teinte orange foncé. C'est un produit peu soluble, mais qui se dissout cependant dans l'ammoniaque; si l'on chauffe cette solution, elle se décompose. Quand on additionne de quelques gouttes d'eau une solution de sulfocyanoplatinate d'ammonium, on vient de se former le précipité, on le voit se dissoudre, puis cristalliser par refroidissement en aiguilles fines et d'une belle couleur jaune orange; on n'obtient ainsi qu'une petite portion du produit formé, et, si l'on tente d'amener à cristallisation par évaporation de la solution, même à une douce chaleur, le sel aurico-potassique se détruit; il se dégage alors de l'acide *sulfocyanique*, et il reste dans la liqueur un mélange d'or métallique, de sulfocyanate auroso-potassique et de chlorure de potassium. Le sel auricopotassique est soluble dans l'alcool et dans l'éther; l'eau le décompose rapidement.

— *Sulfocyanates de platine*. Il existe deux sels résultant de la combinaison de l'acide *sulfocyanique* avec le platine, le sel platinique et le sel platineux. Le premier n'est pas connu à l'état de liberté, mais on peut l'envisager comme obtenu par plusieurs procédés que nous allons exposer ici. D'ailleurs, si ces composés n'ont point encore été étudiés d'une façon suffisante, on doit au chimiste Buckton des travaux très-complets sur un grand nombre de sels doubles du platine qui rappellent les chloroplatinates et les chloroplatinites. Nous traiterons de ces sels, les sulfocyanoplatinates et les sulfocyanoplatinites, après avoir dit ce qu'on sait des sels simples du même groupe.

Le sulfocyanate platineux a été obtenu par Buckton au moyen de l'action de l'acide nitrique ou du chlore sur les sulfocyanoplatinites ou les sulfocyanoplatinates. Les produits de cette réaction sont de l'acide cyanhydrique, de l'acide sulfurique et une matière qui présente la composition suivante :

$$(CAzS)^2Pt.$$

On obtiendrait le même produit en portant à la température de l'ébullition des solutions acides de sels sulfocyanoplatineux ou sulfocyanoplatinoses. Le sulfocyanate platineux présente la formule que nous avons donnée ci-dessus. Si on le traite par la potasse, il ne se décompose pas. L'ammoniaque en solution aqueuse le colore en jaune, mais sans le décomposer.

— *Sulfocyanoplatinates*. Ces composés ont pour formule générale $(CAzS)^4Pt_x2CAzSM$. L'acide qui leur donne naissance s'obtient en précipitant par une quantité strictement convenable d'acide sulfurique une solution chaude et concentrée de sulfocyanoplatinate de plomb. Il se dépose une liqueur rouge foncé qui donne une réaction très-acide au papier tournesol. Si l'on tente d'évaporer ce liquide sous le récipient de la machine pneumatique, il se dépose une masse cristalline assez mal définie et qui, abandonnée à l'air libre, ne tarde point à se décomposer en laissant un résidu assez mal étudié. Le liquide dont il est parlé ci-dessus décompose les carbonates et dissout le zinc avec dégagement d'hydrogène.

Le sulfocyanoplatinate d'ammonium a pour formule $(CAzS)^4Pt(AzH^4)^2$. Il se prépare en faisant un mélange d'une solution peu concentrée de sel de potassium et d'une solution de sulfate d'ammonium. On chauffe le tout à la température d'ébullition, puis on évapore la masse. On reprend la masse par l'alcool, puis on abandonne à l'évaporation. Le sel d'ammonium se présente sous forme de lames hexagonales, que l'air n'altère point et qui sont teintées de rouge. Ces cristaux, mis au contact de l'eau bouillante, se décomposent avec dégagement d'acide *sulfocyanique*.

Le sulfocyanoplatinate de potassium a pour formule $(CAzS)^4PtK^2$. Il s'obtient en versant dans une solution concentrée et chaude de sulfocyanate de potasse du chlorure platinique. Le liquide doit être maintenu entre 70° et 80°; au bout de quelques instants la liqueur se teinte en rouge sombre, puis laisse déposer par refroidissement des cristaux lamelliformes qui constituent du sulfocyanate de potassium. On obtient encore ce sel en traitant par du chloroplatinate de potasse une solution de sulfocyanate du même sel; ce dernier doit être employé à chaud et peu concentré. On fait cristalliser dans l'alcool bouillant le produit obtenu, et l'on a des lamelles hexagonales. Ce sel présente une odeur désagréable; il est peu soluble dans l'eau bouillante et se dissout mieux dans l'eau à 60°. Si on l'abandonne au contact de l'air, il ne se dissout pas; mais une température supérieure à 150° le détruit. Quand on traite le sulfocyanoplatinate par l'acide chlorhydrique ou par l'acide sulfurique, il se décompose très-rapidement. L'acide sulfhydrique le détruit également, avec production de sulfocyanate de potassium, d'acide *sulfocyanique* et de sulfure de platine. Le sulfure ammonique détermine une décomposition analogue. Quand on traite le sulfocyanoplatinate de potassium par du carbonate de potassium et qu'on chauffe le mélange à une douce température, on obtient du sulfocyanoplatinite de potasse.

Le sulfocyanoplatinate de sodium s'obtient en traitant le sulfocyanoplatinate de plomb par du sulfate de sodium. Il se présente sous forme de cristaux tabulaires, qui se dissolvent facilement dans l'eau et dans l'alcool.

Le sulfocyanoplatinate d'argent a pour formule $(CAzS)^4Pt_xAg^2$. C'est un précipité caillebotté présentant une belle teinte orange foncé. C'est un produit peu soluble, mais qui se dissout cependant dans l'ammoniaque; si l'on chauffe cette solution, elle se décompose. Quand on additionne de quelques gouttes d'eau une solution de sulfocyanoplatinate d'ammonium, on vient de se former le précipité, on le voit se dissoudre, puis cristalliser par refroidissement en aiguilles fines et d'une belle couleur jaune orange; on n'obtient ainsi qu'une petite portion du produit formé, et, si l'on tente d'amener à cristallisation par évaporation de la solution, même à une douce chaleur, le sel aurico-potassique se détruit; il se dégage alors de l'acide *sulfocyanique*, et il reste dans la liqueur un mélange d'or métallique, de sulfocyanate auroso-potassique et de chlorure de potassium. Le sel auricopotassique est soluble dans l'alcool et dans l'éther; l'eau le décompose rapidement.

— *Sulfocyanates de platine*. Il existe deux sels résultant de la combinaison de l'acide *sulfocyanique* avec le platine, le sel platinique et le sel platineux. Le premier n'est pas connu à l'état de liberté, mais on peut l'envisager comme obtenu par plusieurs procédés que nous allons exposer ici. D'ailleurs, si ces composés n'ont point encore été étudiés d'une façon suffisante, on doit au chimiste Buckton des travaux très-complets sur un grand nombre de sels doubles du platine qui rappellent les chloroplatinates et les chloroplatinites. Nous traiterons de ces sels, les sulfocyanoplatinates et les sulfocyanoplatinites, après avoir dit ce qu'on sait des sels simples du même groupe.

Le sulfocyanate platineux a été obtenu par Buckton au moyen de l'action de l'acide nitrique ou du chlore sur les sulfocyanoplatinites ou les sulfocyanoplatinates. Les produits de cette réaction sont de l'acide cyanhydrique, de l'acide sulfurique et une matière qui présente la composition suivante :

$$(CAzS)^2Pt.$$

On obtiendrait le même produit en portant à la température de l'ébullition des solutions acides de sels sulfocyanoplatineux ou sulfocyanoplatinoses. Le sulfocyanate platineux présente la formule que nous avons donnée ci-dessus. Si on le traite par la potasse, il ne se décompose pas. L'ammoniaque en solution aqueuse le colore en jaune, mais sans le décomposer.

— *Sulfocyanoplatinates*. Ces composés ont pour formule générale $(CAzS)^4Pt_x2CAzSM$. L'acide qui leur donne naissance s'obtient en précipitant par une quantité strictement convenable d'acide sulfurique une solution chaude et concentrée de sulfocyanoplatinate de plomb. Il se dépose une liqueur rouge foncé qui donne une réaction très-acide au papier tournesol. Si l'on tente d'évaporer ce liquide sous le récipient de la machine pneumatique, il se dépose une masse cristalline assez mal définie et qui, abandonnée à l'air libre, ne tarde point à se décomposer en laissant un résidu assez mal étudié. Le liquide dont il est parlé ci-dessus décompose les carbonates et dissout le zinc avec dégagement d'hydrogène.

Le sulfocyanoplatinate d'ammonium a pour formule $(CAzS)^4Pt(AzH^4)^2$. Il se prépare en faisant un mélange d'une solution peu concentrée de sel de potassium et d'une solution de sulfate d'ammonium. On chauffe le tout à la température d'ébullition, puis on évapore la masse. On reprend la masse par l'alcool, puis on abandonne à l'évaporation. Le sel d'ammonium se présente sous forme de lames hexagonales, que l'air n'altère point et qui sont teintées de rouge. Ces cristaux, mis au contact de l'eau bouillante, se décomposent avec dégagement d'acide *sulfocyanique*.

Le sulfocyanoplatinate de potassium a pour formule $(CAzS)^4PtK^2$. Il s'obtient en versant dans une solution concentrée et chaude de sulfocyanate de potasse du chlorure platinique. Le liquide doit être maintenu entre 70° et 80°; au bout de quelques instants la liqueur se teinte en rouge sombre, puis laisse déposer par refroidissement des cristaux lamelliformes qui constituent du sulfocyanate de potassium. On obtient encore ce sel en traitant par du chloroplatinate de potasse une solution de sulfocyanate du même sel; ce dernier doit être employé à chaud et peu concentré. On fait cristalliser dans l'alcool bouillant le produit obtenu, et l'on a des lamelles hexagonales. Ce sel présente une odeur désagréable; il est peu soluble dans l'eau bouillante et se dissout mieux dans l'eau à 60°. Si on l'abandonne au contact de l'air, il ne se dissout pas; mais une température supérieure à 150° le détruit. Quand on traite le sulfocyanoplatinate par l'acide chlorhydrique ou par l'acide sulfurique, il se décompose très-rapidement. L'acide sulfhydrique le détruit également, avec production de sulfocyanate de potassium, d'acide *sulfocyanique* et de sulfure de platine. Le sulfure ammonique détermine une décomposition analogue. Quand on traite le sulfocyanoplatinate de potassium par du carbonate de potassium et qu'on chauffe le mélange à une douce température, on obtient du sulfocyanoplatinite de potasse.

Le sulfocyanoplatinate de sodium s'obtient en traitant le sulfocyanoplatinate de plomb par du sulfate de sodium. Il se présente sous forme de cristaux tabulaires, qui se dissolvent facilement dans l'eau et dans l'alcool.

Le sulfocyanoplatinate d'argent a pour formule $(CAzS)^4Pt_xAg^2$. C'est un précipité caillebotté présentant une belle teinte orange foncé. C'est un produit peu soluble, mais qui se dissout cependant dans l'ammoniaque; si l'on chauffe cette solution, elle se décompose. Quand on additionne de quelques gouttes d'eau une solution de sulfocyanoplatinate d'ammonium, on vient de se former le précipité, on le voit se dissoudre, puis cristalliser par refroidissement en aiguilles fines et d'une belle couleur jaune orange; on n'obtient ainsi qu'une petite portion du produit formé, et, si l'on tente d'amener à cristallisation par évaporation de la solution, même à une douce chaleur, le sel aurico-potassique se détruit; il se dégage alors de l'acide *sulfocyanique*, et il reste dans la liqueur un mélange d'or métallique, de sulfocyanate auroso-potassique et de chlorure de potassium. Le sel auricopotassique est soluble dans l'alcool et dans l'éther; l'eau le décompose rapidement.

— *Sulfocyanates de platine*. Il existe deux sels résultant de la combinaison de l'acide *sulfocyanique* avec le platine, le sel platinique et le sel platineux. Le premier n'est pas connu à l'état de liberté, mais on peut l'envisager comme obtenu par plusieurs procédés que nous allons exposer ici. D'ailleurs, si ces composés n'ont point encore été étudiés d'une façon suffisante, on doit au chimiste Buckton des travaux très-complets sur un grand nombre de sels doubles du platine qui rappellent les chloroplatinates et les chloroplatinites. Nous traiterons de ces sels, les sulfocyanoplatinates et les sulfocyanoplatinites, après avoir dit ce qu'on sait des sels simples du même groupe.

Le sulfocyanate platineux a été obtenu par Buckton au moyen de l'action de l'acide nitrique ou du chlore sur les sul