produit huileux qui, soumis à l'action d'un mélange réfrigérant, a abandonné des cristaux. Ces cristaux, fortement comprimés à une température d'hiver, ne fondaient plus à la température de l'appartement. En faisant bouillir, d'autre part, avec de l'eau, des papiers buvards retirés de la presse et séparés du produit précédent, le même chimiste en a séparé un produit huileux qui ne se solidifiait pas à — 20°.

— *a-bromotoluidine.* On la prépare au moyen de l'*a*-nitrobromotoluène, au moyen de l'étain et de l'acide chlorhydrique. Elle est liquide et se solidifie à — 20.

— *b-bromotoluidine.* Préparée de la même manière au moyen du composé liquide, elle est solide, cristallise en prismes et fond à 67°.

Le nitrate de la base *a* forme de beaux cristaux nacrés solubles dans 120,9 parties d'eau à 11°,5; le nitrate de la base *b* forme des cristaux prismatiques solubles dans 217,4 parties d'eau à 11°,5. Ce fait particulier que le nitrobromotoluène *a* est solide et le nitrobromotoluène *b* liquide, tandis qu'à l'inverse la bromotoluidine *a* est liquide et la bromotoluidine *b* est solide, permet d'obtenir chacune de ces deux bases à l'état de pureté. De fait, le bromotoluène nitré *a*, qui est solide, se sépare facilement de son isomère *b*, qui est liquide, et fournit la bromotoluidine *a* pure lorsqu'on le réduit. D'autre part, le nitrobromotoluène *b*, qui est liquide, peut aussi être complétement privé de son isomère *a*, dont il tient une portion en dissolution. Lorsqu'on le réduit, il donne par conséquent un mélange de bromotoluidines *a* et *b*; mais le produit *b*, qui est solide, est facile à obtenir complétement exempt du produit *a*, qui est liquide, et l'on a ainsi les deux bases pures.

Lorsqu'on traite sous l'eau la tolylacétamide ou acétoluide C^7H^7,C^2H^3O,H,Az, par deux atomes de brome et qu'on chauffe doucement le mélange, ce corps se convertit en bromacétoluide C^7H^6Br,CH^3O,HAz, qui cristallise en aiguilles fusibles à 170. Ce corps, bouilli avec de la potasse en solution alcoolique, se résout en acétate potassique et en bromotoluidine. La base ainsi obtenue bout à 229°, est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et présente une densité de 1,510, à 20°. Son nitrate cristallise en fines et larges lamelles jaunes; son chlorhydrate, en prismes blancs nacrés; son oxalate acide et son sulfate acide, en aiguilles.

Les caractères assignés par Wroblewsky à la bromotoluidine préparée au moyen de l'acétoluide, caractères qui en faisaient une troisième modification distincte des deux autres, puisqu'elle bout à 229°, alors que les deux autres bouillent l'une entre 255° et 256°, l'autre entre 256° et 257°.

On obtient encore la monobromotoluidine, mais mélangée de dibromotoluidine, par l'action directe du brome sur la toluidine. Lorsqu'on fait passer à travers la solution aqueuse de chlorhydrate de toluidine, ou à travers une solution alcoolique de la base libre, un courant d'air qui a barboté dans du brome, dans il entraîne des vapeurs, il se produit un abondant précipité de dibromotoluidine, mêlé d'un peu de monobromotoluidine. La solution alcoolique est précipitée par l'eau, séparée par le filtre de la dibromotoluidine, puis évaporée au bain-marie à siccité et chauffée (au moins le résidu) aussi longtemps qu'il se dégage des vapeurs acides. On dissout ensuite la masse dans l'eau et l'on ajoute à la liqueur de l'ammoniaque, qui en précipite seulement la monobromotoluidine. Pour purifier cette base, on la convertit en un sel cristallisable, qu'on décompose ensuite en le distillant avec la potasse. La bromotoluidine ainsi obtenue forme un chlorhydrate absolument semblable à celui de la base préparée au moyen de l'acétoluide, avec laquelle elle semble se confondre. Son azotate, soumis à l'action de l'acide azoteux, donne du diazobromotoluène, dont le sulfate, décomposé par l'alcool, fournit l'orthobromotoluène, que l'oxydation par l'acide chromique convertit en acide orthobromobenzoïque. Cette bromotoluidine est donc la modification ortho, et, comme la toluidine bromée liquide préparée par le premier procédé de Wroblewsky semble être la métabromotoluidine, il est probable que la modification cristallisée de cette base, obtenue par le même premier procédé, constitue la parabromotoluidine. La série des bromotoluidines se trouve donc complète.

— DIBROMOTOLUIDINE $C^7H^5Br^2,AzH^2$. Cette base, obtenue comme nous venons de le voir, cristallise en longues aiguilles blanches, soyeuses, fusibles à 73°, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther. Elle ne se combine point aux acides. Le brome agit peu sur elle; mais l'acide azotique fumant l'attaque d'une manière énergique, en donnant probablement naissance à des produits d'oxydation.

On obtient aussi une tribrométatoluidine par l'action du brome sur le métamidorthosulfotoluène.

— CHLOROTOLUIDINES. On ne connaît que la monochlorotoluidine CH^8ClAz; mais cette base a été obtenue sous trois modifications isomériques, dont deux liquides et une solide, à la température ordinaire, qui correspondent aux modifications ortho, para et méta de la toluidine.

Lorsqu'on met de l'acétoluide en suspension dans l'eau et qu'on dirige un courant de chlore à travers le liquide jusqu'à ce que l'on constate, en pesant le vase qui le renferme, une augmentation de poids correspondant à 2 atomes de chlore, l'acétoluide se convertit en chloracétoluide

$$C^7H^6Cl,AzH,C^2H^3O,$$

qui cristallise en larges cristaux rouges lamellaires, fusibles à 99°, que la potasse alcoolique résout en acétate de potassium et en monochlorotoluidine. La base chlorée ainsi préparée est un liquide incolore dont l'odeur rappelle la toluidine; elle bout sans décomposition à 222°; sa densité est égale à 1,151, à 20°; elle se dissout facilement dans l'alcool. mais elle est presque insoluble dans l'eau. Ses sels cristallisent très-bien : l'azotate et le chlorhydrate, en prismes, le chlorhydrate se sublimant à 100°; le sulfate acide, en prismes; l'oxalate acide, en longues aiguilles blanches.

2° Lorsqu'on réduit par l'étain et l'acide chlorhydrique le parachloronitrotoluène obtenu par la nitration directe du parachlorotoluène (v. TOLUÈNE), il se forme un sel double stanneux $2(C^7H^6Cl,AzH^3,HCl),SnCl^2$ dont on retire du chlorhydrate de parachlorotoluidine $(C^7H^6Cl,AzH^3)HCl$, en précipitant l'étain par l'acide sulfhydrique. Ce chlorhydrate, distillé avec une lessive de soude, fournit la parachlorotoluidine libre. Cette base est incolore, huileuse, fortement réfringente, d'une odeur qui rappelle la *toluidine;* sa densité égale 1,175, à 18°; elle bout à 236°, c'est-à-dire à 14° au-dessus de la précédente; elle se colore au contact de l'air. Son chlorhydrate forme des lamelles nacrées très-légères, que l'on peut purifier par sublimation; son azotate cristallise en lamelles minces, translucides, parfaitement blanches; le sulfate est très-soluble dans l'eau. Toutefois, d'après de nouvelles recherches des mêmes auteurs, la chlorotoluidine (para), obtenue comme nous venons de le dire, aurait des propriétés différentes de celles qu'ils avaient fait connaître d'abord et que nous avons données : elle cristalliserait en aiguilles, au lieu d'être liquide, fondrait à 85° et bouillirait à 243° au lieu de 236°. (Radizewsky.)

— *a-chlorotoluidine.* C'est la chlorotoluidine qui prend naissance dans la monochlorotoluène. Elle est liquide et ne se solidifie pas à — 14°. Elle est incolore, mais brunit au contact de l'air et présente une odeur faible qui rappelle la *toluidine*. Sa densité est égale à 1,183 à 20°. Elle bout à 238°. Insoluble dans l'eau, elle se dissout avec facilité dans l'alcool. Son azotate et son chlorhydrate cristallisent en prismes. Le dernier de ces sels peut être sublimé comme le sel ammoniac.

— *b-chlorotoluidine.* Fraîchement préparé, ce corps est liquide; mais au bout d'un certain temps, ou plus rapidement par un refroidissement considérable, il se solidifie. Débarrassé des dernières traces de la modification liquide, par expression dans du papier joseph, distillation et cristallisation dans l'alcool, il forme de larges lames nacrées incolores, qui fondent à 83° et bouillent à 241°. Il est presque insoluble dans l'eau et facilement soluble dans l'alcool; son odeur est faible. Ses sels cristallisent remarquablement bien : le chlorhydrate, en lamelles incolores, nacrées, à sommets aigus, que l'on peut sublimer comme le sel ammoniac; il est moins soluble dans l'eau que le chlorhydrate *a*. L'azotate forme de larges tables brillantes qui fondent à la température de 169° sans se décomposer. Les deux chlorotoluidines décrites par Wroblevsky et préparées par lui au moyen du chlorotoluène sont probablement identiques avec celles qu'a obtenues Radizewsky. La seconde a été également obtenue par Beilstein et Kuhlberg. Toutes deux paraissent différer de la troisième base que Wroblewsky a préparée au moyen de l'acétoluide et qui bout à 222°, tandis que les deux autres bouillent l'une à 238° et l'autre à 241°. On connaît donc les trois chlorotoluidines ortho, para et méta; mais, sauf pour la para, on ne sait pas encore laquelle correspond à chacun de ces préfixes.

— NITROTOLUIDINE $C^7H^6(AzO^2),AzH^2$. On obtient cette base par la réduction du dinitrotoluène. Elle forme de grosses aiguilles jaunes, brillantes, fusibles à 77°,5, très-solubles dans l'eau chaude, peu solubles dans l'eau froide. L'azotate forme de petites lamelles jaunes, anhydres, qui fondent sans décomposition à 185°. Le chlorhydrate se présente en touffes d'aiguilles jaunes ou, lorsqu'on le fait cristalliser lentement, en longues aiguilles jaunes déliées, fusibles à 220° avec décomposition. Il est un peu soluble dans l'eau, surtout à la température de l'ébullition. Le sulfate renferme deux molécules d'eau de cristallisation et forme des aiguilles roses groupées en étoiles. L'azotate se convertit, par l'acide azoteux, en azotate de diazotoluène nitré

$$C^7H^6(AzO^2)Az^2,AzO^3.$$

En traitant le paranitrotoluène par nitration, on obtient un composé solide, tandis qu'en opérant sur l'orthonitrotoluène on obtient un composé liquide. Comme celui-ci ne peut jamais être entièrement débarrassé du composé solide formé en même temps, M. O. Cunerth le convertit en nitrotoluidine par l'action du sulfure ammonique, et chauffe ensuite cette base avec le chlorure de benzoïle de manière à donner naissance à son dérivé benzoylique. On peut alors séparer facilement ce produit de celui qui dérive du binitrotoluène cristallisable, ce dernier, fusible à 168°, étant beaucoup moins soluble que lui dans l'alcool. La nouvelle benzoylnitrotoluidine ainsi obtenue par M. Cunerth fond entre 145° et 146° et cristallise en petites aiguilles jaunes, qui fournissent une nitrotoluidine correspondante, en même temps que de l'acide benzoïque ou un benzoate alcalin, lorsqu'on les fait bouillir avec une solution alcoolique de potasse ou qu'on les chauffe à 150° avec de l'acide sulfurique. La nitrotoluidine ainsi produite cristallise en longues aiguilles jaunes, brillantes, fusibles à 94°,5. Elle forme avec les acides des composés très-instables et elle se convertit, sous l'influence de l'anhydride acétique, en une acétonitrotoluidide cristallisable en prismes incolores qui fondent à 155°,5. Sous l'influence de l'acide azoteux, elle fournit un composé diazoïque qui donne, par l'alcool, un nitrotoluène liquide que l'action de l'étain et de l'acide chlorhydrique transforme en orthotoluidine.

— DÉRIVÉS DE LA TOLUIDINE RENFERMANT DES RADICAUX D'ALCOOL. *Phényl-toluidine*

$$C^{13}H^{13}Az = C^7H^6(C^6H^5)AzH^2.$$

Cette base, que Hofmann a obtenue par la distillation sèche d'un sel de tritolylrosaniline, se produit également en même temps que la ditolylamine et la diphénylamine lorsqu'on chauffe un mélange de chlorhydrate de *toluidine* et d'aniline, ou de chlorhydrate d'aniline et de *toluidine*. Les trois bases qui prennent naissance peuvent être séparées l'une de l'autre au moyen de la distillation fractionnée; mais cette séparation est difficile, parce que leurs points d'ébullition ne sont distants que de 25° à 30° tout au plus. La phényl-toluidine bout aux environs de 330°.

— *Benzyl-toluidine ou tolyl-toluidine*

$$C^{14}H^{15}Az = C^7H^6(C^7H^7)AzH^2.$$

Syn. *ditolylamine.* On obtient ce corps en chauffant entre 210° et 240° une molécule de chlorhydrate de *toluidine*, avec une molécule et demie de base libre, dans un flacon à long col en communication avec un réfrigérant de Liebig renversé, ou mieux encore en chauffant le mélange dans un tube scellé à la lampe et sous une pression de 4 ou 5 atmosphères. En traitant le produit par de l'acide chlorhydrique étendu de 20 à 30 fois son volume d'eau, il ne se forme pas de chlorhydrate de benzyl-toluidine, ce sel étant décomposé par l'eau, et la base libre flotte à la surface du liquide, tandis que la *toluidine* non décomposée demeure en dissolution dans la liqueur à l'état de chlorhydrate. La benzyl-toluidine ainsi séparée ne tarde pas à se prendre en une masse solide, que l'on purifie par cristallisation. Elle bout entre 355° et 360°. Ses sels sont instables; l'eau les décompose, comme nous venons de le voir. L'acide azotique la jaunit, et c'est là un caractère qui permet, suivant de Laire, de la distinguer qualitativement de la diphénylamine.

— *Dibenzyl-toluidine*

$$C^{21}H^{21}Az = C^7H^6(C^7H^7)_2AzH^2.$$

Cette base, isomérique avec la tribenzylamine $(C^7H^7)^3Az$, se produit lorsqu'on chauffe une solution alcoolique de *toluidine* avec une quantité de chlorure de benzyle égale à 3 molécules de ce second corps pour 1 molécule du premier, et qu'après avoir séparé par la potasse la base du produit ainsi obtenu, on la soumet de nouveau, et à plusieurs reprises, au même traitement. La dibenzyl-toluidine cristallise en aiguilles déliées, fusibles entre 54°,5 et 55°. La tribenzylamine cristallise en petites tables et fond aux environs de 93°). Elle est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid, plus soluble dans le même liquide à chaud. Elle jaunit lorsqu'on l'expose à l'air et à la lumière. Son chlorhydrate se dissout facilement dans l'alcool et se décompose par l'eau, avec séparation de la base libre. Le chloroplatinate, que l'on décompose également, cristallise avec facilité au sein d'une solution alcoolique mélangée d'une certaine quantité d'éther.

— *Vinyl-toluidine*

$$C^9H^{11}Az = C^7H^6(C^2H^3)AzH^2.$$

On obtient ce corps, d'après M. Wurtz, en chauffant pendant plusieurs heures, entre 220° et 225°, une molécule de *toluidine* avec 3 molécules de glycol monochlorhydrique. Il se forme un liquide brun épais, qui ne se dissout que partiellement dans l'eau, pendant qu'il se sépare une masse flocconeuse ou résineuse noire. En ajoutant le tout avec de l'éther, on dissout une quantité considérable de vinyl-toluidine, tandis qu'une autre portion de cette base se sépare sous la forme d'une poudre qu'on peut redissoudre dans l'éther ou dans la benzine. La solution éthérée abandonne, lorsqu'on l'évapore, des cristaux de vinyl-toluidine, qu'on purifie en les lavant avec un peu d'éther froid et en les faisant cristalliser dans la benzine. Elle forme alors des prismes parfaitement incolores, qui fondent entre 189° et 191° et qui se solidifient de nouveau à 183°. Elle est entièrement insoluble dans l'eau; l