180.- Determinación del período crítico de competencia de malas hierbas y maíz, para la región de General Escobedo, N.L.

181.- Determinación del período crítico de competencia de malezas y maíz tardío, para la región de General Escobedo, N.L.

182.- Determinación del período crítico de competencia entre maíz y malezas para la región de Gral. Escobedo, N.L.

183.- Determinación del período crítico de competencia entre sorgo (Sorghum vulgare Pers.) y malezas para la región de Gral. Escobedo, N.L.

184.- Determinación del porcentaje de parasitismo natural que se presentó en larvas de gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en la variedad de maíz NLVS-30 sintético precoz durante el ciclo verano-otoño de 1980, Marín, N.L.

185.- Determinación y cuantificación del daño causado por insectos en maíz almacenado en la unidad n°2 del distrito de riego n°25 Valle Hermoso Tamps.

186.- Diagnóstico de gestación en bovinos mediante la reacción de la orina con el cloruro de bario (BaCl2).

187.- Diagnóstico de mastitis mediante la prueba California en ganado bovino lechero.

188.- 16, i. e. Dieciseis alternativas de producción de frijol (Phaseolus vulgaris) en ciclo tardío, en el Ejido colectivo Rinconada, municipio de Villa de García, N.L.

189.- 16, i. e. Dieciseis alternativas de producción de frijol (Phaseolus vulgaris) en el ciclo tardío, en la unidad de riego La Victoria, municipio de Pesquería, N.L.

190.- Diferentes dosis de ácido giberélico en injerto de naranjo dulce (Citrus sinensis Osbeck).

191.- Diferentes métodos y densidades de siembra para el zacate Estrella de Africa (Cynodon plectostachyus) bajo las condiciones del municipio de Gral. Escobedo, N.L.

192.- Diferentes niveles de fertilización con nitrógeno y fósforo en el cultivo del sorgo para grano (Sorghum vulgare P.) en el ciclo temprano en el rancho "La Sandía" del municipio de Vallecillo, N.L.

193.- Diferentes niveles de fertilización en Zacate Buffel (Cenchrus ciliaris L.) bajo condiciones de temporal en Marín, N.L.

194.- Diferentes niveles de fertilización nitrogenada en zacte Buffel (Cenchrus ciliare L.) en el municipio de China, N.L.

195.- Diferentes vias fotosintéticas de las plantas y sus implicaciones en la - alimentación de los herbivoros.

196.- Digestibilidad de la papa (Solanum tuberosum) en borregos.

197.- Digestibilidad del estiércol de bovinos en borregos.

198.- Digestibilidad del maguey. (Arizpe González, Juan Pablo).

199.- Digestibilidad del maguey. (Ruíz Lozano, Hildebrando Jesús).

200.- Digestibilidad "in vitro" de cinco especies arbustivas del género Atriplex.

201.- Digestibilidad "in vitro" del estiércol de bovino.

202.- Digestibilidad "in vitro" del estiércol de cerdo.

203.- Dinámica de población de la familia noctudae y las especies: Agrotis malefida (Guenée), Pseudaletia unipuncta (Haw.), Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) y Heliothis zea (Boddie) capturados con lámpara trampa en el campo Agrícola Experimental de la FAUANL en Gral. Escobedo, N.L.

204.- Dinámica poblacional de familias de hemípteros capturados con trampa lumínica en el ciclo de enero-junio de 1978, en el municipio de Cadereyta Jiménez, N.L.

205.- Dinámica poblacional de la entomafauna maicera en el municipio de General - Bravo, Nuevo León. Ciclo primavera-verano 1977.

206.- Dinámica poblacional de la familia noctuidae y las especies: Agrotis malefida (Guenée), Pseudaletia unipuncta (Haworth), Heliothis zea (Boddie) y - Autographa sp., capturados con trampa lumínica: en General Escobedo, N.L. de Enero a Julio de 1979.

207.- Dinámica poblacional de noctuidae y otros lepidópteros utilizando trampa lumínica.

208.- Dinámica poblacional de Phyllophaga crinita (Burmeister) capturadas con - lámpara trampa. Marín, N.L.

209.- Dinámica poblacional de plagas del suelo en el ejido Santa Efigenia, Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

210.- Dinámica poblacional del picudo del chile Anthonomus eugenii Cano, en un cultivo de chile serrano Capsicum annum Linn. en El Mezquital, Apodaca, - N.L. 1979.

211.- Disección del tubo digestivo de Periplaneta americana L. (Orthoptera: Blattidae) y descripción de sus partes.

212.- Disección y dibujo de las partes de la cabeza de un chapulín, una chinche y una mariposa, son sus aparatos bucales, ojos compuestos, ocelos, antenas, suturas y escleritos. (Ceniceros Martínez, Alejandro).

213.- Disección y dibujo de las partes de la cabeza de un chapulín, una chinche y una mariposa, con sus aparatos bucales, ojos compuestos, ocelos, antenas, suturas y escleritos. (Velázquez Guerra, Victor Guillermo).

214.- Diseño de camas calientes: a) a base de estiercol. b) a base de energia eléctrica c) a base de vapor de agua.

215.- Diseño de un sistema de riego por melgas.

216.- Diseño de un sistema de riego por surcos.

217.- Diseño de una bodega refrigeradora.

218.- Diseño e instalación de un sistema de riego por goteo a base de microtubos para una huerta de frutales mixta.

219.- Diseño y análisis del modelo 2 de Griffing de cruzas dialélicas.

220.- Diseño y construcción de un laboratorio de hidráulica para la Facultad de Agronomía de la U.A.N.L.

221.- Diseño y construcción de un laboratorio de hidrostática.

222.- Disminución de mortalidad e incremento de pesos de lechones adoptados del nacimiento al destete.

223.- Disponibilidad, usos, calidad y costos de la gallinaza como mejorador del suelo en el municipio de Marín, N.L.

224.- Distanciamientos entre plantas y su efecto sobre el rendimiento y la calidad de cautro cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) var. capitata.

225.- Distribución del pasto Buffel (Cenchrus Ciliaris L.), en Nuevo León, México. Características morfológicas de 17 colectas de Buffel en diferentes habitats.

226.- Distribución espacial del gusano barrenador del maíz, Diatraea grandiosella (Dyar), del gusano elotero, Heliocoverpa (Heliothis) zea (Bodie) y de las - diabróticas Diabrotica balteada (Le Conte), D. duodecimpunctata (Howardí y D. Longicornis (Say), en el cultivo del maíz.

227.- Dosis de fertilización nitrogenada bajo diferentes densidades de siembra en el cultivo del trigo (Triticum vulgare) sembrado en surcos.

228.- Dosis óptima económica de fertilización en maíz H-509-E en el municipio de

Río Bravo, Tamaulipas.

229.- Ecuaciones de predicción de las constantes hídricas (CC Y PMP) a partir de la textura de la capa arable de los suelos del estado de Nuevo León.

230.- Edad más conveniente para la venta del becerraje de ganado cebú tipo comercial en la zona tropical del estado de Tamaulipas.

231.- Edad y tipos de destete que se utilizan en granjas porcinas de la región.

232.- Efectividad de 4 insecticidas granulados y 2 polvos en el control de plagas en una variedad de maíz elotero.

233.- Efectividad de diferentes dosis del ácido 2.2 dicloropropiónico en el control de zacate Johnson (Sorghum halapense (L.) Pers) en huerto de cítricos.

234.- Efectividad de diferentes niveles de irradiación con cobalto-60, en la esterilización de la mosca mexicana de la fruta, Anastrepha ludens (Loew).

235.- Efectividad de dos fitohormonas para fomentar el enraice en estacas de aguacate (Persea americana Mill.).

236.- Efectividad de dos herbicidas con 3 dosis diferentes en el control de zacate (Johnson) (Sorghum Halepense (2) Pers.) en una huerta de cítricos.

237.- Efectividad de dos triazinas de diferente solubilidad expuestas a capacidad de campo constante en el suelo.

238.- Efecto de altura y frecuencia de cortes sobre la producción de forraje del pasto Rhodes ("Chloris Gayana Kunt").

239.- Efecto de 5 diferentes distancias entre hileras en el desarrollo y rendimiento de la zanahoria (Daucus carota var. sativa L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L.

240.- Efecto de 5 diferentes distancias entre surcos en el cultivo del ajonjolí (Sesamum indicum L.) en la región de General Escobedo, N.L.

241.- Efecto de 5 espaciamientos entre surcos en el desarrollo y rendimiento del betabel (Beta vulgaris L.) en la región de General Escobedo, N.L.

242.- Efecto de cinco fechas de siembra en calidad y rendimiento para dos variedades de acelga (Beta vulgaris L. Var. Cicla).

243.- Efecto de 5 fechas de siembra en calidad y rendimiento para 2 variedades de acelga (Continuación de un experimento similar) (Beta vulgaris L. Var. cicla).

244.- Efecto de cinco fechas de siembra en el rendimiento y escape por precocidad al ataque de las royas de siete variedades comerciales de avena forrajera.

245.- Efecto de cinco fechas de siembra en el rendimiento y la calidad de dos variedades de betabel (Beta vulgaris L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L.

246.- Efecto de 4 fechas de siembra en la producción de seis variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en la región de General Escobedo, N.L.

247.- Efecto de cuatro fechas de siembra en la producción y calidad de dos variedades de calabacita (Cucúrbita pepo L.) en Gral. Escobedo, N.L.

248.- Efecto de 4 fechas de siembra sobre componentes de rendimiento de 4 variedades de avena (Avena sativa L.) forrajera.

249.- Efecto de 4 períodos de luz, sobre el pollo de engorda.

250.- Efecto de cuatro ritmos de reproducción para reducir el intervalo entre partos del conejo raza Nueva Zelandia.

251.- Efecto de densidad de siembra en la producción de chile serrano (Capsicum - annum, L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L.

252.- Efecto de diferentes dosis de malatión sobre la mortalidad y el daño del estado adulto de gorgojos, Sitophilus spp., en grano de maíz almacenado.

253.- Efecto de diferentes dosis de tordón 155 en primavera y en otoño, para el - control de malezas en agostadero.

254.- Efecto de diferentes leguminosas como abono verde en la producción de maíz tardío para grano, en la región de Gral. Escobedo, Nuevo León.

255.- Efecto de diferentes niveles de fertilidad en el desarrollo y producción de chile serrano (Capsicum annum L.) variedad tampiqueño.

256.- Efecto de diferentes niveles de fertilización con nitrógeno y fósforo en el rendimiento de fibra de sorgo para escoba (Sorghum vulgare L. var. Technicum), bajo condiciones de riego en la región de Nadadores, Coahuila.

257.- Efecto de diferentes niveles de humedad y de fertilización con nitrógeno en el cultivo de la avena.

258.- Efecto de diferentes poblaciones sobre los rendimientos de la variedad de - maíz para grano N.L.V.S.1, en General Escobedo, N.L.

259.- Efecto de dos niveles de salvadillo de trigo en la suplementación de cabras de raza nubia.

260.- Efecto de fertilización nitrogenada y fosforada en el pasto Estrella Africa na (Cynodon plectostachyus) bajo riego en el municipio de China, Nuevo León.

261.- Efecto de la aplicación a la semilla de dos productos químicos sobre el crecimiento, floración y componentes del rendimiento en maíz.