

Cuadro XVI- Mujeres por grado de escolaridad según la fuente de información sobre fisiología elemental de la menstruación .

Nivel de Escolaridad	Total	FUENTE DE INFORMACION .							
		No. la conoce	Platicas con su madre .	Platicas con amigas .	Platicas con su madre .	Escuela	Centros de Salud Publicos/Priv.	Lecturas	Otros Lugares
Total	348	251	11	17	24	4	27	4	10
		*72.1	3.2	4.9	6.9	1.1	7.8	1.1	2.9
Analfabeta	21	21	—	—	—	—	—	—	—
		**100.0	—	—	—	—	—	—	—
Menos de 6	126	112	3	3	1	2	3	1	1
		88.9	2.4	2.4	.8	1.6	2.4	.8	.8
6 Años	74	61	2	3	2	1	3	—	2
		82.4	2.7	4.1	2.7	1.4	4.1	—	2.7
de 7 a 9 años	56	33	5	3	6	1	5	—	3
		58.9	8.9	5.4	10.7	1.8	8.9	—	5.4
de 10 a 12	40	18	1	4	4	—	8	2	3
		45.0	2.5	10.0	10.0	—	20.0	5.0	7.5
Mas de 12	30	6	—	3	11	—	8	1	1
		20.0	—	10.0	36.7	—	26.7	3.3	3.3
Ignorado	1	—	—	1	—	—	—	—	—

\* % Tot. Col.

\*\* % Revisión .

tendencia a buscar información por sí misma, notándose una mayor preocupación sobre los aspectos del embarazo.

La edad parece no ser una variable determinante de su grado de conocimiento ya que encontramos que los porcentajes de ignorancia oscilan entre un 82% para las menores de 20 años hasta el 100% en las mayores de 44 años .

Al solicitar su opinión sobre la existencia del problema de sobrepoblación en el mundo y en México obtuvimos lo siguiente, cuadro XVI.- el 90.5% (315) opinaron que sí existen estos problemas en el mundo. La distribución de este porcentaje es bastante homogénea tanto al considerarlo por el grado de escolaridad como por el lugar de entrevista. Sin embargo al referirnos a la existencia de este problema en nuestro país cuadro XVII.- el porcentaje de mujeres que contestaron afirmativamente baja al 79% (275), encontrándose también una distribución homogénea .

El 52.3% (182) de las entrevistadas Cuadro XVIII.- reportan no conocer ningún método abortivo. Con el 35.1% (122) están las que reportaron " inyecciones, pastillas hierbas etc. que catalogamos como químicos y naturales, el 4.9% (17) los mecánicos, como " introducirse alambres " , ganchos, agujas de tejer " etc. el 5.5% (19) los quirúrgicos que corresponden a aquellas entrevistadas que mencionaron textualmente el " legrado. o raspado ". El 2.3% (8) mencionaron otros métodos como " caídas, golpes o ejercicios hechos a propósito o levantar algo muy pesado " etc.

Cuadro XVI- Mujeres por el lugar de entrevista y la escolaridad según su opinión del problema de sobre-población en el mundo .

1.- Lugar de Entrevista	O P I N I O N .			
	Total	Si Existe	No Existe	Ignorado
Total	348	315 (90.5%)	30 (8.6%)	3 (.9%)
Ser.Med. Asistencial	170	146	22	2
Serv.Med Institucional	102	94	7	1
Serv.Med. Semi-Priv.	76	75	1	—
2.- Escolaridad				
Total	348	315	30	3
Analfabeta	21	21	—	—
Menos de 6 años	126	105	19	2
de 7 a 9	74	66	7	1
de 10 a 12	56	53	3	—
Mas de 12	40	40	—	—
Ignorado	30	29	1	—
	1	1	—	—

Cuadro XVII- Número de mujeres por el lugar de entrevista y el nivel de escolaridad según su opinión sobre la existencia del problema de sobre población - en México .

1.- Lugar de Entrevista	O P I N I O N .			
	Total	Si Existe	No Existe	Ignorado
Total	348	275 (79.0%)	69 (19.8%)	4 (1.1%)
Serv.Med. Asistencial	170	133	33	4
Serv. Med. Institucional	120	84	18	—
Serv. Medicos Semi-Privado.	76	58	18	—
2.- Nivel de Escolaridad .				
Total	348	275	69	4
Analfabeta	21	16	5	—
Menos de 6 a	126	97	26	3
6 Años	74	55	18	1
de 7 a 9	56	44	12	—
de 10 a 12	40	37	3	—
Mas de 12	30	26	4	—
Ignorado	1	—	1	—

Cuadro XVIII- Mujeres por lugar de entrevista, edad y escolaridad según su conocimiento de Métodos Abortivos .

1- Lugar de Entrevista	Total	Metodos Abortivos				
		Quirúrgicos y/o Naturales	Mecanicos	Quirurgicos .	Otros	Ninguno
Total	348	122 (35.1%)	17 (4.9%)	19 (5.5%)	8 (2.3%)	182 (52.3%)
Serv. Med. Asistencial	170	63	4	6	3	94
Serv. Med. Institucional	102	34	5	4	3	56
Serv. Med. Semi-Privado	76	25	8	9	2	32
2-Edad						
Total	348	122	17	19	8	182
- Menos de 20	39	13	1	2	2	21
de 20-24	104	32	4	9	3	56
25-29	97	38	4	6	—	49
30-34	63	21	8	2	1	31
35-39	33	13	—	—	1	19
40-44	8	3	—	—	—	4
45-49	3	2	—	—	—	1
50 y +	1	—	—	—	—	1
3- Escolaridad						
Total	348	122	17	19	8	182
Analfabeta	21	5	—	1	1	14
Menos de 6	126	49	4	2	1	70
6 Años	74	28	2	2	1	41
de 7 a 9	56	24	4	2	1	25
10 a 12	40	8	2	9	2	19
Mas de 12	30	7	5	3	2	13
Ignorado	1	1	—	—	—	—

No se encontró ninguna relación entre la edad, la escolaridad o el lugar de entrevista y el conocimiento de métodos abortivos ya que la distribución en cada caso es homogénea .

#### AREA DE PRACTICA

Analizamos la relación entre el uso de anticonceptivos y las siguientes variables : Edad de la mujer, escolaridad , estado civil, práctica religiosa, actitud ante su propia fecundidad, frecuencia de relaciones sexuales, número de hijos nacidos vivos así mismo, con la edad del cónyuge, la escolaridad y el deseo del cónyuge de tener más hijos .

El 55.7% (194) de las entrevistadas no han usado ningún método anticonceptivo.

El método que alcanza un mayor porcentaje de uso son los hormonales con el 19.3% (67). Sigue el ritmo y la abstinencia con un 7.8% (27), el retiro o coitus interruptus 7.2% (25) y los métodos locales con un 6.3% (22) el dispositivo fue utilizado sólo por el 2.3% (8).

Dado que es muy alto el número de mujeres que no han usado anticonceptivos resulta difícil establecer diferencia entre las de mayor edad y las jóvenes en cuanto a su preferencia de anticonceptivos. La preferencia de los hormonales parece coincidir en la mujer de cualquier edad .

Al considerar la escolaridad de la mujer cuadro XIX.

Cuadro XIX .- Mujeres por Nivel de Instrucción según el método usado .

MÉTODOS .

Nivel de Instrucción.	Total	Ninguno	Retiro	Ritmo/Abst.	Locales	Hormonales	D.I.U.	No. Científicos	Otros Métodos
Total	348	194 *(55.7)	25 (7.2)	27 (7.8)	22 (6.3)	67 (19.3)	8 (2.3)	3 (.9)	2 (.6)
Analfabeta	21	15	3	—	—	2	1	—	—
Menor de 6	126	80 (63.5)	13 (10.3)	11 (8.7)	6 (4.8)	14 (11.1)	—	—	2 (1.6)
6 Años	74	47 (63.5)	7 (9.5)	3 (4.1)	6 (8.1)	11 (14.9)	—	—	—
de 7 a 9	56	29 (51.8)	—	6 (10.7)	4 (7.1)	13 (23.2)	3 (5.4)	1 (1.8)	—
de 10 a 12	40	17 (42.5)	1 (2.5)	6 (15.0)	4 (10.0)	11 (27.5)	1 (2.5)	—	—
12 años y más	30	6 (20.0)	1 (3.3)	—	2 (6.7)	16 (53.3)	3 (10.0)	2 (6.7)	—
Ignorado	1	—	—	1	—	—	—	—	—

\* Tot. Col.

\*\*\* Renglón .

encontramos que los hormonales son preferidos por la - - mujer de todos los niveles educativos y que la proporción - es más alta entre aquéllas de mayor escolaridad. El retiro sin embargo es preferido por las de menor escolaridad y -- que están a un nivel de primaria ya que en estos estratos - ocupa desde el 9.5 hasta el 14.3% en el nivel de analfabe - tas. El ritmo, parece ser preferido por las mujeres con -- escolaridad de 7 a 9 y 10-12 años con un 10.7% y un 15% - respectivamente, los métodos locales son preferidos por el 10% de las mujeres con escolaridad de 10 a 12 años. Al - -- analizar la relación entre escolaridad del cónyuge cuadro - XX: y uso de anticonceptivo podemos advertir que del total - de los que usan el retiro el 68% (17) tienen una escolari - dad de 6 años.

El 63% (17) de los que usan el ritmo y la abstinencia quedan comprendidos también al nivel de primaria. Mientras - que el 71.7% de los que tienen esposas que usan hormonales - tienen una escolaridad mayor de 6 años.

Ya que el 88% de nuestras entrevistadas están legal -- mente casadas no fue posible determinar relación alguna -- entre el estado civil y la preferencia de anticonceptivos..

La práctica religiosa tampoco parece ser una variable - que determine la preferencia del anticonceptivo ya que como puede apreciarse en el cuadro XXI.- los porcentajes de - - distribución resultan muy homogéneos . Por ejemplo, las - - mujeres que usan hormonales comprenden el 20% de las que - -

Cuadro XX .-

Mujeres por escolaridad del cónyuge según el anticonceptivo usado .

Nivel Escolaridad del Cónyuge	Métodos										
	Total	Ning.	Retiro	Ritmo/Abst.	Locales	Hormonales	D.I.U.	NO.Cient.	Útros	Fot.	—
Total	348	194	25	27	22	67	8	3	2		
		*(55.7%)	(7.2%)	(7.8%)	(6.3%)	(19.3%)	(2.3%)	(.9%)	(.6%)		
Analfabeta	32	24	2	3	—	3	—	—	—		
		** (75.0%)	(6.3%)	(9.4%)	—	(9.4%)	—	—	—		
Menos de 6 años	89	60	6	8	5	7	1	1	1		
		(67.4%)	(6.7%)	(9.0%)	(5.6%)	(7.9%)	(1.1%)	(1.1%)	(1.1%)		
6 años	78	46	11	6	5	9	—	—	1		
		(59.0%)	(14.1%)	(7.7%)	(6.4%)	(11.5%)	—	—	(1.3%)		
de 7 a 9	52	30	4	1	3	13	1	—	—		
		(57.7%)	(7.7%)	(1.9%)	(5.8%)	(25.0%)	(1.9%)	—	—		
de 10 a 12	27	11	—	1	3	11	1	—	—		
		(40.7%)	—	(3.7%)	(11.1%)	(40.7%)	(3.7%)	—	—		
Mas de 12	67	21	1	8	6	24	5	2	—		
		(31.1%)	(1.5%)	(11.9%)	(9.0%)	(35.8%)	(7.5%)	(3.0%)	—		
Ignorado	3	2	1	—	—	—	—	—	—		
		(66.7%)	(33.3%)	—	—	—	—	—	—		

\* % Tot. Col.

\*\* % Renglón .

Cuadro XXI- Mujeres por su práctica religiosa según el método anticonceptivo usado.

## MÉTODOS .

Religiosidad .	MÉTODOS .										
	Total	Ninguno	Retiro	Ritmo/Abst.	Locales	Hormonales	D.I.U.	Met.No Ant.	Otros	Metodos .	—
Total	348	194	25	27	22	67	8	3	2		
		*(55.7%)	(7.2%)	(7.8%)	(6.3%)	(19.3%)	(2.3%)	(.9%)	(.6%)		
1- Nunca	20	14	1	—	—	4	1	—	—		
		** (70.0%)	(5.0%)	—	—	(20.0%)	(5.0%)	—	—		
2- Semanalmente .	107	54	10	12	7	23	1	—	—		
		(50.5%)	(9.3%)	(11.2%)	(6.5%)	(21.5%)	(.9%)	—	—		
3- Mensualmente .	83	47	3	7	6	15	3	2	—		
		(56.6%)	(3.6%)	(8.4%)	(7.2%)	(18.1%)	(3.6%)	(2.4%)	—		
4- 3 a 5 veces al año.	126	75	10	6	8	23	2	—	2		
		(59.5%)	(7.9%)	(4.8%)	(6.3%)	(18.3%)	(1.6%)	—	(1.6%)		
5- Ignorado	12	4	1	2	2	1	1	1	—		
		(33.3%)	(3.3%)	(16.6%)	(16.6%)	(8.3%)	(8.3%)	(8.3%)	—		

\* % Tot. Col.

\*\* % Renglón .

nunca asisten, el 21.5% de las que asisten semanalmente, el 18.1% de las que van mensualmente y el 18.3% de aquellas que van de 3 a 5 veces al año. Si consideramos los valores por columna el mayor número de mujeres que practican el ritmo corresponde al 44.4% (12) y se encuentran en la categoría de asistencia semanal.

Parece existir cierta incongruencia entre la opinión de la entrevistada ante su propia fecundidad cuadro XXII y la preferencia del anticonceptivo usado. Es de esperar que aquellas mujeres que consideran tener más hijos de los que desearon, usaran un método que les ofreciera mayor efectividad. Sin embargo, los resultados son muy diferentes.

De estas mujeres que tienen más hijos que los deseados, el 54% no usan ningún método, sólo el 14% usan hormonales y en el mismo porcentaje utilizan el ritmo y abstinencia. En cambio el 20.7% de las que tienen menos de los hijos deseados usan los hormonales. En general el 42% (146) de las entrevistadas, está conforme con el número de hijos que tiene, un 34.8% (121) desean más hijos y sólo el 14.4% (50) consideran que han tenido más hijos que los deseados.

Sobre el deseo del cónyuge de tener más hijos y su relación con el anticonceptivo usado, cuadro XXIII- parece existir mayor congruencia en ciertos aspectos. En general, el 37.9% (132) de los esposos no desean más hijos. Sin embargo al igual que las esposas el 50% no practican ningún método anticonceptivo. De este mismo porcentaje sólo el 15.2% (20) reportan utilizar los métodos hormonales. De los-

Cuadro XXII.- "Mujeres por la opinión ante su fecundidad según el anticonceptivo usado"

Estado Civil	Total	Método					Otros Mt.		
		Ninguno	Retiro	Ritmo/Abst	Locales	Homonales		Dispositivo Met.No.Cient.	
Total	348	194 (55.7%)	25 (7.2%)	27 (7.8%)	22 (6.3%)	67 (19.31%)	8 (2.3%)	3 (.9%)	2 (.6%)
1-No tiene hijos	7	4 (57.1%)	1 (14.3%)	—	—	2 (28.6%)	—	—	—
2-Hijos tenido iguales a deseado	146	80 (54.8%)	14 (9.6%)	11 (7.5%)	10 (6.8%)	26 (38.8%)	3 (2.1%)	1 (.7%)	1 (.7%)
3-Mas deseados	50	27 (54.0%)	3 (6.0%)	7 (14.0%)	5 (10.0%)	7 (14.0%)	1 (2.0%)	—	—
4- Menos de los deseados	121	69 (57.0%)	5 (4.1%)	9 (7.4%)	6 (5.0%)	25 (20.7%)	4 (3.3%)	2 (1.7%)	1 (.8%)
5- Ignorado	24	14 (58.3%)	2 (8.3%)	—	1 (4.2%)	7 (29.2%)	—	—	—

\* % Tot. Col.  
\*\* % Región.

Cuadro XXIII . - Mujeres por el deseo del cónyuge de tener mas hijos según el anticonceptivo usado .

Deseo del Cónyuge	Anticonceptivos Usado									
	Total	Ninguno	Retiro	Ritmo/Abst.	Locales	Hormonales	D.I.U.	Met.No Ant.	Otros Metodos	
Total	348	194	25	27	22	67	8	3	2	
		* (55.7)	(7.2%)	(7.8%)	(6.3%)	(19.3%)	(2.3%)	(.9%)	(.6%)	
Ninguno o más	132	66	14	14	13	20	3	1	1	
		** (50.0%)	(10.6%)	(10.6%)	(9.8%)	(15.2%)	(2.3%)	(.8%)	(.8%)	
Un hijo más	43	19	1	3	2	14	2	1	1	
		(44.2%)	(2.3%)	(7.0%)	(4.7%)	(32.6%)	(4.7%)	(2.3%)	(2.3%)	
de 2 a 4 más	88	49	3	5	6	21	3	1		
		( 55.7%)	(3.4%)	(5.7%)	(6.8%)	(23.9%)	(3.4%)	(1.1%)		
desea + de 4	17	14	—	2	—	1	—	—	—	
		(82.4%)	—	(11.8%)	—	(5.9%)	—	—	—	
No lo sabe	57	39	7	2	1	8	—	—	—	
		(68.4%)	(12.3%)	(3.5%)	(1.8%)	(14.0%)	—	—	—	
Ignorado	11	7	—	1	—	3	—	—	—	
		(63.6%)	—	(9.1%)	—	(27.3%)	—	—	—	

\*%tot. Col.

\*\*% Renglón .

que desean un hijo más que corresponden al 12.4% (43) el - 32.6% (14) usan métodos hormonales, esta relación si parece ser congruente, ya que usan un método que ofrece un buen índice de efectividad. También es evidente, la relación -- proporcional entre las parejas que desean más hijos y el número que no usan anticonceptivos .

Al analizar la frecuencia de relaciones sexuales - encontramos que el 43.1% (150) reportan una frecuencia de una o dos veces por semana. El 27% (94) tres o más veces por semana, el 18.7% (65) dos o 3 veces por mes y el 9.8% (34) mensual. Los porcentajes de distribución resultan muy homogéneos por lo que no es posible establecer preferencias anticonceptivas .

No parece evidente una relación en el número de hijos-nacidos vivos y los anticonceptivos usados, cuadro XXIV. La proporción de mujeres que no han utilizado ningún método - independientemente del número de hijos es muy elevada y - oscila desde el 64.9% para nulípara hasta el 64.7% para - la gran múltipara que tiene 10 y más hijos .

Encontramos que de las 93 mujeres que reportaron haber tenido abortos, 15 de ellas que representan el 16.1% de - este grupo y el 4.3% del total de entrevistadas, practica- ron el aborto de una a 3 veces. Sus motivos para la acepta- ción del aborto fueron, en 6 casos el 40% por tener demasia- dos hijos, en 5 casos el 33.3% por problemas conyugales, en 2 casos el 13.3% por motivos de salud y en los 2 casos - restantes, se ignoran las causas. De estas 15 mujeres, tres