

tisme articulaire aigu. — Ouverture spontanée dans le rectum. — Quatre mois après la santé générale s'était rétablie; mais le malade rendait toujours du pus par le rectum. Cet écoulement était intermittent. Il durait trois ou quatre jours, puis cessait pendant plusieurs semaines pour reparaitre ensuite. (*Clin. méd. chir.*, p. 273.)

LALLEMAND. — 76 — Absès de la prostate à évolution lente chez un menuisier entré à l'Hôtel-Dieu Saint-Éloi le 29 novembre 1842. — Ouverture spontanée dans l'urèthre et le rectum. — Fistule uréthro-rectale. — Suppuration prolongée. — Cystite. — Pyélonéphrite. — Mort. (*Clin. méd.-chir.*, p. 288.)

LALLEMAND. — 77 — Absès de la prostate. — Ouverture simultanée dans l'urèthre et le rectum. — Large fistule uréthro-rectale. — Destruction complète de la prostate. — Suppuration prolongée. — Pleuro-pneumonie. — Mort. (*Clin. méd.-chir.* p. 289.)

MOYSANT. — 78 — Suppuration périprostatique chez un calculeux de 74 ans à la suite de tentatives brutales de cathétérismes ayant déchiré la muqueuse prostatique. — Mort avec délire et parotidite suppurée. — A l'autopsie : « la prostate est entourée d'un grand nombre d'abcès développés seulement dans le tissu cellulaire périprostatique. » (*Bull. Soc. anat.*, 1856, p. 81.)

MUNCHMEYER. — 79 — Absès de la prostate chez un cordonnier de 56 ans dont la constitution était altérée par des excès vénériens et des « maladies syphilitiques antérieures ». — Fusée périnéale. — Fistule. — Ouverture consécutive dans l'urèthre. — Infiltration d'urine. — Gangrène des téguments. — Dénudation des testicules. — Guérison. (*Obs. allemande relatée in Gaz. méd. de Paris*, 1839, p. 790.)

NÉLATON. — 80 Hypertrophie de la prostate chez un vieillard. — Rétention d'urine. — Absès de la prostate. — Ouverture dans l'urèthre pendant un effort de défécation. (*Obs. citée par Horion, loc. cit.*, p. 337.)

NÉLATON. — 81 — Goutte militaire depuis huit ans chez un jeune homme bien constitué et bien portant d'ailleurs. — Injection d'huile camphrée poussée avec force. — Rétention brusque avec phénomènes douloureux et avec fièvre. — Absès de la prostate. — Ouverture spontanée de l'abcès dans l'urèthre pendant le cathétérisme. — Guérison. (*Fr. médic.*, 1859, p. 163.)

NÉLATON. — 82 — Absès de la prostate. — Rétention d'urine. — Ouverture spontanée dans le rectum. — Production ultérieure d'une fistule urinaire ombilicale. (Dilatation de l'ouraque restée perméable). — Terminaison inconnue. (*Obs. citée par Horion, loc. cit.*, p. 324.)

OLIVE. — 83 — Absès de la prostate chez un sujet atteint de cystite cantharidienne. — Ouverture dans l'urèthre pendant le cathétérisme. — Guérison. (*Voir obs. XIX de cette thèse.*)

OTTO STOLL. — 84 — Absès de la prostate chez un homme de 27 ans atteint de blennorrhagie. — Ouverture par le cathétérisme. — Guérison au bout de trois semaines. (*Otto Stoll, Zur Pathologie und Therapie des acuten Prostata abscesses. Zurich, 1877, p. 5.*)

OTTO STOLL. — 85 — Absès de la prostate et périprostatique chez un homme de 55 ans atteint de blennorrhagie. — Ouverture spontanée dans l'urèthre et le rectum. — Guérison au bout de deux mois un quart. (*Loc. cit.*, p. 5.)

OTTO STOLL. — 86 — Absès de la prostate chez un homme de 62 ans atteint de blennorrhagie. — Ouverture spontanée dans le rectum. — Cystite et pyélite. — Guérison après un mois et demi. (*Loc. cit.*, p. 7.)

OTTO STOLL. — 87 — Absès de la prostate consécutif à une fausse route chez un homme de 30 ans. — Ponction par le périnée avec un trocart. — Néphrite. — Infiltration d'urine. — Mort au bout d'un mois par infection purulente. (*Loc. cit.*, p. 8.)

OTTO STOLL. — 88 — Absès de la prostate chez un homme de 49 ans atteint de rétrécissement. — Ouverture chirurgicale par le périnée. — Amélioration au bout de quatre semaines. (*Loc. cit.*, p. 9.)

OTTO STOLL. — 89 — Absès de la prostate chez un homme de 53 ans atteint de blennorrhagie. — Incision pratiquée probablement par le rectum. — Guérison après trois semaines. (*Loc. cit.*, p. 9.)

OTTO STOLL. — 90 — Absès de la prostate chez un homme de 39 ans. — Ouverture spontanée dans le rectum et l'urèthre. — Cysto-pyérite et périprostatite. — Guérison au bout de deux semaines. (*Loc. cit.*, p. 10.)

OTTO STOLL. — 91 — Absès de la prostate chez un homme de 28 ans atteint de blennorrhagie. — Incision par le rectum. — Cystite. — Guérison après deux mois et demi. (*Loc. cit.*, p. 11.)

OTTO STOLL. — 92 — Absès de la prostate chez un homme de 62 ans atteint de blennorrhagie. — Incision par le périnée. — Amélioration et fistule périnéale persistante après deux mois. (*Loc. cit.*, p. 12.)

OTTO STOLL. — 93 — Absès de la prostate avec périprostatite et cystite aiguë chez un homme de 32 ans atteint de blennorrhagie. — Incision par le périnée. — Guérison après sept semaines. (*Loc. cit.*, p. 12.)

- OTTO STOLL. — 94** — Abscès de la prostate chez un homme de 33 ans atteint de blennorrhagie. — Ouverture spontanée de l'abcès dans l'urèthre. Cysto-pyérite. — Guérison après trois semaines. (*Loc. cit.*, p. 13.)
- OTTO STOLL. — 95** — Abscès de la prostate chez un homme de 43 ans atteint de blennorrhagie. — Ouverture spontanée dans l'urèthre. — Guérison au bout de dix jours. (*Loc. cit.*, p. 14.)
- OTTO STOLL. — 96** — Abscès de la prostate chez un homme de 57 ans atteint de rétrécissement de l'urèthre. — Ouverture spontanée dans l'urèthre. — Cystite. — Guérison après un mois et demi. (*Loc. cit.*, p. 15.)
- OTTO STOLL. — 97** — Abscès de la prostate chez un homme de 30 ans. — Cause inconnue. — Ouverture spontanée dans le rectum et l'urèthre. — Guérison après une semaine (?) (*Loc. cit.*, p. 16.)
- OTTO STOLL. — 98** — Abscès de la prostate chez un homme de 27 ans. — Cause inconnue. — Incision par le rectum. — Guérison après trois semaines. (*Loc. cit.*, p. 17.)
- OTTO STOLL. — 99** — Abscès de la prostate consécutif peut-être à un refroidissement chez un homme de 65 ans. — Ouverture dans l'urèthre. — Mort par infection purulente, avec néphrite et abcès métastatique du poumon. (*Loc. cit.*, p. 17.)
- OTTO STOLL. — 100** — Abscès de la prostate consécutif à une fausse route chez un homme de 76 ans. — Ouverture spontanée dans l'urèthre. — Cystite. — Pyérite. — Gangrène du rectum. — Péritonite. — Mort au bout de deux semaines. (*Loc. cit.*, p. 18.)
- PETIT (J.-L.). — 101** — Abscès de la prostate chez un malade atteint d'hypertrophie de la prostate. — Ouverture de l'abcès dans la vessie par pression volontaire avec le bec de la sonde. — Guérison. (*Voir obs. I de cette thèse.*)
- PETIT (J.-L.). — 102** — Abscès de la prostate développé au cours d'une chaudepisse à la suite d'un excès de boisson, chez un homme de 35 à 40 ans ayant eu plusieurs chaudepisses antérieures. — Ouverture dans la vessie (?) pendant un effort de vomissement. — Guérison de l'abcès. (*Voir obs. II de cette thèse.*)
- PIGEAUX. — 103** — Prostatite blennorrhagique. — Abscès de la prostate. — Fusée vers l'anneau inguinal par l'intermédiaire du canal déférent. (*Bull. Soc. anat.*, 1830, p. 188.)
- POZZI. — 104** — Abscès de la prostate chez un étudiant en médecine qui, atteint de blennorrhagie, s'était livré à des excès divers. — Ouver-

- ture spontanée dans l'urèthre. — Fusée purulente dans la fosse ischio-rectale et fistule consécutive. — La guérison de la fistule et de l'écoulement uréthral n'a été obtenue que neuf mois après la première poussée de prostatite. (*Voir obs. XI de cette thèse.*)
- RELIQUET. — 105** — Hypersécrétion uréthrale ancienne chez un homme de 28 à 29 ans. — Excès génésiques. — Inflammation de la vésicule séminale droite. — Phlegmon rétro-prostatique. — Propagation le long du canal déférent jusqu'au niveau de la région inguinale. — Guérison. — Deux mois après, hernie inguinale. — Un an après, « l'anneau externe et l'anneau interne sont revenus sur eux-mêmes; il n'y a plus trace de hernie. » (*In note lue à la Soc. de méd. de Paris dans la séance du 9 février 1878.*)
- RELIQUET. — 106** — Abscès rétro-prostatique de cause inconnue développé chez un homme de 52 ans. — Ouverture spontanée dans le rectum. — Fusée le long du canal déférent jusqu'au niveau du canal inguinal droit. — Incision à ce niveau. — Irrigations rectales et injections dans l'abcès inguinal d'eau phéniquée au millième. — Guérison. (*In note lue à la Soc. de méd. de Paris dans la séance du 9 février 1878.*)
- RELIQUET. — 107** — Phlegmon rétro-prostatique de cause indéterminée chez un homme de 34 ans. — Ouverture spontanée dans le rectum. — Guérison. (*In note lue à la Soc. de méd. de Paris, séance du 9 février 1878.*)
- RELIQUET. — 108** — Phlegmon rétro-prostatique de cause indéterminée chez un homme de 55 à 60 ans. — Ouverture spontanée dans le rectum. — Guérison. (*In note lue à la Soc. de méd. de Paris, séance du 9 février 1878.*)
- SOCIN. — 109** — Gros abcès de la prostate trouvé à l'autopsie d'un sujet mort d'infection purulente. — L'infection purulente avait eu pour point de départ un phlegmon du pied droit. (*In Handbuch... Pitha et Billroth, t. III, deuxième partie.*)
- SOLMON. — 110** — Rétrécissement uréthral consécutif à plusieurs blennorrhagies antérieures chez un homme de 42 ans. — Rupture de l'urèthre en arrière du rétrécissement. — Fistule périnéale. — Mort par érysipèle. — A l'autopsie : Prostate complètement détruite par la suppuration. — La loge communique avec l'urèthre par deux petits orifices situés de chaque côté du verumontanum. — Elle communique en haut avec une deuxième poche purulente située entre la vessie et le rectum. (*Bull. Soc. anat.*, 1871, p. 220.)
- STOLL. — 111** — Homme de 32 ans. — Plusieurs blennorrhagies antérieures. — Rétrécissement. — Mort avec des phénomènes de rétention. — A l'autopsie : abcès miliiaires multiples dans le pas.

renchyme prostatique, etc. (D'après Lallemand. *Pertes sém. invol.*, t. I, p. 42, 1845.)

TERRILLON. — 112 — Abscès prostatique aigu d'origine blennorrhagique chez un jeune homme de 19 ans. — Battements artériels au niveau de l'abcès. — Incision par le rectum. — Guérison. (*Gaz. des hôp.*, 1879, p. 936.)

THOMPSON. — 113 — Prostatite et cystite à la suite d'excès et après l'exposition au froid chez un homme de 54 ans. — Terminaison par un abcès de la prostate. — Ouverture spontanée dans l'urèthre. — Mort de pneumonie. (*Traité prat. des mal. des v. urin.* Trad. française, p. 356. Paris, 1874.)

THOMPSON. — 114 — Obstruction fort ancienne de l'urèthre chez un homme de 73 ans. — Difficulté de la miction et incontinence depuis plusieurs années. — Cathétérisme impossible. — Mort. — A l'autopsie : deux calculs gros comme un petit pois enchatonnés dans la portion bulbeuse de l'urèthre. — Fonte purulente de la prostate. — Communication de l'abcès prostatique avec l'urèthre. — Abscès de la vésicule séminale droite. (*Loc. cit.*, p. 357.)

TILLAUX. — 115 — Abscès de la prostate chez un jeune homme de 20 ans. — Le malade était indemne de toute affection urétrale antérieure. — La prostatite a nettement succédé chez lui aux excès d'un coït excessif. — Ouverture spontanée de l'abcès dans l'urèthre. — Deuxième poussée inflammatoire, diffusion vers le trou obturateur gauche et tumeur phlegmoneuse à la racine de la cuisse. — Cette propagation fémorale n'aboutit pas à suppuration et se termine par résolution. — Mais, peu après, ouverture spontanée de l'abcès péri-prostatique dans le rectum. — Fistule uréthro-rectale consécutive. — Suppuration abondante. — Mort par épuisement. (*Voir obs. XXX de cette thèse.*)

renchyme prostatique, etc. (D'après Lallemand. *Pertes sém. invol.*, t. I, p. 42, 1845.)

TERRILLON. — 112 — Abscès prostatique aigu d'origine blennorrhagique chez un jeune homme de 19 ans. — Battements artériels au niveau de l'abcès. — Incision par le rectum. — Guérison. (*Gaz. des hôp.*, 1879, p. 936.)

THOMPSON. — 113 — Prostatite et cystite à la suite d'excès et après l'exposition au froid chez un homme de 54 ans. — Terminaison par un abcès de la prostate. — Ouverture spontanée dans l'urèthre. — Mort de pneumonie. (*Traité prat. des mal. des v. urin.* Trad. française, p. 356. Paris, 1874.)

Les 115 observations résumées dans le tableau précédent se répartissent de la manière suivante au point de vue de l'âge, des causes, de la marche, de la durée et de la terminaison.

AGE

L'âge est indiqué 86 fois. Le malade le plus jeune avait 19 ans, et le plus vieux 84 ans.

Le relevé de ces 86 cas, pris en bloc, semble indiquer que le maximum de fréquence des abcès prostatiques correspond à l'âge de 42 à 43 ans. Je ne crois pas le fait exact. — Il faut, pour donner quelque valeur à une statistique de ce genre, tenir compte des circonstances étiologiques et distinguer deux séries de fait :

- 1° Les prostatites d'origine urétrale (blennorrhagie, etc.) ;
- 2° Les prostatites qui se développent chez des malades atteints d'hypertrophie prostatique.

En procédant ainsi, on trouve comme âge moyen des malades de la première série : 34 à 35 ans. (Le plus jeune avait 19 ans, et le plus vieux 57 ans.)

Pour ceux de la deuxième, l'âge moyen correspond à 67 ou 68 ans. (Le plus jeune avait 54 ans, et le plus vieux 84 ans.)

CAUSES

Sur les 115 observations la cause est notée 98 fois.

Les 98 cas comprennent :

{	12 cas d'abcès développés sans qu'il soit fait mention d'un état pathologique antérieur du canal ou de la prostate.
	86 cas d'abcès avec état pathologique antérieur du canal ou de la prostate.