

plumas de la rabadilla de un rojo vivo con la punta de un tinte amarillo y el tallo azul; las dos rectrices medias son verdes; las laterales son rosadas, ó de un rojo claro por dentro, y azules en su borde externo y en la punta. El pico es gris, si bien mas claro en la base; debajo de la fosa nasal hay una mancha de color de rosa; las patas son de un gris pizarra; el círculo del ojo gris azul y el iris gris pardo.

La hembra tiene los colores algo mas pálidos que el macho.

En los pequeños domina el gris, el azul en los individuos de mas edad.



Fig. 12. — EL CRISOTIS AMAZONA

ran á las selvas vírgenes. Reunidos en bandadas hacen un ruido que aturde, y cuando se aíslan por parejas, solo producen un simple murmullo ó lanzan un grito de llamada.

El apareamiento se verifica en la estación seca: esta especie se reproduce como todos los demás loros.

**CAZA.**—Se persigue en el Brasil con mucha actividad al maitaca, para alejarle de las plantaciones y comer su carne.

**CAUTIVIDAD.**—Se ven con frecuencia individuos cautivos; pero no son tan fáciles de instruir como las otras especies, aunque se domestican bien, y aprenden á decir algunas palabras si se tiene un poco de paciencia para enseñarles. Se llevan muchos á los puertos, donde los compran los marineros, porque tienen seguridad de venderlos á buen precio en Europa. Si se cuida bien el maitaca soporta largo tiempo la cautividad.

### LOS PAPAGAYOS—DEROPTIUS

**CARACTÉRES.**—El tipo de este pequeño grupo genérico se diferencia de todos los demás sitacídeos por las plumas de la nuca y del cuello, que son lacias y susceptibles de desplegarse en forma de abanico, á voluntad del animal. El pico es sólido y está provisto de un diente romo, aunque resistente; la mandíbula superior presenta una arista saliente en forma de gancho; la piel que cubre la base es recta y termina en forma de S. El ojo está rodeado de un círculo desnudo; el ala, que es obtusa, llega hasta la mitad de su anchura y larga cola, compuesta de plumas redondeadas; los tar-

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El príncipe de Wied, Schomburgk, Burmeister y otros viajeros nos dicen que el maitaca habita en todas las costas del Brasil y de la Guyana.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Durante la sequía viven estos loros apareados; en la estación de las lluvias forman numerosas bandadas; vuelan de un árbol á otro gritando; devoran los frutos, destrozan los plantíos y vuelven por la tarde á su retiro. Sus excursiones varían segun el grado de madurez de los frutos: vagan por el país, y en la estación de las lluvias se acercan á los terrenos cultivados, mientras que en la época de la sequía se reti-

ran á las selvas vírgenes. Reunidos en bandadas hacen un ruido que aturde, y cuando se aíslan por parejas, solo producen un simple murmullo ó lanzan un grito de llamada.

### EL PAPAGAYO ACCIPITRINO—DEROPTIUS ACCIPITRINUS

**CARACTÉRES.**—Linneo designó con dos nombres á los representantes de esta especie: *psittacus accipitrinus*, á causa de su plumaje, que ofrece cierta analogía con el del gavilán; y *psittacus coronatus*, por la disposición de las plumas del cuello. Este papagayo tiene la cabeza de color gris amarillo claro; pardo el borde externo de la frente y una faja que se extiende desde el pico al ojo; el moño de un rojo súcio, bordeado de azul celeste; el lomo verde claro, un poco mas oscuro en el centro que á los lados; las plumas de la parte inferior del cuerpo son rojas, orilladas de verde en el pecho y de azul en el vientre; las mejillas y el cuello son parduscos; el extremo del ala negro; de este mismo tinte la cara inferior de la cola, y la superior azulada. Segun Burmeister, mide este loro 0<sup>m</sup> 38 de largo, de los cuales corresponden 0<sup>m</sup> 15 á la cola; el ala cerrada alcanza 0<sup>m</sup> 20.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Segun lo que hasta ahora se sabe, el papagayo accipitrino habita los bosques de las orillas del Amazonas y de la Guyana, donde es tan comun como los otros loros. Spix le vió cerca de Villa-Nova, en el Amazonas; Schomburgk no hace mencion de él mas que dos veces en la relacion de su viaje; dice que los encontró cerca del Rupunisi, y domesticados algunos en las chozas de los Warraus.

### EL SITÁCULO GORRION — PSITTACULA PAS-SERINA

**CARACTÉRES.**—Este loro representa la especie mas conocida y el mas pequeño de los sitacídeos del Brasil, pues apenas aventaja en tamaño al que acabamos de examinar. Tiene un bonito plumaje verde, con algunos reflejos amarillentos en la frente, en la cara y el vientre; por debajo de las alas y de la cola es de un tinte azulado brillante; el borde anterior del ala, las grandes sub-ales, las rémiges secundarias, las escapulares y la parte inferior del lomo son de un azul oscuro; las rémiges primarias de un pardo oscuro con un borde exterior verde. El pico es ceniciento azulado; la piel que cubre su base, un poco mas clara; las patas de un gris ceniciento con escamas verdosas, y el iris gris pardo.



Fig. 13.—EL SITÁCULO DE SWINDER

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El sitáculo gorrion es una de las aves mas comunes del Brasil.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Habita indiferentemente los bosques de la costa y los jarales de terrenos secos. Sus bandadas invaden los jardines, como los gorriones los nuestros; lo mismo que ellos, se llevan cuanto pueden, y se oye continuamente su cháchara. Cuando se espanta una bandada es cuando mas á menudo produce cada individuo un breve grito estridente; el conjunto de todos constituye un ruido insoportable. Algunas veces se precipitan estas aves sobre un árbol con objeto de arrebatar sus frutos, y entonces se observa una continua agitacion; chillan, trepan, suben y bajan sin cesar por las ramas. A menudo suelen caer de un tiro diez ó doce.

Por todo lo demás, tiene el sitáculo gorrion las mismas costumbres que sus congéneres; anida en los troncos huecos, ó segun Azara, en los nidos abandonados del hornero rojo (*furnarius rufus*), pone tres ó cuatro huevos blancos y los deposita en un lecho de ramaje.

**CAUTIVIDAD.**—Los brasileños se apoderan con frecuencia de estas aves, que ora jóvenes, ora viejas, parecen consolarse pronto de la pérdida de su independencia, por lo menos mientras no se les separe de su pareja: al cabo de pocos dias se domestican y no tratan de huir; pero no viven mucho tiempo, y por esto son raras en

Pocas noticias nos da Schomburgk respecto al género de vida de esta especie en su estado libre, por mas que haya tenido ocasion de observar y de ver innumerables bandadas en las palmeras de Saurari. «Cuando se encoleriza, dice, y se levantan las brillantes plumas de su nuca, formando un círculo alrededor de la cabeza, representa uno de los mas hermosos loros. Los colonos le llaman *hia*, por imitacion de su grito.» El mismo viajero nos dice tambien que este papagayo busca los bosques mas elevados, inmediatos á las viviendas; que no es receloso y se domestica fácilmente, pero que no se presta mucho á la instruccion; que anida en los huecos de los árboles y pone á menudo cuatro huevos en vez de dos ó tres.

### LOS SITÁCULOS — PSITTACULA

Entre los loros propiamente dichos existen además otros que merecen digamos acerca de ellos algunas palabras: son los que forman el grupo de los sitáculos ó *loros enanos*, aves las mas bonitas que se conocen, de vistoso plumaje y agradables costumbres. «Los poetas, dice Schomburgk, ignoraban la tierna amistad que se profesan los dos sexos de los loros enanos, por eso eligieron la tórtola como símbolo del amor idílico: ¡no sabian cuán inferior era al de nuestros loros! Entre el macho y la hembra reina la mas perfecta armonía; sus voluntades y sus actos están siempre de acuerdo: si él come, ella tambien; si se baña, le hace compañía; si grita, le contesta; si uno de ellos enferma, es cuidado y alimentado por el otro; y aunque se reuna en un mismo árbol una numerosa bandada, nunca se separan las parejas.» Sabido es que no se pueden conservar estos bonitos loros cautivos si no están apareados, y que es preciso darles por compañía otras especies. Los pequeños que se cojen en el nido, sin haber sabido antes lo que es aquel sentimiento cariñoso, se pueden criar solos; pero los que se han apareado, rara vez sobreviven á su pareja, y no tardan en sucumbir, victimas de su dolor. Creo que esto basta para justificar el nombre de *inseparables* con que se les ha designado.

**CARACTÉRES.**—El nombre genérico de los loros enanos es muy apropiado: tienen la talla del pinzon ó de la calandria; el pico corto, de gancho muy obtuso; la cola corta y muy pequeña, con plumas bastante iguales; las alas puntiagudas y angostas, alcanzan la punta de la cola cuando están recojidas; las patas son endebles y pequeñas; las plumas blandas, largas, unicoloras, y por lo general de tintes poco vivos.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Habitan estos loritos el África, el Asia y la América del sur.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Forman el tránsito de los loros á los pájaros; pero son verdaderos loros que trepan ágilmente por las ramas y vuelan con mucha rapidez. Se alimentan de frutos y granos; anidan en los troncos huecos y ponen huevos pequeños, redondos y blancos.

Este grupo comprende varias especies, algunas de las cuales han sido separadas genéricamente.

### EL SITÁCULO DE SWINDER—PSITTACULA SWINDERIANA

**CARACTÉRES.**—Esta especie, que se ha tomado por tipo del género *Agapornis*, es una de las mas bonitas entre los loros enanos. Tiene cuando mas 0<sup>m</sup> 14 de largo, de los cuales corresponden 0<sup>m</sup> 03 á la cola, con corta diferencia; sus alas extendidas alcanzan 0<sup>m</sup> 25; el largo no excede de 0<sup>m</sup> 08. El fondo del plumaje es verde; la parte inferior del lomo, la rabadilla y las plumas superiores del ala, azul celeste; la cola corta, apenas redondeada; las pennas que la constituyen, excepto las dos medias, cuya superficie es verde, son de un rojo oscuro en su mitad basilar y verdes en la terminal, hallándose separados los dos colores por una faja negruzca. La cara, el vientre y las plumas que cubren la cola son de un verde amarillo; el cuello y el pecho de un amarillo de ocre verdoso; y adorna la parte superior del cuello un collar negro (fig. 13).

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Indicase como patria de tan precioso loro el oeste y el centro de África.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Carecemos completamente de datos acerca de su estado libre: los pocos individuos que se han visto vivos en Europa tienen las mismas costumbres que las otras especies del grupo.

Europa. No obstante, cuando se las cuida bien, se las puede conservar varios años y conseguir que aniden. Los pocos aficionados que han tenido la suerte de observarlas, hablan con entusiasmo de sus dulces costumbres, particularmente cuando están en celo.

### LOS NASISTERNOS — NASISTERNA

**CARACTÉRES.**— Los nasisternos, designados también con el nombre genérico de *micropsita*, «son loros en miniatura,» según la elegante frase de Buffon; y se diferencian de los otros sitacideos enanos por su pico proporcionalmente fuerte y grueso, comprimido lateralmente y terminado en una punta muy encorvada. Los bordes de la mandíbula superior son muy recortados por detrás del extremo; la cola es fuerte, corta, ancha, redondeada, con rectrices resistentes que terminan en aguda punta: las alas son tan largas como la cola.

El pequeño grupo de los nasisternos solo comprende hasta ahora la siguiente especie:

#### EL NASISTERNO PIGMEO — NASISTERNA PYGMÆA

**CARACTÉRES.**— Es el más pequeño de los sitacideos enanos: tiene el tamaño del canario; es verde, con la cabeza amarilla y la cara pardusca; las pennas medias de la cola son azules, y las otras negras y amarillas en la punta.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**— El nasisterno pigmeo es raro en los altos árboles de la costa de Nueva Guinea y en los bosques de las islas de Salawati y de Misool.

Gracias a su exiguo tamaño y al verde color de su plumaje, no se le divisa muchas veces, y nadie le ha observado hasta aquí lo bastante para poder darnos detalles acerca de sus costumbres.

## LOS LÓRIDOS — LORII

Hay loros asiáticos de cola corta que difieren esencialmente de los que hemos descrito hasta ahora: son los lóridos, con los cuales se forma una familia distinta.

**CARACTÉRES.**— Se caracterizan por tener el pico relativamente largo y endeble; la mandíbula inferior, poco encorvada, y sin escotadura en su borde cortante, se termina en una punta estrecha; la lengua, poco musculosa, se divide en su extremo en forma de un pincel de fibras córneas; el plumaje es variado, de vivos colores, entre los cuales domina el rojo.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**— Los lóridos habitan las Indias y las islas próximas.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**— Carecemos de detalles precisos acerca de las costumbres de estos loros cuando viven libres; bien es verdad que lo mismo nos sucede con todos los demás de la India.

Se ha dicho que se valen de su lengua para lamer los jugos azucarados que fluyen de las flores, y que la dificultad de proporcionarles semejante alimento es el grande obstáculo para conservarles mucho tiempo.

**CAUTIVIDAD.**— A pesar de todo, se reciben con frecuencia en Europa lóridos cautivos, y viven varios años. Se les puede instruir y enseñar á que hablen; pero no divierten mucho, pues son tan pacíficos que aburren.

### LOS LORIS — LORIUS

**CARACTÉRES.**— Los loris propiamente dichos tienen un plumaje en el que domina el rojo; su cola es regular y redondeada en el extremo.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**— El género loris no se encuentra sino en las islas del Océano indico.

#### EL LORI DE LAS DAMAS — LORIUS DOMICELLA

**CARACTÉRES.**— El lori de las damas (fig. 14), que se llama también *lori de collar* y *periquito*, representa la mayor especie, y la que con más frecuencia vemos en Europa. Es un magnífico loro de 0<sup>m</sup> 33 de largo por 0<sup>m</sup> 55 de punta á punta de ala; el plumaje es de un rojo escarlata muy vivo; la parte superior de la cabeza de un púrpura oscuro y la posterior violeta; la cara superior de las alas verde, y las piernas de un tinte azul celeste. En el pecho lleva una mancha amarilla en forma de media luna; las plumas de la cola son de un rojo escarlata, orilladas de negro en su parte terminal y con la punta amarilla; el pico es amarillo anaranjado y los tarsos de un gris oscuro.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**— El lori de las damas habita en bandadas en los bosques de Borneo y de la Nueva Guinea.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**— Sus movimientos son vivaces: parece que no se alimenta exclusivamente del néctar

de las flores, según se ha dicho, toda vez que se le puede conservar largo tiempo en jaula sin gran dificultad, alimentándole con sopas de leche y granos. Los marineros, que los traen á Europa con frecuencia, nos dicen que abundan en las Indias y que un gran número de los que se embarcan perecen en la travesía.

**CAUTIVIDAD.**— Los pajareros aprecian mucho el lori de las damas á causa de su color: los aficionados que han tenido alguno, dicen que son muy dóciles y fáciles de instruir; que se encariñan pronto con sus amos; que aprenden á hablar, y tienen otras muchas buenas cualidades. Yo he observado á este lori y no he visto semejante cosa: me pareció uno de los loros más tranquilos, calmosos é indiferentes; y ni aun es á propósito para una habitación, porque rara vez soporta largo tiempo de cautividad.

### LOS PERIQUITOS — PSITTENTELES

En el continente austral representan á los loris varios sitacideos, respecto de los cuales no están de acuerdo los ornitólogos, pues unos los consideran como loris, al paso que otros los tienen por loros de larga cola. En efecto, exteriormente se asemejan mucho á estos; pero no hay dos especies más distintas entre sí que los periquitos de lengua de pincel y los otros loros de Australia, por lo que hace á su manera de vivir. Los primeros son arborícolas y se alimentan de sustancias vegetales; los segundos habitan en la parte baja de las breñas y las yerbas, y tienen todos los caracteres de los granívoros.

**CARACTÉRES.**— Los periquitos ofrecen formas esbeltas; tienen el pico pequeño; la cola bastante larga; la lengua termina en pincel: el estómago es pequeño; la piel gruesa y la carne tierna y perfumada.

#### EL PERIQUITO VERSICOLOR — PSITTENTELES VERSICOLOR

**CARACTÉRES.**— Es un pequeño loro de 0<sup>m</sup> 18 de largo (figura 15): su plumaje presenta bastante variación; la parte superior de la cabeza es de un rojo oscuro; en la nuca hay una faja azul celeste intenso; el lomo es verde azulado; las alas verdes; la parte inferior del lomo y las plumas que cubren la cola, de un amarillo verde claro. Á los lados del vientre y en la cara interna de las nalgas se notan unas manchas rojas: todas las plumas de las partes superiores presentan un ribete fino amarillo verde, y las de las inferiores están orilladas de amarillo. Las rémiges primarias son negras, con un feston verde oscuro por fuera, y se hallan como limitadas por una línea estrecha de un verde amarillento. El pico es rojo escarlata; los tarsos de un gris ceniciento claro; la piel que cubre la base del pico y el círculo del ojo, de un blanco verdoso; el iris amarillo rojizo, con un ligero círculo rojo al rededor de la pupila.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**— Habita este periquito en

la costa septentrional de Australia, y particularmente en los alrededores de Puerto-Essington.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**— El viajero Gilbert nos ha dado á conocer las costumbres de este animal. En ciertas épocas se reúnen todos los de un país y forman innumerables bandadas, que caen sobre los gómeros á fin de absorber los jugos. Cuando vuela una bandada, son tan regulares todos los movimientos de los individuos que la componen, que se la podría tomar por una nube si no se percibiesen los penetrantes gritos que lanzan.

En el otoño aparecen muy numerosos en las pequeñas islas de la bahía de Van-Diemen; aliméntanse del néctar de las flores, y solo en algunos casos comen estas últimas. Sensible es que no se puedan conservar cautivos; si fuera fácil alimentarlos convenientemente y remitirlos á Europa, serían, á no dudarlo, muy buscados para las habitaciones.

Goold nos ha facilitado algunos detalles acerca del género de vida de una especie vecina, que es el periquito de Swainson. Los bosques de eucaliptos de la Australia meridional, que se extienden



Fig. 14. — EL LORI DE LAS DAMAS

hasta la bahía de Morton, y los de la isla de Van-Diemen, están poblados de estas aves, á las que ofrecen abundante alimento dichos árboles. También se las vé en otros bosques, y obsérvasse que elijen las plantas cuyas flores acaban de abrirse, porque contienen más néctar y polen. Es un espectáculo indescriptible el ver uno de estos eucaliptos cubierto de flores y visitado por numerosas bandadas de pájaros: con frecuencia se encuentran en ellos tres ó cuatro especies distintas que arrebatan las flores de una misma rama. Imposible es formarse una idea del estrépito que produce su continua gritería, sobre todo cuando una bandada abandona un árbol para ir á visitar otra parte del bosque.

Paseándose cierta mañana por entre los jarales de los alrededores de Hunter, Goold llegó á un enorme eucalipto de cerca de 60 metros de alto, que apenas había comenzado á florecer; miles de periquitos, atraídos por las flores, poblaban el ramaje, y veíanse allí reunidas las más diversas especies: en la misma rama mató Goold las cuatro de periquitos que habitan aquel país.

El vuelo de estos loros es muy rápido, sobre todo en el momento de lanzarse como una flecha por los aires, y producen entonces un grito penetrante. En los árboles trepan con bastante agilidad, pero más bien como los paros que á la manera de los loros.

Á la salida del sol comienzan á buscar su alimento con tal ardor, que no se les puede alejar de los árboles en que se han posado. Un tiro no produce otro efecto que el de levantar una gritería general; lo más que hacen es abandonar la rama donde ha sido muerto uno de sus compañeros, á fin de ir á comer las flores de otra. Son muy diestros para chupar el néctar, y si se les levanta por las patas al caer, se vé como fluir aquel del pico, perfectamente limpio.

Apenas sabemos nada acerca de la reproducción de estos seres: parece que las bandadas no se dispersan durante el período del celo, y que solo anidan algunas parejas en el mismo árbol. El nido suele estar en el hueco de una rama, y contiene en octubre de dos á cuatro huevos, blancos y prolongados.

**USOS Y PRODUCTOS.**— En ciertos puntos de Australia buscan con empeño los indígenas estas aves, á fin de hacer con sus cabezas unos collares que sirven de adorno.

### LOS CORIFILOS — CORYPHILUS

**CARACTÉRES.**— Son lóridos de pequeña talla, pico redondeado por todas partes; cola cónica, aunque en forma de abanico cuando se abre; plumaje cuyo color dominante es el azul, y lengua cubierta de largas papilas, que se encajan sobre un disco en forma de cápsula.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**— Todas las especies son propias de la Océanía.

#### EL CORIFILO DE OTAHITI — CORYPHILUS TAHITIANUS

**CARACTÉRES.**— Este pequeño loro, uno de los más bonitos representantes de la familia de los lóridos, mide 0<sup>m</sup> 17 de largo, y más de 0<sup>m</sup> 07 la cola: el lomo está cubierto de plumas muy finas, formando las de la cabeza una especie de moño. El plumaje es azul púrpura; la garganta y la parte superior del pecho de un blanco brillante, y las alas y la cola de un negro oscuro por debajo.