

jillas y el moño de un tinte escarlata. Todas las plumas, excepto las rémiges primarias y secundarias y las pennas caudales, presentan un feston blanco gris, mas marcado en las plumas del lomo que en las del vientre; el iris es pardo negro, y el pico de color de cuerno claro; los tarsos negros y como salpicados de gris.

La hembra tiene un plumaje mas oscuro que el macho, casi de color pizarra: las plumas del cuello y del lomo están orilladas de un gris pálido; y recorren las demás unas fajas blancas irregulares:

las plumas del vientre son de un amarillo azufre con los bordes de color rojo oscuro.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Gould nos dice que se encuentra el calocéfalo de casco en los bosques del sur de Australia y de algunas islas próximas, en la parte norte de la Tierra de Van-Diemen.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Ignoramos completamente cuál es el género de vida del calocéfalo: únicamente se




Fig. 19. — EL NESTOR DE PICO LARGO

sabe que habita en los árboles mas altos y se alimenta de granos de los gomeros.

CAUTIVIDAD.— La resiste muy bien, y se han visto algunos individuos en Inglaterra; pero no se ha publicado casi observacion alguna acerca de ellos.

LOS LICMETOS—LICMETIS

CARACTÉRES.— Se distingue este género de los que acabamos de examinar por la forma del pico, cuya mandíbula superior es muy prolongada y sobresale mucho de la inferior. En cuanto á los demás caractéres, los licmetos ofrecen notables analogías con los cacatúas, entre los cuales los han descrito muchos naturalistas.

EL LICMETO NÁSICO—LICMETIS NASICUS

CARACTÉRES.— Es la especie mas aproximada á los cacatúas propiamente dichos: tiene un pequeño moño que puede levantar á voluntad: el largo total del cuerpo es de 0^m.40 á 0^m.50; el pico á lo largo de la arista tiene 0^m.05 y medio. El macho y la hembra ostentan idéntico plumaje, que es blanco con visos de amarillo azufre debajo de las alas y en la cara inferior de la cola; las plumas del cuello y de la cabeza, como el plumon, son de un rojo bermellon en la base y blancas en el extremo. Sobre la frente se nota una faja roja que baja hasta la base de la mandíbula inferior, pasando por encima del ojo á guisa de ceja; en la parte superior del pecho hay tambien una faja transversal del mismo color; el iris es pardo oscuro, rodeado de un círculo azul apizarrado; el

pico amarillento claro y los tarsos de un gris ceniciento: á voluntad puede y levanta á menudo todas las plumas de las mejillas.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Opina Gould, y con razon, que existen dos especies de licmetos, una que habita la Australia occidental y la Nueva Gales del sur; y la otra en Puerto Felipe y la Australia meridional.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— El licmeto násico busca siempre la parte mas interior de las tierras, de preferencia á la costa. Forma grandes bandadas; pasa la noche y la hora del medio dia en los árboles mas altos, y anda por el suelo el resto del tiempo. Corre á saltitos, pero bastante despacio: su vuelo es mas rápido que el de los cacatúidos.

Los licmetos se alimentan de granos, y principalmente de bulbos y tubérculos; les gustan, sobre todo, los de las orquídeas, que saben desenterrar perfectamente con su largo pico.

Su manera de reproducirse no ofrece nada de particular: la hembra pone dos huevos blancos, que suele depositar sobre un lecho de madera podrida, en el tronco hueco de un gomero.

CAUTIVIDAD.— El licmeto násico la resiste largo tiempo, segun parece: hoy dia se le vé en Europa mucho mas á menudo que en otro tiempo, si bien no es todavia una especie común en las colecciones. Gould dice que el individuo cautivo se contrista y es mas desagradable y fácil de irritarse que los otros cacatúidos, opinion de que participo igualmente. Hace ya un año que poseemos uno, y aun no reconoce bien á su guardian, pues le amenaza siempre con su pico apenas se acerca; no tolera que le acaricien, y todo le enfurece. Cuando está irritado, endereza en forma de abanico el pequeño moño que cubre su frente, baja y levanta la cabeza, abre el pico y lanza gritos furiosos. En los sonidos que pro-



GRUPO DE CACATÚAS

jillas y el moño de un ante escuro. Todas las plumas, excepto las rémiges primarias y secundarias y las penas caudales, presentan un festón blanco gris, más marcado en las plumas del lomo que en las del vientre; el iris es pardo negro, y el pico de color de cuerno claro; los tarsos negros y como salpicados de gris.

La hembra tiene un plumaje más oscuro que el macho, casi de color pizarra; las plumas del cuello y del lomo están orilladas de un gris pálido; y recorren las demás unas fajas blancas irregulares;

las plumas de las alas y del lomo son de un color rojo oscuro. **DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**— Gould nos dice que se encuentra el cacatúido en los bosques del sur de Australia y de algunas islas próximas, en la parte norte de la Tierra de Van-Diemen.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Ignoramos completamente cuál es el género de vida del cacatúido; únicamente se



Fig. 19. — EL NESTOR DE PICO LARGO

sabe que habita en los árboles mas altos y se alimenta de granos de los gomeros.

CAUTIVIDAD.— La resiste muy bien, y se han visto algunos individuos en Inglaterra; pero no se ha publicado casi observación alguna acerca de ellos.

LOS LICMETOS — LICMETIS

CARACTERES.— Se distingue este género de los que acabamos de examinar por la forma del pico, cuya mandíbula superior es muy prolongada y sobresale mucho de la inferior. En cuanto á los demás caracteres, los licmetos ofrecen notables analogías con los cacatúidos, entre los cuales los han descrito muchos naturalistas.

EL LICMETO NÁSICO — LICMETIS NASICUS

CARACTERES.— Es la especie mas aproximada á los cacatúidos propiamente dichos: tiene un pequeño moño que puede levantar á voluntad; el largo total del cuerpo es de 0^m.40 á 0^m.50; el pico á lo largo de la arista tiene 0^m.05 y medio. El macho y la hembra ostentan idéntico plumaje, que es blanco con visos de amarillo azufre debajo de las alas y en la cara inferior de la cola; las plumas del cuello y de la cabeza, como el plumon, son de un rojo bermellón en la base y blancas en el extremo. Sobre la frente se nota una faja roja que baja hasta la base de la mandíbula inferior, pasando por encima del ojo á guisa de ceja; en la parte superior del pecho hay tambien una faja transversal del mismo color; el iris es pardo oscuro, rodeado de un círculo azul apizarrado; el

pico amarillento claro y los tarsos de un gris ceniciento; á voluntad puede y levanta á menudo todas las plumas de las mejillas.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Opina Gould, y con razon, que existen dos especies de licmetos, una que habita la Australia occidental y la Nueva Gales del sur; y la otra en Puerto Felipe y la Australia meridional.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— El licmeto násico busca siempre la parte mas interior de las tierras, de preferencia á la costa. Forma grandes bandadas; pasa la noche y la hora del medio día en los árboles mas altos, y anda por el suelo el resto del tiempo. Corre á saltitos, pero bastante despacio; su vuelo es más rápido que el de los cacatúidos.

Los licmetos se alimentan de granos, y principalmente de bulbos y tubérculos; les gustan, sobre todo, los de las orquídeas, que saben desenterrar perfectamente con su largo pico.

Su manera de reproducirse no ofrece nada de particular: la hembra pone dos huevos blancos, que suele depositar sobre un lecho de madera podrida, en el tronco hueco de un gomero.

CAUTIVIDAD.— El licmeto násico la resiste largo tiempo, segun parece: hoy día se le vé en Europa mucho mas á menudo que en otro tiempo, si bien no es todavía una especie comun en las colecciones. Gould dice que el individuo cautivo se contrista y es mas desagradable y fácil de irritarse que los otros cacatúidos, opinion de que participo igualmente. Hasta en un año que posemos uno, y aun no reconoce bien á su semejante, pues la semejanza siempre con su pico apenas se acerca, se cubren que le amarian, y todo le enfurece. Cuando está en estado de cólera se abanicó el pequeño moño que cubre su frente, baja y levanta la cabeza, abre el pico y lanza gritos fuertes. En las bandadas que pro-



GRUPO DE CACATÚAS

Fom. III. Page 21