



## EL SENEGALÍ ENANO—LAGONOSTICTA MINIMA

**CARACTÉRES.**—El senegalí enano, rojo ó pequeño senegalí, como le llaman los pajareros, tiene 0<sup>m</sup>09 de largo por 0<sup>m</sup>16 de punta á punta de ala; esta plegada mide unos 0<sup>m</sup>05 y la cola 0<sup>m</sup>04. El plumaje del macho es magnífico: la parte superior de la cabeza, la posterior del cuello, el lomo y las alas son de un pardo oscuro, que pasa al negro hácia la cola; la cara, la parte anterior del cuello, el pecho y la rabadilla, son de un rojo carmin; el vientre pardo claro, ó color de tierra; los lados del pecho y de la rabadilla están cubiertos de pequeños puntos blancos. El pico y las patas son rojos; el iris pardo. La hembra tiene un color gris pardo, con el vientre mas claro que el lomo, y solo la rabadilla es roja, con motas blancas á los lados. Los hijuelos ostentan el plumaje de la madre.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El pequeño senegalí abunda en el valle del Nilo, á partir del 18° de latitud norte, y su residencia se extiende desde la costa oriental á la occidental de África. Hartmann, que recorrió algunos años despues que yo las orillas del Nilo, considera que esta especie sustituye al gorrión doméstico; efectivamente puede considerársela como tal. Existe en todos los pueblos del sur de la Nubia y del Sudan oriental; encuéntrase en las chozas aisladas en medio de los bosques; y es uno de los primeros pájaros de la zona tropical que se ven al dirigirse desde Egipto al Sudan. Hay una especie de nectarinidos y loxias (*hypochera ultramarina*) que remonta mas que él hácia el Norte. Abunda cada vez mas á partir de Dongola, y es muy comun en el Sudan.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Se encuentran á veces cerca de los pueblos innumerables bandadas de estos pájaros, que se reunen con otros á menudo; pero tambien se les vé léjos de toda vivienda humana, en las estepas y las montañas, hasta una altitud de 1,300 á 1,600 metros.

El senegalí enano tiene las costumbres de las otras especies del mismo grupo, y se distingue, no solo por la belleza de su plumaje, sino tambien por su carácter alegre y la gracia de sus movimientos. Mientras brilla el sol no descansa un minuto; solo algunas veces, cuando el calor es fuerte, busca entre el espeso follaje de los verdes árboles un refugio contra los abrasadores rayos del astro del dia. Vuela sin cesar de rama en rama; trepa rápidamente á lo largo de los troncos de los árboles, y corre con agilidad por el suelo. Apenas habrá un individuo en el órden de los pájaros que pueda rivalizar con él en cuanto á lijereza para volar; y seguramente no hay ninguno tan activo. Es además muy sociable, pues vive en buena armonía lo mismo con sus semejantes, que con los demás pájaros.

El pequeño senegalí muda el plumaje á fines de la estacion seca; y á principios de setiembre, es decir, al caer las primeras lluvias, se prepara para la reproduccion. Entonces se dispersan las bandadas para aparearse; macho y hembra penetran osadamente en los pueblos y ciudades, buscando un abrigo que les convenga bajo el tejado de paja de una cabaña ó en la choza de arcilla de un indígena. En un agujero amontonan desordenadamente yerbas secas, y practican en el centro un agujero redondeado irregular; en caso de necesidad anidan los pequeños senegalís en los árboles ó en tierra. En los bosques de las márgenes del Nilo Azul vi yo por el mes de enero una hembra que volaba inquieta alrededor del mismo sitio; sospeché que habria allí algun nido, y efectivamente, encontré en tierra, en medio de unas yerbas secas. Los huevos son blancos, lisos y redondeados, un poco mas gruesos que los del reyezuelo. El senegalí enano pone varias veces al año.

**CAUTIVIDAD.**—Este pájaro cautivo agrada á cuantos le conocen: se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproduccion.

«Estos pajarillos, dice, son pacíficos, confiados y muy cariñosos entre sí; se buscan siempre, y por la noche permanecen juntos. En la época de la reproduccion se aísla cada pareja, y como los machos tienen entre sí frecuentes pependencias, es preciso separarlas. El senegalí se muestra siempre muy afectuoso con su hembra, consagrándose á ella por completo: antes de aparearse se posa á su lado con una hojita de yerba en el pico; da saltitos; levanta una pata y despues la otra, y canta repetidas veces con toda su fuerza.

» Despues de aparearse, construyen su nido macho y hembra, y si esta rehusa las caricias de su compañero, persíguela él y revela mala índole. El nido del pequeño senegalí es casi tan grande como un huevo de avestruz, con una abertura en su centro; la parte exterior se compone de yerbas y de musgo entrelazados, y el interior

está relleno de pelusa y plumas. Cuando la hembra no encuentra estas últimas, las arranca á los pájaros que pasan junto á ella, aunque sea á su propio macho; cuando se le da un nido artificial, es preciso que esté cubierto por la parte superior y tenga una abertura en cualquiera de sus lados. El macho y la hembra cubren alternativamente los huevos por espacio de trece dias: los hijuelos salen á luz revestidos de un plumon pardo; los padres los crían cariñosamente, dándoles granos medio digeridos é insectos, principalmente orugas y larvas. Mientras cubren estos pájaros necesitan mucho calor; tambien anidan en invierno. Si se separa el macho de la hembra, se puede retardar el apareamiento hasta el mes de mayo; pero entonces no tienen mas que dos puestas, una en dicho mes y la otra en setiembre.»

Se ha observado que los pequeños senegalís cautivos mudaban en junio ó julio, lo cual concuerda con lo que decíamos acerca de estos pájaros en su estado libre; una vez que les ha salido la pluma á los pequeños, conservan los mismos colores. Se han conducido muchos senegalís enanos á Cayena con el objeto de aclimatarlos; mas no parece que haya sido feliz el ensayo, pues no se ha vuelto á decir una palabra sobre el particular.

## LOS EMBLEMAS—EMBLEMA

**CARACTÉRES.**—Se diferencian estos pájaros de las otras especies del grupo astrildino, por su pico muy prolongado, cónico, agudo, de base redondeada y casi rectilíneo; por sus alas medianas y obtusas, siendo la primera muy corta y las cuatro siguientes casi iguales y las mas largas; por su cola mediana, algo redondeada lateralmente y por su variado plumaje.

## EL EMBLEMA PINTADO—EMBLEMA PICTA

**CARACTÉRES.**—El emblema pintado, ó *astrilde variado* de algunos autores, representa en Australia á la especie anterior. Tiene la parte superior de la cabeza parda, lo mismo que el vientre, las alas y la cola; la cara de la parte anterior del cuello y la rabadilla de un rojo cochinilla; la mandíbula superior negra; la inferior rojo escarlata, con una mancha negra triangular en su base; las patas de un rojo vivo.

Gould, que descubrió este pájaro, no pudo observar sus costumbres, pues solo consiguió matar un individuo; pero felizmente para la ciencia, sacó un dibujo. A no ser así, únicamente conoceríamos este pájaro de oídas, atendido á que robaron al citado naturalista la piel que conservaba.

## LOS LOXIAS—HYPOCHERA

**CARACTÉRES.**—Estos pájaros de cuerpo recojido y grueso, se distinguen además por su pico corto, cónico, encorvado por la parte superior, y de arista prolongada sobre la frente en ángulo agudo; por sus alas largas que alcanzan á la mitad de la cola, corta y redondeada; y por tener algunas sedas erectiles, que partiendo de las fosas nasales, se extienden hasta el centro del pico. El plumaje varía segun la edad y el sexo.

Este género comprende dos especies, que ofrecen entre sí grandes analogías.

## EL LOXIA ULTRAMARINO—HYPOCHERA ULTRAMARINA

## EL LOXIA BRILLANTE—HYPOCHERA NITENS

**CARACTÉRES.**—En ambas especies tiene el macho plumaje negro durante la estacion seca; pero mientras el de la primera presenta visos azul oscuros, el de la segunda los tiene verdes. Su talla es de 0<sup>m</sup>12; el ala plegada mide 0<sup>m</sup>06 y la cola 0<sup>m</sup>035.

La hembra tiene el lomo pardo claro, con un filete leonado rojizo en cada pluma; el pecho, el vientre y el contorno del ano son blancos; una faja sub-ocular y otra transversal que existe en medio de la cabeza, son rojo leonadas.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El loxia brillante es originario del África occidental; su congénere ultramarino se encuentra



Form. III. Pag. 96. x 97