

EL SENEGAL ENANO

CARACTERES. — El senegal enano es un pájaro de pequeño tamaño, como se llaman los pájaros de este grupo. Su cuerpo es rechoncho, la punta a punta de ala; esta especie es muy común en las montañas de Senegal. El plumaje del macho es magro, el de la hembra es más grueso. La posterior del cuello, el lomo y las alas son de un color pardo que pasa al negro hacia la cola; la parte inferior del pecho, el pecho y la rabadilla, son de un color pardo claro, ó color de tierra; los lados del pecho están cubiertos de pequeños puntos blancos. El iris es pardo; los ojos son pequeños; el vientre más claro que el lomo, y el pico es corto y grueso. Los machos blancos a los lados. Los machos blancos a los lados.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. — Este pájaro abunda en las montañas de Senegal, y su residencia se cree que es la zona montañosa de África. Hartmann, que recorrió las montañas de las orillas del Nilo, considera que esta especie es un híbrido; efectivamente puede considerarse como tal. En todos los pueblos del Senegal y del Sudafrica se encuentra en las chozas de los negros, y es uno de los primeros pájaros de la zona montañosa que se ve desde Egipto al Senegal. Hay una especie de un género de las *Loxia* (*Loxia senegalensis*) que remonta más allá de Senegal. Abunda cada vez más a partir de Dongola.

USOS, COSTUMBRES Y HABITUDES. — Este pájaro vive a veces cerca de los pueblos montañeses, y a veces en los pájaros, que se reúnen con otros a menudo, pero a veces se ve lejos de toda vivienda humana, en las cumbres de las montañas, hasta una altitud de 1,300 a 1,600 metros.

El senegal enano tiene las costumbres de los pájaros del mismo grupo, y se distingue, no solo por su plumaje, sino también por su carácter alegre y la gracia de sus movimientos. Mientras brilla el sol no descansa un minuto, y muchas veces, cuando el calor es fuerte, busca entre el espeso follaje de los árboles un refugio contra los abrasadores rayos del astro del día. Vuela sin cesar de rama en rama; trepa rápidamente por lo largo de los troncos de los árboles, y corre con agilidad por el suelo. A veces se ve a un individuo en el orden de los pájaros que se reúnen para volar; y seguidamente no hay sino un momento de silencio, y vola con un ruido que se oye a lo lejos. Además muy sociable, pues vive en buena armonía con los demás pájaros.

Este pájaro se cría en las montañas de Senegal; y se cría en las montañas de Senegal, y se cría en las montañas de Senegal. Este pájaro se cría en las montañas de Senegal, y se cría en las montañas de Senegal.

CAUTIVIDAD. — Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción. Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción.

Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción. Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción.

Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción. Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción.

Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción. Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción.

Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción. Este pájaro cautivo agrada a cuantos le conocen, se aparea y anida en jaula; Vieillot ha conseguido su reproducción.

LOS EMBLEMAS

CARACTERES. — Se diferencian estos pájaros de las otras especies del grupo agnóstico, por su pico muy prolongado, cónico, agudo, de base redondeada y casi rectilíneo; por sus alas medianas y obtusas, cuando la grácila muy corta y las cuatro siguientes casi iguales y las tres largas, por su cola mediana, algo redondeada lateralmente y por su limitado plumaje.

EL EMBLEMA PINTADO — EMBLEMA PICTA

CARACTERES. — En esta especie predomina el carácter variado de colores, y se diferencia de las otras especies del grupo agnóstico, por su pico muy prolongado, cónico, agudo, de base redondeada y casi rectilíneo; por sus alas medianas y obtusas, cuando la grácila muy corta y las cuatro siguientes casi iguales y las tres largas, por su cola mediana, algo redondeada lateralmente y por su limitado plumaje.

LOS LOXIAS — HYPOCHERA

CARACTERES. — Estos pájaros de cuerpo rechoncho y grueso, se distinguen además por su pico corto, cónico, encorvado por la parte superior, y de arista prolongada sobre la frente en ángulo agudo; por sus alas largas que alcanzan a la mitad de la cola, corta y redondeada; y por tener algunas sedas erectiles, que partiendo de las fosas nasales, se extienden hasta el centro del pico. El plumaje varía según la edad y el sexo.

Este género comprende dos especies, que ofrecen entre sí grandes analogías.

EL LOXIA ULTRAMARINO — HYPOCHERA ULTRAMARINA

EL LOXIA BRILLANTE — HYPOCHERA BRILLANS

CARACTERES. — En esta especie predomina el carácter variado de colores, y se diferencia de las otras especies del grupo agnóstico, por su pico muy prolongado, cónico, agudo, de base redondeada y casi rectilíneo; por sus alas medianas y obtusas, cuando la grácila muy corta y las cuatro siguientes casi iguales y las tres largas, por su cola mediana, algo redondeada lateralmente y por su limitado plumaje.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. — El loxia brillante es originario del África occidental; su congénere ultramarino se encuentra



GRUPO DE AMADINIDOS.

Form. III. pag. 96. x 97

á lo largo del Nilo, lo mismo que el senegalí negro, y se extiende hácia el Sudan oriental.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Esta última especie es comun en Dongola; se la encuentra por todas partes, cerca de las casas y en los campos, como en las estepas mas estériles; busca ante todo la inmediacion de las fuentes, y las estaciones de las caravanas, donde se reúne con otros pájaros, dispuestos como él á devorar todos los restos que dejan hombres y camellos.

Es un pájaro vivaz y alegre, que siempre está en movimiento y que llama desde luego mucho la atencion.

El período del celo está comprendido entre enero y marzo, y coincide con la época de la maduración del *dourah*. El nido se reduce á una masa de yerbas colocada sobre un árbol: nunca he visto los huevos.

Apenas emprenden los pequeños su vuelo, reúnen en bandadas numerosas, mézclanse con los eulectes y caen sobre los campos de *dourah*.

Fácil es comprender que los nubios aborrecen á estos pájaros y tratan de ahuyentarlos: al efecto se valen de los mismos procedimientos que los chinos con los padas, poco mas ó menos; levantan un armazon, de donde parten por todos lados hilos cubiertos de trapos de vivos colores, y agitan aquel aparato cuando llegan los pájaros: conténtanse con asustarlos, pero no los matan nunca.

CAUTIVIDAD.—Ningun indígena del Sudan oriental tiene loxias ultramarinos cautivos; pero en la costa occidental, por el contrario, se cojen muchos loxias brillantes para enviarlos á Europa y América. «Estos dos pájaros, dice Reichenbach, llaman la atencion por su viveza, y hasta podría decirse por su salvajismo: todo el día están en movimiento volando de un lado á otro; persiguen á sus compañeros de cautividad; les molestan con sus continuos gritos, y los maltratan á picotazos y aletazos hasta quitarles la vida. Acometen y hacen huir á otros pájaros mayores que ellos; y cuando se les aísla, conservan la misma viveza, su hermoso plumaje y su dulce voz. En el período del celo se excitan mucho: mientras la hembra se resiste, vuela el macho á su alrededor, le dá repetidos aletazos, se coloca sobre su lomo, vuela de nuevo, se oculta en un rincón, y lanza gritos penetrantes, cual si luchara con otros pájaros.»

Para que se reproduzcan los loxias brillantes es preciso separar las parejas, y tenerlas á una temperatura bastante elevada.

LOS BENGALÍ — MARIPOSA

CARACTÉRES.— Los bengalís tienen formas esbeltas; el pico es vez y media mas largo que alto y ancho, y corta la frente en ángulo; las alas son medianas, con la cuarta rémige mas larga que las otras; la cola es prolongada y cónica; el plumaje espeso y sedoso.

EL BENGALÍ CORDON AZUL — MARIPOSA PHENICOTIS

CARACTÉRES.— Este bengalí, conocido entre los pajareros con el nombre de *cordón azul* y *astrilde mariposa*, tiene la parte superior del cuerpo de color gris de tierra; la cara, el pecho, los costados, y el centro de la cara superior de la cola de un azul verde; el vientre y el contorno del ano gris ceniciento; la cara inferior de la cola gris de humo; la mejillas tienen una mancha de rojo carmin; el pico es de un rojo carmin claro; las patas casi de color de carne.

La hembra carece de mancha roja en las mejillas: estos pájaros miden 0^m 12 de largo por 0^m 17 de ala á ala; 0^m 05 el ala plegada, y otro tanto la cola.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— El bengalí cordón azul habita una gran parte del África: los individuos de esta especie que llegan á Europa proceden de todos los puntos de la costa occidental; encuéntranse en el interior de aquel continente, hasta los países del Nilo, y mas léjos aun por la parte del este.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Segun mis observaciones, no es muy comun este pájaro en parte alguna, ni tampoco forma grandes bandadas, como otras especies de la misma familia; solo se reúne en reducidas tribus. Es ágil y muy activo; su vivacidad, su dulce y agradable canto, cautivan al naturalista que recorre aquellos países.

He hallado con frecuencia el nido de este bengalí durante la estacion de las lluvias, y hasta en tiempo de sequía. En los bosques está situado en los pequeños jarales, y enteramente descubierto, pareciendo mas bien una masa de yerba seca que un nido recientemente hecho: es muy tosco y poco sólido. Los huevos tienen de 0^m 012 á 0^m 014 de largo, completamente blancos: su número varia de cuatro á siete. Heuglin cree que el cordón azul pone algunas veces en el nido de los tejedores, mas no se funda en ninguna observacion personal.

CAUTIVIDAD.— No son raros estos bengalís entre nuestros pajareros: en Hamburgo cuesta un par 3 thalers (11 pesetas 25 céntimos); si se les cuida bien, se conservan varios años y son muy agradables.

«Macho y hembra, dice Reichenbach, se profesan la mayor ternura; aquel canta de continuo al lado de su compañera: ambos toman parte en la construcción del nido y cubren alternativamente.»

El bengalí cordón azul no resiste las temperaturas bajas: es preciso tenerle siempre en sitio abrigado, y cuidar de que en el invierno, que es el período del celo para estos pájaros no se hallen expuestos al frío. Por lo demás no hay dificultad en criarlos, pues les basta el alimento mas comun.

LOS ESTRELDOS — ESTRELDIA

CARACTÉRES.— Los estrellos propiamente dichos se asemejan mucho á los bengalís: tienen como ellos formas esbeltas, cola larga y cónica; pero difieren por la estructura del pico y por el plumaje. El pico de los estrellos es casi tan alto y ancho como largo; su arista se encorva y forma con la frente un ángulo obtuso: el plumaje es sedoso de un matiz delicadísimo, y lijeramente ondulado en las partes superiores.

EL ESTRELDIA GRIS — ESTRELDIA CINEREA

CARACTÉRES.— Esta especie, que vemos á menudo en Europa, tiene el plumaje gris pardo, un poco mas claro en el vientre que en el lomo, y apenas ondulado de negro; la cola es de este color, excepto las barbas externas de las rectrices laterales, que son blancas; rodea el ojo un círculo rojizo; el pico es rojo y las patas grises. Mide el estrello gris 0^m 11 de largo por otro tanto de punta á punta de ala; esta plegada y la cola tienen 0^m 055.

EL ESTRELDIA ONDULADO — ESTRELDIA ONDULATA

CARACTÉRES.— El estrello ondulado tiene el plumaje de color gris de tierra; la garganta manchada de gris blanquizo, y la parte inferior del pecho y los costados con fajas de color rosa. Las barbas externas de las rectrices laterales son de un gris blanquizo, lijeramente orilladas de un tinte mas oscuro. Sus dimensiones no difieren de las de la especie anterior.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Ambos estrellos que ofrecen entre sí la mayor semejanza, habitan todo el centro y el meridiano de África.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— El estrello ondulado se encuentra por todas partes, desde el sur al 16° de latitud norte, sobre todo en las selvas; forma reducidas familias, ó bandadas extraordinariamente numerosas algunas veces, y permanece en los espesos jarales, desde donde salta á tierra para buscar granos. Es uno de los pájaros mas comunes en Natal: durante el invierno aparece en número prodigioso, y visita las plantaciones; pero permanece sobre todo donde el terreno está cubierto de malas yerbas en fruto. Un buen observador asegura que persigue á los térmitas al vuelo, como otros muchos insectívoros. Me parece que estos pájaros no emigran nunca, y que cuando mas viajan en un círculo muy reducido: yo los ví todo el año en el mismo punto.

No he podido encontrar un nido de estrellos: algunos viajeros nos dicen que está situado cerca del suelo, en medio de las altas yerbas; que tiene la forma de un melon y aparece cerrado por arriba, presentando una sola abertura lateral. Parece que se compone de yerbas sumamente finas, enlazadas con rastrojo, y de ramitas que forman el amazon y quedan pendientes como una cabellera. Parece que la hembra pone cuatro ó cinco huevos pequeños y que los padres cubren alternativamente.