

los nidos del mismo canton, y forman con los pájaros de mas edad y de la misma especie numerosas bandadas que recorren el pais. Los emberizas forman entonces sociedad con las alondras, con los pinzones y los zorales (*turdus pilaris*), con los cuales parecen simpatizar mucho; pero en estas reuniones no reina la mas perfecta armonía, y con frecuencia se promueven reñidas luchas.

Cuando el invierno es muy riguroso, el emberiza amarillo tiene que pedir su alimento al hombre, y entonces se le vé llegar á las granjas, donde es recibido comunmente con gusto. En la primavera vuelve cada pareja á su antiguo retiro.

CAZA.—El emberiza no es objeto de una caza especial: para cojerle se emplean trampas ó lazos, y se hace uso de la escopeta, exactamente lo mismo que con todos los pájaros de paso.

CAUTIVIDAD.—No tiene este pájaro nada que pueda gustar




Fig. 58.—EL EMBERIZA AMARILLO

por delante de la mejilla, y un pequeño círculo al rededor del ojo, son de un matiz amarillo de paja; el lomo presenta manchas oscuras; las extremidades de las grandes cobijas superiores del ala, y de las medias, son de color ceniciento rojizo, lo cual produce una doble faja trasversal; las rémiges pardas, orilladas por fuera de blanco rojizo: las rectrices de un pardo oscuro, con los bordes de las dos pennas medias rojizas; en las dos externas hay por dentro una larga mancha blanca en forma de cuña. La hembra tiene mas empañado el color de sus plumas y manchada la garganta. En el otoño el plumaje es igual en ambos sexos: el iris es pardo, y el pico y las patas de color de cuerno rojizo.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Habita el hortelano una gran parte de Europa: se le encuentra todo el año en los países del bajo Elba, en Brandeburgo, Silesia y Lusacia. No es raro en el sur de Noruega y en Suecia, hasta las montañas, como por ejemplo en el Dovrefeld; abunda en el mediodía de Europa, principalmente en el sur de Italia y en la costa oriental de España. Se le vé asimismo en Holanda, Inglaterra, Francia, Rusia y el Asia central hasta el Altai. Escasea en el norte de África; nunca le vi en Egipto.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Las del hortelano apenas difieren de las de los otros embericidos: habita las mismas localidades que el emberiza amarillo y observa el propio género de vida. Tiene un canto mas dulce, agradable y variado: su grito de llamada es *guif, guif*, y el de ternura *gui ó pik*, pronunciado con suavidad y muy bajo; cuando se le excita lanza un grito asaz penetrante y duro.

Su nido se asemeja al del emberiza amarillo: anida cerca del suelo, en el ramaje mas espeso de las breñas, en las cercas y los campos de colza. La hembra pone de cuatro á seis huevos cada vez, cuyo color es rojizo pálido, blanco ó gris rojizo, con puntos y líneas de un tinte negro y gris azulado.

CAUTIVIDAD.—A mi padre le aseguró un aficionado que los hortelanos soportan fácilmente la cautividad y viven en buena inteligencia con los demás pájaros: ignoro si tienen otras cualidades.

USOS Y PRODUCTOS.—Este pájaro goza de cierta nombradía como alimento: los romanos, que apreciaban mucho su carne,

al aficionado; pero como su plumaje es bastante vistoso, se le conserva algunas veces en pajarera.

EL EMBERIZA HORTELANO — EMBERIZA HORTULANA

CARACTÉRES.—El hortelano (fig. 59), que han separado algunos naturalistas genéricamente de los otros emberizas, se conoce mejor que la especie precedente, al menos de nombre; no alcanza tanta talla, pues solo mide 0^m 16; la anchura de las alas es de 0^m 27 á 0^m 29; el ala plegada 0^m 08 y la cola 0^m 07. La hembra es algo mas pequeña que el macho.

El plumaje varia poco en los dos sexos: la cabeza, la nuca y el cuello del macho son de color gris; la garganta, una faja que hay

le conservaban en jaulas, é iluminábanlas por la noche con lámparas para que el hortelano, engañado con aquella luz artificial, comiese tambien entonces y engordara mas pronto. En Italia, en el mediodía de Francia, y sobre todo en las islas de Grecia, existe todavía esta costumbre: allí se cojen dichos pájaros en masa, y cuando han engordado bastante, se matan y despluman, introduciéndolos en agua hirviendo; luego se colocan en barrilitos por partidas de doscientos ó cuatrocientos, con vinagre y especias. Así preparados, se venden á subido precio. En varios puntos de Alemania encargan los propietarios á sus guarda-bosques que cacen estos pájaros: su carne tiene el gusto de la de la chocha, y aun es superior por lo delicada.

EL EMBERIZA LOCO — EMBERIZA CIA

CARACTÉRES.—Es notable el emberiza loco por su bello plumaje, cuyo color dominante es un rojo pardo muy bonito: la cabeza, la garganta y la parte superior del pecho son de un gris ceniciento; rodea las mejillas y la region de las orejas un círculo negro, limitado interior y exteriormente por una faja blanca; en el lomo hay manchas negras, dispuestas en series, y adornan el ala dos fajas de un color claro. El dibujo de la hembra no se marca tanto; la garganta tiene manchas y su tinte es mas pálido. El iris es pardo oscuro; la mandíbula superior de un negro azulado; la inferior azul claro y las patas de color de cuerno. El pájaro mide 0^m 18 de largo por 0^m 26 de ala á ala; esta plegada mide 0^m 075, y la cola otro tanto poco mas ó menos. La hembra es algo mas pequeña que el macho.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El emberiza loco es propio de las regiones meridionales de Europa: en Alemania no se le encuentra sino en las orillas del Rin y en Austria; abunda en España, Italia, Grecia y la Provenza. Su área de dispersion se extiende en una gran parte del Asia; segun Jerdon, se le vé con frecuencia en el oeste del Himalaya.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Como pájaro de montaña, no desciende á la llanura hasta fines de otoño y en el invierno, cuando reinan los grandes frios y las nieves. Tschudi nos

dice que en Suiza habita principalmente las montañas, y que prefiere permanecer en los flancos escarpados cubiertos de rocas y escombros. Vésele allí corriendo entre las piedras y peñascos, sin posarse apenas en los árboles ó jarales; por lo demás, sus movimientos se asemejan en un todo á los de los otros emberizas. Su grito puede traducirse por *tsipp, tsipp, tsipp-tsei*, repetido varias veces; parécese su canto al del emberiza amarillo, con la única diferencia de ser mas breve y puro; Bechstein le expresa bastante bien con el sonido *tsitititsiu*.

Encuétrase el nido de este pájaro en las grietas de las rocas, en los agujeros de los muros, en los matorrales y en las cercas. La hembra pone de tres á cuatro huevos de color gris blanquizo, con rasgos negruzcos y grises, que trazan á veces como una corona al

línea del mismo tinte; las cobijas inferiores del ala son de color castaño y el abdomen de un gris blanquizo. Esta ave es un poco mas pequeña que la anterior (fig. 60).

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave es propia de América y escasea mas que la especie anterior.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Véase lo que dice Wilson acerca de las costumbres del emberiza americano: «Aparece en Pensilvania á mediados de mayo, procedente del sur, y recorre las cercanías de Filadelfia, pareciendo que prefiere los campos sembrados de centeno, donde fabrica en tierra su nido, compuesto de hojarasca fina, y en el cual deposita la hembra de cuatro á cinco huevos cubiertos de manchas y líneas negras. Así como la mayor parte de las aves de su género, no está dotada de facultades vocales: su canto se compone de cinco notas, ó mas bien de dos, la primera repetida dos veces con lentitud y la segunda tres rápidamente, produciendo un sonido que se puede expresar por *chip-chip, che-che-che*. En el mes de agosto dejan de cantar, y en los primeros días de setiembre abandonan el pais.

LOS PASERINOS — PASSERINA

CARACTÉRES.—Los passerinos constituyen un género poco rico en especies: caracterizanse por tener el pico algo prolongado, de arista muy encorvada por encima de las fosas nasales, y que se eleva al nivel del cráneo, cuya protuberancia ó tubérculo palatino es muy pronunciado. Su plumaje es menos rayado que el de los otros emberizas, y muy distinto segun el sexo.

EL PASERINO MELANOCÉFALO Ó DE CABEZA NEGRA — PASSERINA MELANOCEPHALA

CARACTÉRES.—El passerino melanocéfalo, *rey de los hortelanos*, ó *emberiza de capucha*, segun se le llama en algunos países, tiene de 0^m 19 á 0^m 205 de largo, y de 0^m 30 á 0^m 31 de punta á punta de ala; esta plegada mide 0^m 10 y la cola 0^m 08. La cabeza del macho es negra, el lomo color de orin, la cara inferior del cuerpo de un bonito amarillo dorado, y la cola y las alas de un pardo oscuro.

La cabeza de la hembra no es negra; tiene una faja de color gris pardo que se corre del pico al ojo; la cara superior del cuerpo es gris rojiza, y oscuro el tallo de cada pluma con las barbas mas claras; la inferior de un amarillo pálido, y la garganta blanquiza. Las rémiges, las cobijas superiores del ala y las rectrices son de un pardo oscuro, orilladas de blanco pardusco ó de pardo claro; el pico azulado pálido, y de color de cuerno en invierno, y las patas de un tinte de carne oscuro.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Este pájaro habita el sudeste de Europa, Grecia, Dalmacia, las islas del Adriático y una gran parte del sudoeste de Asia. Cuéntase tambien entre los pájaros de Alemania, pues se ha visto muchas veces cerca de Trieste, y aun mas léjos por el interior; pero escasea mucho. Dicese que se han matado algunos individuos en los alrededores de Leipzig.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Los passerinos llegan á Grecia á fines de abril y se marchan en agosto. Jerdon nos ha dado á conocer la direccion que siguen: en el mes de noviembre se dejan ver en el Dekkhan y las provincias del norte del Indostan; allí forman bandadas innumerables, que ocasionan grandes destrozos en las plantaciones, y desaparecen en marzo. En una mañana de primavera se ven todas las cercas inmediatas al mar cubiertas de estos pájaros, cuando hubiera sido imposible encontrar uno solo el dia antes.

El género de vida de este pájaro difiere muy poco del de los otros embericidos: el conde Von der Muhle dice que es estúpido y confiado, y que con frecuencia se puede matar de un bastonazo al macho cuando canta.

En la época del celo se retiran á las colinas incultas cubiertas de salvias y de azufaios, á los viñedos y á los jardines poco frecuentados. El macho se posa en la rama mas alta de un árbol ó de un jaral, y deja oír continuamente su canto sencillo, un poco afilado, mientras que la hembra se oculta todo lo posible. El nido, formado en tierra, ó en un espinoso matorral, no suele estar á la vista; su construccion es muy tosca; algunos tallos y hojas, entrelazadas sin órden, forman la pared exterior, y por dentro está relleno de pe-



Fig. 59.—EL EMBERIZA HORTELANO

rededor del huevo, principalmente hácia el extremo mas grueso. Este dibujo no está formado por líneas cortas interrumpidas, sino continuadas, y por tal carácter se diferencian los huevos de este pájaro de los del emberiza amarillo. Es probable que la hembra ponga dos veces al año, aunque á decir verdad, yo no he visto en España pequeños antes del mes de julio, debiendo advertir que la muda se verificaba hácia mediados de agosto. Á las márgenes del Rin llega el emberiza loco á principios de abril, y se va en noviembre: en España vi con frecuencia bandadas considerables en todas las vertientes de Sierra-Nevada cuando las bañaba el sol.

CAUTIVIDAD.—Por la belleza de su plumaje es muy á propósito este pájaro para una habitacion: Bechstein, que conservó una pareja durante siete años, elogia mucho sus cualidades: el macho y la hembra eran muy afectuosos entre sí; gustábales la sociedad de sus semejantes, y vivian en paz con todos los demás pájaros.

EL EMBERIZA AMERICANO — EMBERIZA AMERICANUS

CARACTÉRES.—Tiene la parte superior de la cabeza de color verdoso amarillento; el cuello de un gris oscuro y el lomo rojizo, manchado de blanco, extendiéndose este color á las alas y la cola, pero sin las manchas; la barba es blanca, y en la garganta hay otra mancha en forma de corazon, de color negro intenso y orillada de blanco; el pecho es amarillo y sobre los ojos hay una