

el cuello; el resto de la cabeza, de un púrpura claro, de aspecto aterciopelado; la parte inferior del lomo, las alas y la cola, de un pardo de orin; la parte interna de las pennas de las alas, negra; y la cara inferior del cuerpo de un blanco agrisado ó pardo amarillento súcio, con pequeñas listas transversales de un tinte negro. Los hijuelos tienen un plumaje idéntico al de la hembra: á medida que avanzan en edad adquiere su cuello un tinte gris; despues de la primera muda el vientre es amarillo, y aparecen los penachos de plumas laterales. Las doce pennas recortadas se dirijen aun directamente hácia atrás; solo despues de la tercera muda se inclinan hácia fuera.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El seleucido brillante es propio de la Nueva Guinea.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—«Todos los años, dice Rosenberg, se llevan á Mangkassar y Ternate muchas pieles mutiladas de estas aves; pero ninguna coleccion posee un solo ejemplar intacto; y por lo mismo son incompletas cuantas descripciones se han hecho. Durante mi residencia en Salawati, en 1860, tuve la suerte de obtener seis individuos en buen estado.

» Los seleucidos se reunen en reducidas bandadas ó por familias. Vuelan bien: mientras buscan su alimento lanzan á menudo un grito sonoro que marcan claramente las sílabas *scheck, scheck*; se les encuentra únicamente en Salawati, en cuyas partes no son raros. Cerca de Kalwal, pequeño pueblo de la costa occidental, vi en el mes de agosto una familia compuesta de diez individuos; hallábanse en un bosque de altos árboles en las inmediaciones del mar. Cojé seis, y á los dos dias desaparecieron los demás del país; la caza que yo les di y un fuerte viento que comenzó á reinar, les obligó á buscar un refugio en las montañas: en su estómago encontré frutos mezclados con algunos restos de insectos.

» En el periodo del celo ensancha el ave su collar y extiende sus largas plumas laterales, que forman un espléndido abanico.»

LOS EPÍMACOS — EPIMACHUS

CARACTÉRES.—Los epímacos tienen el pico muy arqueado, las mandíbulas casi iguales con una pequeña escotadura en su extremidad; las alas son medianas; la cola muy larga y escalonada; los tarsos cortos, aunque robustos; los dedos provistos de poderosas uñas, algo encorvadas; por último, las plumas de los costados son largas, enteras y anchas; las de la rabadilla llevan barbas muy finas.

EL GRAN EPÍMACO Ó EPÍMACO MAGNÍFICO —EPIMACHUS MAGNUS

CARACTÉRES.—El epímaco magnífico ó gran epímaco (figura 83) tiene 1^m10 de largo, con corta diferencia, incluso mas de 0^m66 que corresponden á la cola: el cuerpo no es mayor que el de un pichon. La cabeza está cubierta de pequeñas plumas redondeadas, escamosas y de un verde bronceado con visos azules y verde dorados; en la parte posterior del cuello lleva unas plumas largas, muy divididas y negras; las del lomo son tambien de este color, pero mezcladas con otras diseminadas, en forma de espátula, con espesas barbas y visos verde azulados. El vientre es de un tinte violeta oscuro: las largas plumas de los lados del pecho son muy brillantes; el ave las recoge sobre sus alas; el pico y las patas son de color negro.

La hembra se diferencia del macho por tener los colores mas opacos, y la parte superior de la cabeza y la nuca de un tinte canela.

En ninguna coleccion europea existe un ejemplar completo de este magnífico pájaro: los papúes preparan la piel como la de los paradíseos y la venden; pero tan deteriorada, por lo regular, que es preciso poner otras alas.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Segun Rosenberg, el epímaco magnífico parece habitar toda la Nueva Guinea.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Nada se sabe acerca de este punto.

LOS ASTRAPIAS — ASTRAPIA

CARACTÉRES.—Schlegel clasifica entre los paradíseos dos especies poco conocidas aun, del género astrapias, que otros naturalistas agrupan con los tordos. Aseméjanse á estos, efectivamente,

por su pico, que es de un largo regular, recto, lijeramente escotado en la punta, la cual se encorva un poco, y cuya base no está rodeada de sedas, ni de plumas de aspecto aterciopelado. La cola es muy larga y truncada; las alas de mediana extension, y las patas vigo-



Fig. 84.— EL ASTRAPIA DE GARGANTA DE ORO

rosas. Á los dos lados de la cabeza tienen un mechón de plumas que se dirijen hácia fuera.

EL ASTRAPIA DE GARGANTA DE ORO—ASTRAPIA GULARIS

CARACTÉRES.—Lesson y otros naturalistas tienen por cosa imposible de describir la magnificencia del plumaje de esta ave (fig. 84); y no sin razon le aplicó Le Vaillant el nombre de *incomparable*, designándola otros con el de *picares del paraíso*. El lomo es negro púrpura con visos metálicos brillantes; las plumas de la parte superior de la cabeza de un rojo jacinto, y amarillo de oro



GRUPO DE PARADÍSIDOS

y esmeralda en la punta; el vientre y el pecho de un hermoso verde malaquita. Del ángulo externo del ojo arranca una faja roja jacinto, que se prolonga en semi-círculo hasta debajo de la garganta: el pico y las patas son de color negro. Esta ave tiene unos 0^m80 de largo: según la manera de reflejarse la luz, adquiere su plumaje los matices mas brillantes y admirables que imaginarse pueda.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Segun Rosenberg, pa-

rece que esta ave habita exclusivamente la isla de Obi, á la entrada de la bahía de Gilwik.

3.º LOS CORACOS—*Coraces*

Esta tercera division ó sub-orden comprende aves cuyas fosas nasales, salvas raras excepciones, están ocultas por plumas piliformes que se extienden desde la frente al pico.

Se compone de varias familias que vamos á examinar ahora.

LOS CÓRVIDOS — CORVI

CARACTÉRES.—La familia de los córvidos comprende los mayores coraciostros: las aves que la representan tienen el pico grande y fuerte, con bordes cortantes y dentados; la mandíbula superior excepcionalmente ganchuda en la punta; las alas son redondeadas, de mediana extension, con la cuarta rémige mas larga por lo regular; la cola compuesta de doce pennas, está truncada en ángulo recto ó cónico; las plumas son grandes y numerosas, por lo general muy brillantes; y las que envuelven la base del pico adquieren á menudo el aspecto de sedas. Los colores del plumaje varían muy poco con la edad y nunca por el sexo.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Los córvidos habitan todas las partes de la tierra, en todas las latitudes y alturas: ricamente representados en la zona tropical, abundan tambien en la templada; pero su número no domina realmente, sino en las regiones glaciales.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—La mayor parte de estas aves son sedentarias, pues permanecen todo el año en el mismo punto ó se limitan á recorrer espacios bastante reducidos. Hay no obstante algunas que emigran, aunque no muy léjos; abandonan nuestros países para dirigirse al mediodía de Europa ó al norte de África; y otras se alejan de las montañas á la llegada del invierno para bajar á los valles. Excepto el canto, los córvidos reúnen todas las cualidades que hemos reconocido en las demás familias de este orden: andan bien; vuelan con facilidad durante mucho tiempo y con bastante rapidez; sus sentidos están igualmente desarrollados, poco mas ó menos; su olfato es muy sutil; y por lo que hace á la inteligencia no les aventaja ninguna otra especie, pues algunos llegan á igualar á los loros. Gracias á sus facultades intelectuales viven sin apuro y saben aprovechar todo lo que encuentran: las mayores especies podrían figurar hasta con las aves de rapiña. En una palabra, todo cuanto he dicho antes acerca de los coraciostros, en general, es aplicable á los córvidos, y como no creo necesario insistir nuevamente, entraré desde luego en la descripción de las especies mas notables.

Basta una simple ojeada para ver que esta familia se divide en varios géneros, enlazados entre sí por especies transitorias.

LOS CORACIAS — FREGILUS

CARACTÉRES.—Los coracias, ó *cuervos de montaña*, son córvidos de formas esbeltas, largas alas, cola corta, pico endeble, puntiagudo, y ligeramente encorvado, de color vivo lo mismo que las patas; el plumaje es negro y brillante.

Este género forma con algunos otros un primer grupo del cual solo dos especies son europeas; las otras habitan en las Indias y la Nueva Holanda.

EL CORACIA COMUN—FREGILUS GRACULUS

CARACTÉRES.—Se caracteriza por su pico prolongado, delgado y corvo, de un magnífico rojo de coral, como las patas; el ojo es pardo oscuro, y el plumaje de un azul negro brillante. Esta ave mide 0^m41 de largo por 0^m85 de punta á punta de alas; el ala plegada 0^m29 y la cola 0^m15 (fig. 85).

La hembra casi es del mismo tamaño que el macho: los pequeños tienen el plumaje menos brillante, y el pico y las patas negruzcos. Algunos meses despues de haber comenzado á volar, se verifica la primera muda y se parecen del todo á los padres.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave habita toda la cordillera de los Alpes, los Carpatos, los Balkanes, los Pirineos, casi todas las montañas de España, una parte de las de Escocia y todas las del Asia, desde el Ural y el Cáucaso hasta la China. En el Himalaya le reemplaza una especie semejante. Es rara en los Alpes suizos, y muy comun, por el contrario, en varios puntos de España.



Fig. 85.—EL CORACIA COMUN

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—El coracia vulgar establece su morada en altitudes diversas, según los países donde se halla. En los Alpes suizos solo habita en las altas regiones, inmediatamente debajo de la zona de las nieves, y sube hasta las cimas mas elevadas: en España se la encuentra ya sobre paredes de roca á 200 ó 300 metros sobre el nivel del mar. En los Alpes Réticos anida á veces en los campanarios de los últimos pueblos que se encuentran en las montañas. Según Tschudi, estas aves abandonan en octubre el valle para volver en abril, y emigran hácia el sur. «Todos los años se presentan en bandadas de cuarenta á sesenta individuos en el hospicio de San Bernardo, donde las llaman *cornejas imperiales*: solo se detienen allí tres dias.»

En España, y acaso en todos los países del sur, el coracia vulgar es un ave sedentaria; sus viajes se reducen á dejar las alturas en invierno para bajar al valle. Según mis propias observaciones, este