

» Los pájaros que se escapan de la garra del ave de rapiña y de los agudos dientes de la marta y de la comadreja, son víctimas del grajo: donde él se presenta quedan destruidas las polladas; y no se me tache de exajerado, porque tengo las pruebas de lo que digo. Hace varios años, y durante la época del celo, llegaba casi todas las mañanas un grajo á mi jardín, registraba las arboledas y matorrales y destruía los nidos. Una pareja de pinzones y algunas curruacas, que hacia mucho tiempo habian fijado su domicilio, los primeros en un árbol y las segundas en un grosellerò, no pudieron sacar nunca sus crias, y acabaron por alejarse; el grajo persiguió entonces á varios culirojos, los arrebató uno despues de otro, y desaparecieron todos al poco tiempo; otro dia sorprendió el ave en la grieta de un muro á un gorrioncillo casi del todo desarrollado, y se lo comió tranquilamente á la vista de sus padres, que lanzaban gritos desgarradores y hacian ademán de acometer á su enemigo.

» El guarda-bosque que se proponga conservar los pajarillos que exterminan las orugas y los parásitos, los cuales no podria aniquilar él solo, debe vigilar activamente para preservar á unos seres tan útiles de los ataques del grajo.»

Á mí me gusta ver á una de estas aves en el bosque; pero no puedo menos de participar de la opinion de Trinthammer; y añadiré, que por muchos servicios que pudiera prestar el grajo glandívor, el busardo es mucho mas útil y no causa tanto destrozo entre los pajarillos.

El período del celo comienza para el grajo á la entrada de la primavera: en el mes de marzo construye su nido y la hembra pone á principios de abril. Rara vez se vé aquel á gran elevacion del suelo; está situado sobre un árbol mas ó menos alto, unas veces cerca del tronco, y otras en el extremo de una rama horizontal; no tiene grandes dimensiones: se compone por fuera de ramas delgadas y secas, que sirven de apoyo á una porcion de hojarasca; y el interior está cubierto de raíces finas. Contiene de cinco á siete huevos de color blanco amarillento sucio, ó de un blanco verdoso, con puntos de un gris pardo, dispuestos comunmente en círculo hácia el extremo grueso. La incubacion dura diez y seis dias: los padres alimentan primero á su progénie con orugas, larvas de insectos y gusanos, y mas tarde con pajarillos. En los puntos donde no se persigue al grajo, solo anida una vez al año.

El milano y el gavilán son los mas terribles enemigos del grajo: el primero le domina fácilmente; el segundo no se apodera de él sino despues de una encarnizada lucha. Yo he cojido á menudo grajos y gavilanes que se habian herido con el pico y las uñas cayendo á tierra agarrados. Cuando se aventura esta ave por el llano, es presa muchas veces del halcón; por la noche se halla expuesta á las acometidas del mochuelo, y acaso del alucon (*syrnium aluco*); la marta destroza tambien su nido: pero parece que el grajo comun no tiene mas enemigos.

Con el hombre se muestra esta ave muy desconfiada, sobre todo cuando ha sido perseguida: perjudica al cazador, avisando á las otras aves su presencia, y molesta á los mamíferos carnívoros cuando buscan su presa, acometiéndoles y persiguiéndoles con sus gritos. Solo por casualidad se atrapa vivo á un grajo, cuando se posa sobre alguna trampa: la mayor parte de los que se hallan en cautividad se cojieron en el nido.

**CAUTIVIDAD.**—Los individuos no son agradables para el hombre cuando están cautivos; no se domestican ni se acostumbran tampoco á su nuevo régimen; pero los jóvenes, por el contrario, pueden servir de recreo, sobre todo por el desarrollo de su facultad de imitar. Aprenden á repetir algunas palabras y á silbar varios aires. Inútil parece decir que no se debe ponerles con otras aves, porque sobrepujan por su ferocidad al cianocite.

### LOS PERISOREOS—PERISOREUS

**CARACTÉRES.**—Este género se distingue de los grajos propiamente dichos por tener el pico mas endeble, cónico y ancho en la base; por sus alas mas cortas, y sobre todo por su cola, que es muy redondeada: el plumaje es oscuro.

#### EL PERISOREO FUNESTO—PERISOREUS INFAUSTUS

**CARACTÉRES.**—Esta ave, conocida tambien con el nombre de *grajo imitador* ó *trepador de los líquenes* (*lavskrike*), como le llaman los noruegos, mide 0<sup>m</sup>33 de largo por 0<sup>m</sup>50 de punta á punta

de ala; esta plegada y la cola 0<sup>m</sup>14. Los adultos tienen el plumaje de color gris de orin claro, con las barbas externas de las rémiges grises, lo mismo que las dos rectrices medias; las pequeñas cobijas superiores del ala y todas las rectrices laterales son de un rojo de orin, y la parte superior de la cabeza negra; el pico y las patas de este último tinte y el iris gris pardo. Los pequeños tienen un color mas opaco, y cruzado el vientre por fajas longitudinales poco pronunciadas.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta ave habita los bosques del norte; es muy comun en ciertos puntos de Rusia y de Siberia, y se extravía algunas veces por Alemania. En el norte de Escandinavia no la he visto mas que una vez, durante los cinco meses que estuve en Noruega y Laponia. Sin embargo, no es rara en aquel país, pero los sombríos bosques de coníferas donde vive la ocultan á la vista, y si no la descubren sus penetrantes gritos, se pasa muy cerca de ella sin divisarla.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Por este concepto ofrece muchas analogías con el grajo comun: es menos cautelosa y activa que aquel; y fiada sin duda en el color oscuro de su plumaje y en los espesos bosques de pinos, permite que se acerquen sin moverse; pero muéstrase muy recelosa en los bosques de abedules. Nilson dice que es muy confiada, y que su curiosidad llega hasta el punto de posarse sobre la cabeza de cualquier leñador; particularidad de que no tienen conocimiento otros observadores. Sin embargo, dícese que una especie americana, el *perisoreus canadensis*, se distingue por la misma costumbre; segun Schrader, esta ave se halla muy familiarizada con los lapones; acompaña á los rebaños de renos, y aprende muy pronto á distinguir entre los pastores inofensivos y las personas que pudieran ser temibles.

Su vuelo es vacilante é irregular; en tierra se mueve como el grajo; pero es mucho mas diestra que él en los árboles.

La voz del imitador produce las sílabas *sroui, sroui*: se ha dicho algunas veces que se asemejaba al de un hombre que pide auxilio: segun Schrader, además de sus gritos roncacos, que tienen algo del maullido del gato, produce el ave una especie de canto muy breve.

Aliméntase de granos, particularmente de semillas de coníferas, y sobre todo de las del *Pinus cembra*, de bellotas, fabucos é insectos de toda especie. Trepa por el ramaje como el paro; abre los frutos cónicos lo mismo que el pico cruzado, y reúne provisiones para el invierno; pero con harta frecuencia se las roban las ardillas, los ratones, las picazas y los paros. No desprecia las bayas y los frutos, y los pequeños vertebrados se hallan tan expuestos á sus ataques, como nuestros pajarillos á los del grajo comun.

Nordvy me ha dicho que en el Barangerfjord construye esta ave su nido en marzo y pone en los primeros días de abril, á mas tardar: el nido que me dió era grande; estaba formado exteriormente de ramas, yerbas, musgo y líquenes, y relleno de una espesa capa de pelos y plumas de ortega. Los huevos, cuyo número varia entre cinco y siete, son de un blanco amarillento, y están sembrados irregularmente de manchas de un gris verdoso ó verde aceituna. Los padres manifiestan á su progénie el mas vivo cariño y están en el nido silenciosos para no descubrir su presencia; cuando se les persigue tratan de alejar al enemigo con toda clase de ardides. Saltan por el suelo como si no tuviesen movimiento alguno sus alas; alejan así al cazador; le atraen luego; remóntanse de pronto, y recorriendo un largo espacio vuelven al lado de sus hijuelos.

**CAZA.**—Todos los observadores de comun acuerdo aseguran ser muy fácil apoderarse de esta ave: la mayor dificultad consiste en hallarla; pero apenas se ha matado una, se puede tener la seguridad de cojer á sus compañeras, pues nunca se abandonan en caso de peligro.

No es menos fácil atraparlas con lazos: el capitán Blakiston describe un procedimiento particular empleado por los americanos para apoderarse del perisoreo del Canadá. «Esta ave, dice, es la compañera acostumbrada del viajero en los países de las pieles: se la vé lo mismo en verano que en invierno, y se presenta en los campos en busca de algun alimento. Para cojerla se echa un hombre en tierra; cúbrese la cabeza y la espalda con una prenda de vestir; extiende las manos, teniendo en ellas un pedazo de carne y permanece inmóvil. No tarda en presentarse el ave; acércase, salta sobre la mano; y en el momento de ir á picar, bástale al hombre cerrar aquella para sujetar su presa.» No salgo garante de la veracidad del hecho; pero de todos modos, revela que el ave es poco tímida.

**CAUTIVIDAD.**—No tenemos muchos datos acerca de la vida del perisoreo funesto en cautividad; solo sabemos que se resigna fácilmente con su suerte, si bien conserva su malignidad y es muy inclinado á dar picotazos.

#### 2.º LOS GLAUCOPEs—*Glaucoptes*

**CARACTÉRES.**—Los glaucopes, llamados vulgarmente *cornijas de larga cola*, tienen el pico de un largo regular, fuerte, ancho en la base, comprimido por delante, con la mandíbula superior en forma de cuchillo algunas veces, cubierta en su base de pelos cortos y aterciopelados, y de arista muy convexa, con punta encorvada en gancho. Las alas son cortas, con la quinta penna mas larga; la cola prolongada y escalonada; las patas fuertes; los tarsos mas largos que el dedo medio, y el plumaje brillante.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Los glaucopes habitan los bosques y observan en un todo el mismo régimen de vida que los grajos.

### LOS DENDROCITES—DENDROCITTA

**CARACTÉRES.**—Las picazas están representadas en las Indias por los dendrocites, aves de aventajada talla, pico corto, comprimido y muy corvo; las alas son cortas y sumamente redondeadas, con la quinta ó sexta penna mas larga; la cola, prolongada y cónica, tiene las dos rectrices medias muy salientes; las patas son cortas ó medianas.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Los dendrocites son propios de las Indias; solo se encuentran una ó dos especies en otros países.

#### EL DENDROCITE VAGABUNDO—DENDROCITTA VAGABUNDA

**CARACTÉRES.**—De las cinco especies descritas por Jerdon en su obra sobre las aves de la India, solo haremos mencion del *cofri*, como le llaman los naturales del Indostan, el *vagabundo* ó la *picaza vagabunda* de los ingleses (fig. 102). Es un ave de 0<sup>m</sup>44 de largo, de los cuales corresponden 0<sup>m</sup>27 á la cola; el ala plegada mide 0<sup>m</sup>17. La cabeza, la nuca y el pecho son de un pardo de orin ó pardo negruzco, y el tinte de la primera algo mas oscuro que el de las otras partes del cuerpo; la espaldilla, el lomo y las cobijas superiores de la cola son de un color rojizo oscuro. Las rectrices superiores del ala y las barbas externas de las rémiges secundarias, de un gris claro, casi blanco; las otras pennas de las alas, negras; la cola de un gris ceniciento, con la extremidad de las rectrices negra; la cara inferior del cuerpo rojiza ó de un leonado amarillento; el pico negro; las patas de un gris apizarrado y el ojo de un tinte rojizo de sangre.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta ave se halla diseminada por toda la India; tambien existe en el país de Assam y en China; y segun Adams, en Cachemira.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—El dendrocite es muy comun en todas partes, sobre todo en las llanuras cubiertas de bosque: en el norte de la India se le encuentra en cada arboleda y jardín, y hasta cerca de las casas.

Rara vez está solo: lo mas comun es verle apareado ó en reducidas familias. Vuela de uno á otro árbol, trazando una línea ondulada, recorriendo de este modo durante el dia un territorio bastante extenso; pero no tiene residencia fija, propiamente hablando.

El dendrocite vagabundo encuentra en los árboles todo cuanto necesita: en ciertas estaciones se alimenta exclusivamente de frutos, y en otras de los insectos que viven sobre el ramaje. Los indígenas aseguran que roba los nidos y devora los pajarillos: Smith vió á una de estas aves volar cerca de una casa, comerse algunas plantas, llegar luego hasta cerca de una jaula donde habia pajarillos; y sacándolos uno á uno por entre los hierros devorarlos todos: Buckland cree que una especie afine dá caza á los murciélagos.

### LOS TEMIAS—CRYSIRHINA

**CARACTÉRES.**—El principal carácter de los temias reside en la cola, que es muy larga y solo consta de diez pennas muy desiguales, tanto mas cortas cuanto son mas externas. El pico es fuer-

te, bastante largo, y con mandíbula superior arqueada; las patas de un largo regular y relativamente endebles, y las uñas vigorosas; las plumas largas y finas, con barbas sedosas al tacto.

#### EL TEMIA VARIABLE—CRYSIRHINA VARIANS

**CARACTÉRES.**—El temia variable ó *benteot*, segun le llaman los japoneses, tiene la talla del tordo, con corta diferencia; pero parece mayor por su larga cola. El plumaje es negro, con visos verdes ó purpúreos, segun la manera de reflejarse la luz; la frente, la línea que vá del pico al ojo y la garganta, son de un negro opaco, casi satinado; las pennas de las alas negruzcas; las cuatro rectrices medias verdosas, lo mismo que las barbas externas de las demás; las internas son de un negro mate; el pico y las patas de color negro (fig. 103).




Fig. 103.—EL TEMIA VARIABLE

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El temia variable habita el Asia meridional y el país de los malayos.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Horsfield nos dice que esta ave es bastante comun en Java; que se oculta mucho y no se la vé si no se la busca. Aléjase de la vecindad de las casas; no se aventura sin mucha precaucion por los lugares descubiertos, y á la menor señal de peligro desaparece en la espesura. Su vuelo es torpe é incierto y su marcha vacilante.

Aliméntase principalmente de insectos, y es probable que robe los nidos de otras aves, segun parecen indicarlo sus vigorosas uñas: tambien come frutos.

Ignórase cuáles son sus costumbres en cautividad.

### LOS TEMNUROS—TEMNURUS

**CARACTÉRES.**—Los temnuros constituyen un género muy semejante al de los temias, de los cuales no se diferencian mas que por su pico de bordes entrantes y voluminosos, y sobre todo por tener una cola mas corta, cuyas rectrices aparecen truncadas en el extremo.

El tipo de este pequeño género es el siguiente:

**EL TEMNURO DE COLA TRUNCADA — TEMNURUS TRUNCATUS**

**CARACTÉRES.**—Esta ave tiene el plumaje completamente negro; su largo total es de 0<sup>m</sup>.38.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Habita la Cochinchina; no se sabe nada acerca de sus usos y costumbres.

3.º LOS CISEOS—*Cissa*

En el sur y el este de Asia existen varias aves magníficas, que han sido clasificadas por ciertos naturalistas entre los coraciostros, mientras que algunos las presentan como tordos ó coracias; pero



Fig. 104. — EL KITO DE LA CHINA

**EL KITO DE LA CHINA — UROCISSA SINENSIS**

**CARACTÉRES.**—El kito de China, ó de larga cola (fig. 104), tiene 0<sup>m</sup>.72 de largo total, de los cuales corresponden por lo menos 0<sup>m</sup>.47 ó 0<sup>m</sup>.49 á la cola; el ala plegada mide 0<sup>m</sup>.22. El plumaje es magnífico: la cabeza, el cuello y el pecho son de un negro oscuro, excepto una faja longitudinal blanca, que baja de la cabeza á lo largo de la nuca y adquiere poco á poco un tinte azul. El lomo y las cobijas superiores de la cola son de un azul claro, con la punta negra estas últimas; las alas de un azul vivo, con la extremidad de las rectrices de un blanco puro; la cola azul en sus dos terceras partes á partir de la base, luego cruzada de negro en una gran estension, y por último blanca en el extremo; las dos rectrices laterales son tan solo blancas y negras; la cara inferior del cuerpo blanquiza con visos rojizos.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta ave habita la parte occidental del Himalaya; en el este la reemplaza una especie afine. Segun Swinhoe, es muy comun en China, sobre todo en los bosques de los alrededores de Hongkong. En la India vive en las montañas hasta una altitud de 2,000 metros sobre el nivel del mar: encuéntrese en los matorrales; pero permanece mas en tierra.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Es un ave cautelosa y vigilante, que advierte á las otras el cercano peligro, perjudicando así á los carnívoros cuando cazan. Dícese que sigue al leopardo en un espacio de varias leguas y le hace perder mas de una presa. Segun Swinhoe, aseméjase su vuelo al de la picaza vulgar: el ave sigue la línea recta y agita continuamente las alas; en tierra lleva la cola horizontal y cuando se posa en una rama la tiene levantada, moviéndola frecuentemente. Su grito de llamada ó de alarma puede traducirse por *pink, pink, pink*; vá seguido de una especie de cacareo bastante penetrante; cuando le produce, todos los indivi-

se asemejan de tal modo á los grajos por su aspecto, y sobre todo por sus costumbres, que nos creemos autorizados á colocarlas á continuacion de ellos.

**LOS KITOS — UROCISSA**

**CARACTÉRES.**—Se distinguen estas aves por sus graciosas formas y vivos colores: tienen el pico tan largo como la cabeza, fuerte, grueso, encorvado desde la raiz y recto en la punta; los tarsos son altos; los dedos vigorosos, provistos de uñas robustas; las alas redondeadas, con la cuarta y quinta pennas mas largas; la cola corta y redondeada ó muy larga; las dos pennas medias sobresalen mucho de las laterales.

duos de la bandada se remontan, vuelan de un árbol á otro, y se mantienen separados hasta que una nueva señal les anuncia que pueden reunirse.

Esta ave anida en los árboles á mayor ó menor altura del suelo: su nido, bastante tosco, se compone de ramas secas por fuera y de raíces por dentro: los huevos, en número de tres á cinco, son de un gris verdoso opaco, con manchas pardas y compactas, dispuestas en forma de corona en el extremo grueso.

**CAUTIVIDAD.**—En las Indias se ven con frecuencia individuos cautivos, que se conservan fácilmente. Aliméntanse de carne cruda, pajarillos é insectos, etc.; no son muy delicados por lo que hace al régimen. Varias veces se han llevado algunas de estas aves vivas á Inglaterra.

**LOS CISAS — CISSA**

**CARACTÉRES.**—Tienen el pico fuerte, de regular extension, arista ligeramente convexa, y comprimido lateralmente; las patas son medianas, pero gruesas; las alas redondeadas y la cola un poco escalonada.

**EL CISA GRACIOSO — CISSA SPECIOSUS**

**CARACTÉRES.**—Los indios llaman á esta ave *sirgang*, y los ingleses grajo verde: es la especie mas conocida del género; tiene 0<sup>m</sup>.43 de largo, de los cuales corresponden 0<sup>m</sup>.23 á la cola; el ala plegada mide 0<sup>m</sup>.17. Su plumaje es de un magnífico verde alga marina, que pasa en ciertos sitios al azul ó verde azulado, y al amarillo en la cabeza, donde se prolongan las plumas en forma de moño. Desde el pico al ojo se corre una lista negra, prolongándose por

4.º LOS ANFÍBOLES—*Amphibola*

detrás de la cabeza para reunirse con la del lado opuesto. Las pequeñas cobijas superiores son pardas; las rémiges de un pardo aceitinado exteriormente y marron en las barbas internas, con una mancha blanca en el extremo; en los individuos viejos las rémiges son de un pardo verdoso; las rectrices negras, y blancas en la punta; y el pico y los piés negros tambien.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El sirgang es propio del Asia central y meridional: se le encuentra en el sudeste del Himalaya, en el país de Assam, de Sylhet y de Tenasserim: en el de Sikkim no es raro á una altitud de 4,000 metros.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Al decir de Jerdon, va de árbol en árbol buscando insectos y sobre todo langostas: segun otros naturalistas, no se contenta con tan fácil presa, y acomete tambien á todos los pequeños vertebrados: añaden que se podria adiestrarle para la caza, como se hace con el halcon.

Su voz, muy fuerte, no seria desagradable si no fuese por las notas roncadas, características de las picazas y de los grajos.

**CAUTIVIDAD.**—Vemos con frecuencia á esta ave cautiva: domesticase rápidamente y no tarda en cobrar afecto á su amo: segun Blyth, es muy divertida y entona alegremente su breve cancion; pero aunque esté en jaula no pierde nada de su ferocidad.

Pocos animales han sido tan difíciles de clasificar como los anfíboles (1), pequeño grupo de aves muy singulares, y originarias casi todas de África: los unos las consideran como trepadoras; los otros como aves chillonas, y los demás las han diseminado en varios órdenes distintos. No puede negarse que algunas de ellas se asemejan á los cuclillos; pero no es menos evidente que otras recuerdan las palomas y hasta las gallinas. No son verdaderas trepadoras, pues no tienen los dedos opuestos, carácter distintivo de este órden; tampoco se parecen á los individuos de otros órdenes, y quedan como aisladas en medio de las aves. Conformándose con Reichenbach, he resuelto agruparlas entre los coraciostros, solo porque sus costumbres ofrecen mucha analogía con las de los grajos; no me fundo en ninguna otra razon, ni tampoco pretendo asegurarles su verdadero lugar en la escala.

Difícil seria designar caracteres comunes á todas estas aves: en cada género son las especies muy afines; pero aquellos difieren entre sí de tal manera, que es de todo punto necesario establecer al menos dos tribus ó familias, en cuyo estudio entraremos desde luego.

**LOS MUSOFÁGIDOS — MUSOPHAGÆ**

**CARACTÉRES.**—Los musofágidos, ó anfíboles propiamente dichos, tienen una talla que varia entre la del grajo y la del cuervo. El cuerpo es prolongado; el cuello corto; la cabeza mediana; el pico, fuerte y ancho, de arista superior muy encorvada y la inferior algo recojida por dentro, con el corte dentado. Las alas son de un largo regular y redondeadas, con la cuarta ó quinta penna mas prolongada; la cola larga y redondeada; las patas fuertes y bastante altas; los dedos se dirijen uno hácia atrás y tres adelante; el extremo se puede inclinar un poco de lado. El plumaje es blando, y los colores muy vivos á menudo.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Los musofágidos habitan los grandes bosques del centro y del sur de África: no se encuentra ninguno en los puntos donde no hay árboles.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Viven en grupos poco numerosos, compuestos de tres á quince individuos: permanecen comunmente en los árboles, y algunos recorren con cierta regularidad una gran extension de terreno. Su vuelo es bastante fácil: el ave puede cambiar de direccion en todos sentidos cuando cruza los aires; en los árboles se mueve con gran agilidad. Difícil es asegurar cosa alguna sobre su inteligencia; pero no se las debe clasificar entre las aves estúpidas: están atentas á todo, son muy cautelosas, y si se las persigue, manifiestan suma desconfianza. Parece que no hacen caso de las otras aves, pues nunca se las encuentra sino con sus semejantes, si bien sucede á veces que los individuos de especies análogas se reúnen por algun tiempo.

Aliméntanse sobre todo, si no exclusivamente, de materias vegetales, de retoños, frutos, bayas y granos, régimen que determina naturalmente el lugar de su residencia. Apenas se las vé mas que en los sitios bien bañados por corrientes, y por lo tanto ricos en frutos.

No tenemos detalles exactos acerca de su manera de reproducirse: únicamente sabemos que algunas de estas aves anidan en troncos huecos y ponen huevos blancos. De su género de vida cuando están juntas se puede deducir que los hijuelos permanecen largo tiempo con los padres.

**CAUTIVIDAD.**—Gracias al régimen que observan los musofágidos, se les puede conservar fácilmente cautivos, aunque sea en nuestros países. Algunos individuos son muy agradables en jaula, pues tienen en su favor la belleza de su plumaje, su alegría y la facilidad de acomodarse á todo.

(1) Precisamente esta es la razon del nombre que se les ha dado, que significa en griego *dudosos*. (N. de la D.)

**LOS MUSÓFAGOS — MUSOPHAGA**

**CARACTÉRES.**—Los musofágos tienen el pico muy característico: es robusto y comprimido hácia la punta; la arista de la mandíbula se ensancha en la base, constituye un disco que rodea las plumas de la frente, y se recoge un poco por dentro hasta la punta, que forma gancho sobre la mandíbula inferior. Las fosas nasales están descubiertas, son ovaladas y se hallan en la parte anterior de la mandíbula superior; el círculo del ojo y las mejillas carecen de plumas; las alas son de un largo regular, y las rémiges secundarias apenas mas cortas que las otras. La cola es corta, ancha y redondeada en su extremo; los tarsos cortos y vigorosos.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—A fines del siglo último descubrió el naturalista alemán Isert, en los bosques de Agra, en la Costa de Oro, la especie tipo de este género. Mas tarde se encontró otra semejante en el oeste del África; pero nos limitaremos á describir la primera.

**EL MUSÓFAGO VIOLETA — MUSOPHAGA VIO-LACEA**

«Podrá creerse que incurro en una exajeracion, dice Swainson, al considerar al musofágo como uno de los príncipes del mundo alado.

»Otras aves son hermosas, de formas elegantes, bonitas y espléndidas; el musofágo violeta ostenta un plumaje verdaderamente régio. El negro púrpura que en él domina, resalta admirablemente con el preciosísimo rojo de las pennas; su pico es grande, mas no desproporcionado; no es tan enorme como el del tucan, ni grotesco como el del ave rinoceronte; su tinte amarillo tira al rojo y contribuye á realzar la hermosura del plumaje.»

**CARACTÉRES.**—El musofágo violeta (fig. 105) mide unos 0<sup>m</sup>.55 de largo total; el ala plegada 0<sup>m</sup>.23, lo mismo que la cola. La parte superior de la cabeza está cubierta de plumitas de color rojo vivo, y brillantes como el terciopelo; el resto del plumaje es de un violeta oscuro, casi negro, con visos de un verde brillante: solo la cara inferior del cuerpo es mate. Las pennas de las alas tienen un tinte rojo vivo, con visos lila y el extremo de un violeta oscuro; rodea el ojo un tinte rojizo carmin; una línea de un blanco brillante, que parte de las mejillas, se extiende sobre el meato auditivo. El pico es amarillo, con la punta rojo carmin; las patas negras y el ojo pardo.