

pardo negro con fajas claras y filetes blanquizcos; la cola cortada por dos fajas de un gris amarillento por encima, y otras de un amarillo rojizo por debajo, una de las cuales ocupa el extremo de la cola.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Segun las observaciones del príncipe de Wied, de Schomburgk, de Burmeister y de otros viajeros, esta rapaz habita la mayor parte de la América del sur; es tan comun en los bosques de las costas como en los de las estepas; pero se la encuentra principalmente en el linderó de aquellos, no lejos de las viviendas.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—«Es una hermosa ave, dice el príncipe de Wied, que se distingue por su vivacidad;



Fig. 132.—EL CIMINDIS DE PICO GANCHUDO

sus largas alas le permiten volar fácilmente y con rapidez. No es rara en ninguna parte: mis cazadores mataron muchas, y encontré en su estómago insectos y moluscos; se alimenta de aves y otros pequeños animales; y es osada y salvaje.»  
Anida en árboles inaccesibles.

### LOS BAZAS—BAZA

**CARACTÉRES.**—Los bazas tienen el pico pequeño, pero muy corvo, con mandíbula superior provista en cada lado de dos aceros dientes; mientras que la inferior tiene tres ó cuatro cerca de la punta; las alas son prolongadas y sub-agudas, con la tercera penna mas larga; la cola prolongada, ancha, cuadrada, y con una ligera escotadura; los tarsos cortos, gruesos y cubiertos de plumas en su parte superior; los dedos cortos; las uñas pequeñas y muy corvas; la cabeza adornada de una especie de moño.

#### EL BAZA LOFOTO—BAZA LOPHOTES

**CARACTÉRES.**—El baza lofoto, ó *syama* de los indios, es una de las especies mas singulares de la familia de los milvidos: tiene de 0<sup>m</sup>.36 á 0<sup>m</sup>.39 de largo por 0<sup>m</sup>.82 de punta á punta de ala; esta plegada mide 0<sup>m</sup>.25 y la cola 0<sup>m</sup>.14. Toda la cara superior del cuerpo, las nalgas, y las cobijas inferiores del ala y de la cola, son de un color negro brillante; las barbas externas de las rémiges secundarias de un hermoso pardo; las plumas de la espaldilla, y algunas de las últimas tectrices superiores del ala, blancas, manchadas de pardo, formándose así en el ala una faja blanca cortada. La cara inferior del cuerpo es blanca; á los lados del vientre hay cinco ó seis fajas de un pardo vivo; las pennas de las alas y de la cola son de un azul claro.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—«Esta hermosa ave, dice Jerdon, se encuentra en todas las Indias: es bastante rara en el sur,

y solo por excepcion se vé algun individuo en los alrededores de Calcuta: abunda mas en la parte baja del Himalaya.»

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—«Aliméntase de los insectos que caza en los bosques: rara vez se remonta por los aires para cernerse y trazar círculos: levanta su moño con frecuencia.»

No sé que se haya publicado ninguna otra observacion acerca de esta rapaz.

### LOS MILANOS—MILVUS

**CARACTÉRES.**—Los milanos tienen formas esbeltas; cabeza pequeña; pico mediano, corto y de arista viva; alas grandes, largas y obtusas; cola larga, mas ó menos escotada, y tarsos cortos protegidos por escamas.

Algunos naturalistas han creido que debian formar dos géneros para los milanos; pero las diferencias que señalan como atributos genéricos son á la verdad, tan poco importantes, que difícilmente se pueden admitir como caracteres genéricos. Nos limitaremos, pues á distribuir los milanos en dos simples grupos.

#### 1.º LOS MILANOS ACUÁTICOS—*Hydroictinia*

**CARACTÉRES.**—Las especies que pertenecen á este grupo tienen la mandíbula superior provista de un diente bien marcado; en las alas la primera rémige es mas corta que la séptima; la cola medianamente ahorquillada y con tintes oscuros.

#### EL MILANO NEGRO—MILVUS (HIDROICTINIA) NIGER

**CARACTÉRES.**—El milano negro tiene de 0<sup>m</sup>.58 á 0<sup>m</sup>.63 de largo y de 1<sup>m</sup>.32 á 1<sup>m</sup>.38 de ala á ala; esta plegada 0<sup>m</sup>.44 y la cola de 0<sup>m</sup>.27 á 0<sup>m</sup>.30. Los adultos tienen la cabeza, la garganta y el cuello de un blanco súcio, con manchas longitudinales de color gris pardo oscuro; el pecho de un pardo rojizo con líneas oscuras; el vientre y las ancas de un pardo rojo, listadas de negro; el lomo, las espaldillas y las tectrices superiores del ala, de un pardo oscuro, con un estrecho filete mas claro en cada pluma; el borde del ala rojo; las rémiges de un negro pardo en la extremidad y blanquizcas en las barbas internas. La cola es parda, adornada con nueve ó diez fajas angostas, alternativamente negras y pardas; el pico negro; la cera amarilla; el ojo gris pardo, y las patas de un amarillo naranja.

Los pequeños tienen un tinte pardo mas uniforme; la membrana de la base del pico y las patas son de un amarillo mas claro que en los adultos; el pico negro y el iris pardo oscuro.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—La especie está diseminada en una extension bastante grande de Europa: habita las llanuras de Alemania, sobre todo las del sudeste, la Hungría, la Rusia y el Asia central hasta el Japon. Se la vé asimismo en algunos puntos de Francia; pero no es mas comun que en Alemania, al paso que abunda en Rusia. En África y en el Asia Menor está representada por una especie semejante, que es el milano parásito, con el cual se le confunde á menudo.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—En nuestros países no es mas que un ave de paso; llega en marzo y nos abandona á fines de octubre; pero no vá muy lejos, pues cuando mas, avanza hasta el Egipto. Frecuenta los bosques situados cerca de los rios ó de las aguas estancadas, porque aquel es su verdadero terreno de caza. Cuando no está en celo solo se retira al bosque para dormir.

El milano negro es una rapaz bien dotada, por mas que no figure entre las aves de rapiña nobles. Vuela con facilidad y durante largo tiempo sin cansarse; tambien se cierne á menudo; pero no se le puede comparar por tal concepto con el halcon. Anda bastante bien, es decir, mejor que otras muchas rapaces, y cuando descansa ó está posado, se mantiene derecho. Sus sentidos son bastante perfectos, la vista, sobre todo, excelente; su inteligencia es mediana; y su carácter no tiene ningun atractivo. El milano negro es una especie de mendigo de los mas osados y molestos que se conocen: demasiado cobarde y perezoso para atrapar por sí mismo la presa, persigue á las rapaces nobles, las atormenta y asedia hasta que le abandonan su víctima. Por esta circunstancia es aun mas perjudicial, pues no sabe cazar bien. Aliméntase de pequeños cuadrúpe-

dos, ratones, ratas y hamsters; y presta de este modo algunos servicios; pero en cambio extermina los lebratos y los topos, y sabe pescar con bastante destreza. En la época del desove persigue á los peces; pero como no se puede sumergir, no perjudica mucho á las pesquerías. Por la osadía con que penetra en los corrales y las granjas es universalmente aborrecido; arrebató los polluelos y otras aves, si bien es tan cobarde que huye de una gallina valerosa. A pesar de ello, y gracias á su astucia y prudencia, encuentra siempre alguna presa; en caso contrario, se come las ranas; y se le vé tambien donde haya restos de animales que devorar.

El periodo del celo comienza á fines de abril ó en los primeros dias de mayo, viéndose á la sazón al macho y á la hembra retozando por las altas regiones; trazan vastas espirales sin aletear una vez, y el macho continúa estos ejercicios mientras que la hembra cubre. Forman el nido en un alto árbol: es una tosca construccion de ramas secas, cubiertas de una capa de materiales mas blandos; la escavacion está tapizada de paja, rastrojos secos, musgo, y á veces papeles y trapos. Los tres ó cuatro huevos que pone la hembra son de color amarillento ó blanco gris, con manchas pardas. Los hijuelos se nutren de musgaños, ranas, y á veces de pajarillos; permanecen largo tiempo en el nido, y aun despues de emprender su vuelo, son alimentados por los padres durante varias semanas, en cuyo tiempo les enseñan tambien cuanto necesitan. Sepárase luego la familia, y cada cual se vá por su lado; pero en el otoño se reunen los milanos negros, formando bandadas mas ó menos numerosas para emprender sus emigraciones.

**CAUTIVIDAD.**—Esta rapaz es bastante agradable en una pajarera y no ocasiona mucha molestia; resignase muy pronto con la pérdida de su libertad; se encariña con su amo, lanza un grito de alegría cuando le vé, y procura darle diariamente nuevas pruebas de afecto. Vive en buena armonía con las otras rapaces de su talla, pero no le causa la menor repugnancia devorar el cadáver de aquellas con las que ha vivido durante varios años en la mejor armonía.

#### EL MILANO GOVINDA—MILVUS (HIDROICTINIA) GOVINDA

**CARACTÉRES.**—El govinda tiene la parte superior de la cabeza, el cuello, el pecho y el vientre de color pardo chocolate, con manchas de un amarillo leonado; la garganta y los lados de la cabeza de un rojo pálido; desde las mejillas á la region de la cabeza se extiende una gran mancha pardo negruzca; las sub-caudales son de un rojo pálido; el lomo y las cobijas superiores de las alas pardas con manchas terminales leonadas; las alas son de aquel mismo tinte; la cola parda por encima, gris por debajo, cortada por fajas un poco mas oscuras, y orillada de leonado en la extremidad; el pico y las uñas de color negro; la cera azulada; las patas de un gris azulado y el iris de un gris oscuro. Esta ave mide 0<sup>m</sup>.59 de largo total, el ala plegada 0<sup>m</sup>.48 y la cola 0<sup>m</sup>.31 (fig. 133).

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El govinda representa al milano negro en las Indias.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Jerdon nos ha dado á conocer las costumbres de esta ave en los siguientes términos:

«Está diseminada en todas las Indias, y es una de las rapaces mas comunes desde las orillas del mar hasta una altitud de dos mil seiscientos metros. Prefiere la intermediacion de las ciudades y lugares habitados para fijar su residencia; sigue á los viajeros; coje su alimento á la vista del hombre; arrebató su presa á las otras rapaces, y aun á sus semejantes, y de vez en cuando atrapa alguna gallina ú otra ave herida. Philipps dice que es muy astuto; que acomete á los loros y gallinas; pero que teme á las aves de rapiña y á las cornejas, permitiendo que estas se repartan entre sí un pedazo de carne sin reclamar su parte. Las noticias de aquel autor no convienen con mis observaciones: el govinda vive en bastante buena inteligencia con las cornejas; pero tambien le he visto perseguirlas y obligarlas á que le abandonen su presa; y hasta sé que algunas personas, dignas de crédito, han asegurado á Blight que las devoraba; tambien ellas persiguen al govinda, aunque solo por puro pasatiempo. Blight añade que estos milanos forman á menudo grandes bandadas; yo mismo he visto á los de todo un país acudir al mismo punto, cual si tratasen de celebrar una especie de consejo. Dícese que durante la estacion de las lluvias abandonan á Calcuta por espacio de tres ó cuatro meses; mas yo no he visto nada

de esto en otras localidades. Aparéanse por Navidad y cubren desde el mes de enero al de abril. Su nido se compone de troncos gruesos y ramas y el interior suele estar relleno de trapos; el milano le forma en un árbol, rara vez en una roca; y en él deposita la hembra tres ó cuatro huevos.»

#### EL MILANO PARÁSITO—MILVUS (HIDROICTINIA) PARASITICUS

El milano parásito representa en África á nuestro milano negro; tiene en aquellos países mas importancia para el hombre que ninguno de sus congéneres europeos.

#### 2.º LOS MILANOS PROPIAMENTE DICHOS—*Milvus*

**CARACTÉRES.**—Las especies de este grupo se diferencian de las del anterior por tener el pico mas fuerte y alto y de gancho



Fig. 133.—EL MILANO GOVINDA

mas corto; por las alas, cuya primera rémige es tan prolongada como la séptima, y por su cola mas larga, con una escotadura mas profunda.

#### EL MILANO REAL—MILVUS REGALIS

**CARACTÉRES.**—El milano real tiene 0<sup>m</sup>.66 de largo por 1<sup>m</sup>.57 de anchura de alas; esta plegada mide 0<sup>m</sup>.50 y la cola 0<sup>m</sup>.39; la hembra alcanza unos 0<sup>m</sup>.08 mas que el macho en todas sus dimensiones. El plumaje es de color rojo de orin, sembrado de manchas y rayas de un pardo negro, que ocupan el centro de las plumas; la cabeza y el cuello son blancos, con manchas longitudinales pardas; la punta de las alas negra y la cola de un rojo de orin con fajas transversales de un pardo oscuro (fig. 134).

Los pequeños tienen la cabeza manchada de blanco amarillento y de rojo de orin; en las plumas de la cara inferior del cuerpo hay un filete claro.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Esta rapaz innoble y vulgar tiene por pátria las llanuras de Europa, desde el sur de Suecia hasta España y de aquí á Siberia. No falta en ningun punto de



Alemania, pero no se la vé en las regiones montañosas sino cuando emigra. Algunas veces se presenta en el nordeste de África, y en casos raros en Egipto.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—El milano real aparece á principios de marzo en nuestros países, y no los abandona hasta los primeros días de octubre; algunas de estas rapaces permanecen todo el año cuando son muy templados los inviernos. En la época de sus emigraciones forman estas aves con frecuencia grandes bandadas de cincuenta á cien individuos, y parece que no se separan en todo el invierno. Cerca de Toledo vi en dicha estación una bandada de ochenta milanos por lo menos: durante el día cazan juntos y por la tarde se reúnen en un pequeño bosque situado á orillas del Tajo. En verano no se encuentran en esta localidad mas que individuos que viven aislados ó por parejas.



Fig. 134.—EL MILANO REAL

En otro tiempo figuraba esta rapaz en algunas ciudades de Europa, como actualmente el milano parásito y el govinda en África y la India. «En tiempo del rey Enrique VIII, dice Pennant, se vieron en las calles de Londres muchos milanos atraídos por los restos de toda clase que se arrojaban en la vía pública; eran tan poco tímidos, que iban á cojer su presa en medio de la multitud, y estaba prohibido matarlos.»

A pesar de su nombre, este milano no tiene nada de real: es perezoso, bastante pesado y asaz cobarde; su vuelo es lento, pero muy sostenido, y no parece sino que nada en los aires; algunas veces está un cuarto de hora sin dar un solo aletazo, guiándose entonces tan solo por los movimientos de su cola. Tan pronto se remonta á una altura donde apenas le puede seguir la vista, como vuela rasando el suelo, sin hacer esfuerzo alguno; anda mal, y avanza mas bien á saltitos; cuando descansa ó está posado parece un milano negro, al que se asemeja tambien por los sentidos y las facultades intelectuales. Es tan perspicaz y astuto como aquel; pero cobarde, perezoso y descarado. Su voz es desagradable: consiste en un sonido prolongado, que tiene algo del balido y del gruñido y podría expresarse por *hiihiiaw*. En el periodo del celo, ó cuando por una causa cualquiera está muy satisfecho, deja oír una especie de trino. Se alimenta de mamíferos pequeños, de pajarillos que no pueden aun volar, de lagartos, serpientes, ranas, sapos, langostas,

insectos y lombrices de tierra; en las granjas arrebatan los pollos, dando mucho que hacer á los que guardan las ocas; es perjudicial á las cacerías, porque extermina los lebratos y las perdices. A fuerza de hostigar á los halcones, consigue tambien quitarles su presa. Sin embargo, á pesar de todos sus defectos, el milano real es una de las aves mas útiles de nuestros países por la infatigable actividad con que persigue á las nubes de arvicolas que devastan nuestros campos. Diariamente extermina un considerable número para su propio alimento ó el de sus hijuelos; y cuando se considera cuántos insectos y roedores nocivos devora, inclínase uno á perdonarle que arrebatase algun animal. Si no fuera tan impudente y mendigo, y no obligase á los halcones á cazar mas de lo que necesitan para si mismos, le asignaríamos un lugar honroso entre los protectores de la agricultura; pero los daños que ocasiona directa ó indirectamente, no nos permiten hacerlo así.

Por lo que hace á la reproducción, todo cuanto hemos dicho del milano negro es aplicable al real, aunque este, no obstante, acostumbra á rellenar mas su nido de trapos y papeles, y no emplea siempre los mas limpios. Cuando esta rapaz puede apoderarse de un antiguo nido de corneja ó de halcón, toma posesion de él; de lo contrario construye ella misma uno. A fines de abril pone la hembra dos huevos, rara vez tres, de color blanquizco y sembrados de manchas rojizas. Solo cubre la madre, encargándose el macho de alimentarla entre tanto; uno y otra contribuyen despues á la enseñanza de sus hijuelos.

**CAUTIVIDAD.**—El milano real se domestica tanto como el negro cuando está cautivo, y es tan manso y sóbrio como él, aunque hay algunas excepciones. «Durante largo tiempo, refiere Berge, tuve un milano en un granero; mas tarde me fué preciso encerrar con él dos gatos medio adultos. Al principio no pareció fijar la atención el ave en sus compañeros; pero bien pronto tomó la costumbre de ahuyentarlos del sitio donde comian; al cabo de poco tiempo no quiso tocar la carne que le daban, y vaciaba en cambio dos veces diarias el plato de sopa de leche destinado para los gatos, tanto que fué preciso trasladarlos á otro sitio para que no se muriesen de hambre. Mientras que estuvieron en el granero no comió el milano carne, pero tampoco permitió que la tocasen los gatos.»

Otras de estas rapaces se han conducido mejor en circunstancias distintas. «Uno de mis amigos, dice Lenz, tuvo mucho tiempo una hembra de milano real, cuyas alas estaban paralizadas, y por lo mismo se le dejaba recorrer libremente el jardín. Construyó un nido; puso dos huevos, los cubrió con mucho afán, é hizo lo mismo al año siguiente. Entonces se le echaron tres huevos de gallina y los cubrió tambien: cuando salieron los polluelos, los sujetaba con su pico si trataban de alejarse, y los colocaba debajo de su cuerpo, procurando alimentarlos con pedazos de carne; pero murieron muy pronto.»

Nuestros milanos se muestran muy afectuosos con las personas que conocen; á mí me complace ir á verlos; y los considero como las rapaces mas agradables del Jardín zoológico de Hamburgo.

## LOS NAUCLEROS — NAUCLERUS

**CARACTÉRES.**—Los naucleros, ó milanos-golondrinas, son los mas notables de todos los milvidos. Tienen el cuerpo róbuso; el cuello corto; la cabeza pequeña, pero larga; la cola muy escotada, como la de la golondrina, con las pennas externas doblemente mas largas que las medias; el pico es muy hendido, bastante largo, pero bajo, corvo desde la base, con gancho acerado y bordes rectos sin dientes ni escotadura; los tarsos, cortos y pequeños, son bastante gruesos; los dedos cortos; las uñas muy aceradas y en extremo corvas, las plumas grandes y suaves.

### EL NAUCLERO MARTINETE — NAUCLERUS FURCATUS

**CARACTÉRES.**—El nauclero martinete, vulgarmente llamado *milano de la Carolina* y *gavilan de las serpientes*, tiene la cabeza, el cuello, el pecho y el vientre de un hermoso blanco de nieve; el lomo, las alas y la cola de un tinte negro con visos azules y verdes; el pico negro; la cera azulada; las patas de un verdoso claro; el iris pardo rojizo ó pardo oscuro, y las uñas de un gris claro. Esta

rapaz mide 0<sup>m</sup>63 de largo por 1<sup>m</sup>37 de punta á punta de ala; esta plegada 0<sup>m</sup>44, la mas larga de las rectrices 0<sup>m</sup>33. El macho, algo mas pequeño que la hembra, tiene colores mas puros (fig 135).

En los pequeños son negros los tallos de las plumas que cubren la nuca y el occipucio; el plumaje del lomo de un color gris sin brillo; las cobijas de un tinte gris en la punta; las últimas pennas secundarias completamente blancas.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El nauclero martinete existe en toda la América meridional, desde el mediodía del Brasil hasta el sur de los Estados-Unidos; en este último país solo se le encuentra en el verano. Segun Audubon, preséntase en la Luisiana y en el Mississipi á principios de abril y algunos dias de setiembre; algunos individuos aislados avanzan mas, dejándose ver en la Pensilvania, en el Estado de Nueva-York; y hasta se ha matado alguno en Europa; pero esta ave no es sedentaria sino en el sur de la América del Norte, en México y en el Brasil.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Esta rapaz es bien conocida, y aunque así no fuera, las particularidades que ofrece son muy á propósito para fijar la atención de la persona mas indiferente. Es raro ver un nauclero solitario, ni tampoco apareado, pues acostumbra á formar bandadas compuestas de un gran número de individuos, los cuales se remontan por los aires ó se posan en algun árbol para descansar. Estas bandadas constan á menudo de veinte á doscientos individuos; el árbol donde se posan ofrece un curioso espectáculo. «El vuelo del nauclero, dice Audubon, es hermoso y sostenido: esta rapaz se mueve en las elevadas regiones con una lijereza y una gracia que no se cansa uno de admirar; remóntase á una altura increíble, cerniéndose y trazando grandes círculos, sin mover mas que la cola, que le sirve de timon; de repente, déjase caer como un rayo, remóntase, vuela y desaparece bien pronto. Otras veces se vé una bandada de estas aves rodeando un árbol, cruzar rápidamente entre las ramas, y cojer al paso los lagartos é insectos de que se alimentan. Los movimientos de estas rapaces son notablemente vivos: la facilidad con que cortan el aire, y la rapidez con que cambian bruscamente de direccion seducen al espectador que las observa.»

El nauclero martinete se alimenta especial, ya que no exclusivamente, de insectos; solo Audubon dice que devora tambien las serpientes y los lagartos, pues todos los demás naturalistas le consideran como insectívoro. Caza los insectos del mismo modo que las golondrinas, con la diferencia de que no coje su presa con el pico, sino con las patas. «Al atravesar las montañas, dice R. Owen, vimos de repente una bandada de naucleros que volaban rasando el suelo y siguiendo la misma direccion que nosotros; muchos individuos distaban solo 4 metros del suelo, y todos se mantenian unidos, lo cual me recordó los martinetes cuando vuelan de concierto al rededor de nuestros mas altos edificios. Estas aves llevaban las alas muy abiertas y la cola extendida; no volaban con mucha rapidez, pero sí largo tiempo, y parecia que no agitaban las alas. Nuestra presencia no les asustó lo mas mínimo, y no les inquietaron tampoco los gritos de admiracion de mi compañero de viaje y sus ademanes violentos. Algunos individuos pasaban á menos de cinco pasos de nosotros, como para dejarse ver mejor; de vez en cuando inclinaba uno lentamente la cabeza, y entonces acercaba al pico la pata con la que acababa de cojer algun objeto. Esto no duró mas que un instante: el ave abría el pico, tragábase la víctima y levantaba la cabeza, siendo de notar que todos ejecutaban los mismos movimientos. Bien pronto comprendimos la razon de tales maniobras: aquellas aves cazaban una magnífica especie de abeja, que por desgracia no pude reconocer.»

No son únicamente los naturalistas los que tienen al nauclero por insectívoro, sino tambien los animales, y por eso le aborrecen algunos de ellos, pues les perjudica en sus cacerías. «Cierta dia, dice Burmeister, vi un nauclero perseguido por un tirano (*saurorhagus sulphuratus*), que le acosaba furioso. Este último no coje su presa sino al vuelo, sin tocar á los insectos posados en las ramas; y al atraparlos el nauclero debajo de las hojas y el ramaje, quitábale en cierto modo el alimento del pico, lo cual irritaba al ave.»

«Cuando el tiempo es hermoso y tranquilo, añade Audubon, el nauclero se remonta á una gran altura, persiguiendo al *mosquito halcón*, insecto de gran talla, y entonces luce toda su habilidad. Aliméntase principalmente de grandes langostas, de orugas, de pequeñas serpientes, lagartos y ranas. Se remonta á poca altura; de-

tiénese un instante, se deja caer, coje una serpiente por el cuello, elévase y la desgarran volando. En aquel momento no ofreceria dificultad acercarse; pero en todas las demás circunstancias es muy recelosa el ave. Cuando se ha matado á un nauclero llegan todos los demás cual si quisieran llevarse su cadáver; de este modo he podido tirar varias veces sobre ellos, disparando rápidamente y volviendo á cargar lo mas pronto posible.

»Durante el día vuelan á gran altura, y por la noche se posan en los pinos y cipreses mas altos, á orilla de los lagos y de los rios.»



Fig. 135.—EL NAUCLERO MARTINETE

Azara añade que uno de sus amigos mandó hacer un reclamo parecido á un nauclero; lo lanzó por los aires, y atrajo así las rapaces á tiro de fusil.

El nauclero se aparea apenas ha llegado á los Estados del sur, procurando antes cautivar á la hembra con sus ejercicios de alto vuelo. Su nido se halla en la cúspide de una encina ó de un pino muy alto, á orillas de un rio ó de una laguna, y se asemeja bastante al de la corneja; la parte exterior se compone de ramas secas, mezcladas con musgo de España, y está relleno de yerbas y plumas. Los cinco ó seis huevos que pone la hembra cada vez, son de color blanco verdoso, con manchas irregulares de un tinte pardo oscuro en el extremo grueso. El macho y la hembra cubren alternativamente, y se alimentan uno á otro. En el momento de salir á luz los hijuelos están cubiertos de un plumon amarillento, mas no tardan en adquirir sus primeras plumas; en el otoño se asemejan ya mucho á sus padres, y en la primavera tienen su plumaje definitivo.

**CAUTIVIDAD.**—Hasta aquí no ha sido posible conservar largo tiempo á esta hermosa ave cautiva: un individuo que tuvo Audubon varios dias, rehusó comer, y hasta vomitó todo cuanto contenia su estómago. Permanecía inmóvil, con las plumas erizadas, y solo cuando le cojian por las alas trataba de hacer uso de sus uñas: murió de aniquilamiento.

Á los naucleros pequeños se les podria acostumbrar sin duda á un alimento fácil de adquirir; pero creo que no se ha hecho aun tal ensayo.