

En todo lo demás, los cotilos de ribera se asemejan en un todo á los demás hirundínidos, y por lo tanto creo inútil hablar mas sobre ellos.

LOS ATICORES — ATTICORA

CARACTÉRES.— Los aticores, que se han llamado tambien *golondrinas de los bosques*, son aves muy graciosas, de alas prolongadas; la primera y segunda rémiges son iguales y las mas largas de todas; el pico pequeño y delgado; los tarsos altos y raquíticos, con dedos cortos; la cola ahorquillada, y el plumaje erectil, con brillo metálico.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Todas las especies que pertenecen á este género habitan el África y la América del sur.



Fig. 174. — EL PROGNEO PURPÚREO

LOS PROGNEOS — PROGNE

CARACTÉRES.— Estas aves constituyen el tránsito de los hirundínidos á los cipsélidos: son robustas, y sus alas, largas y anchas, sobresalen de la cola, que es ancha tambien y ahorquillada. El pico, mas largo que la mitad de la cabeza, es robusto, comprimido desde la base á la punta; la mandíbula superior, recojida por dentro, representa al perfil una curva regular bien pronunciada; los tarsos son robustos, cortos y desnudos; los dedos son mas gruesos que los de los otros hirundínidos; las uñas medianas y el plumaje rígido.

EL PROGNEO PURPÚREO — PROGNE PURPUREA

CARACTÉRES.— Esta ave (fig. 174) tiene 0^m.20 de largo por 0^m.42 de punta á punta de ala; esta plegada mide 0^m.15 y la cola 0^m.07; las pennas caudales medias no alcanzan mas que 0^m.05. La hembra es algo mas pequeña que el macho: en la edad adulta tiene este todo el plumaje de un color azul negro con reflejos purpúreos; las pennas de las alas y de la cola de un pardo negruzco; el ojo pardo oscuro; el pico negro, y los piés de un negro púrpura.

La cabeza de la hembra es de un gris pardo con manchas negras; su plumaje, de un tinte mas gris que el del macho, está cubierto en las partes inferiores de otras longitudinales, negras tambien.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Esta especie habita la América septentrional, y solo se deja ver muy accidentalmente en Europa. Dicese que se han cojido varios individuos en la Gran Bretaña.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Segun Audubon, el progneo purpúreo aparece en los alrededores de Nueva Orleans entre el 1.º y el 9 de febrero, y algunas veces antes: entonces se le vé pasar por el interior de la ciudad y sobre el rio. No llega hasta el 15 de marzo á las inmediaciones de las cascadas del Ohio, donde se presenta en reducidas bandadas de cinco á seis individuos, y no aparece en gran número hasta fines de dicho mes. No se le vé en el Missouri antes del 10 al 15 de abril; permanece allí hasta

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Encuéntanse sobre todo en los bosques, y anidan en los troncos de los árboles huecos.

EL ATICORE FAJADO — ATTICORA FASCIATA

CARACTÉRES.— El aticore fajado (fig. 173) tiene el plumaje enteramente negro, con visos azules metálicos, excepto un faja que cruza el pecho y las piernas, que son blancas. Mide 0^m.16 de largo, el ala plegada 0^m.11 y la cola 0^m.08.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Esta especie habita el norte del Brasil.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Vive exclusivamente en los bosques; caza su presa sobre las corrientes de agua; se posa en las ramas inclinadas sobre los rios, y se distingue siempre por su vivacidad y buen humor.

mediados de agosto y se dirige despues hácia el sur. Estas aves forman entonces bandadas de cincuenta á cien individuos, los cuales se posan en algun campanario ó un árbol grande, desde donde emprenden su emigracion.

El vuelo del progneo purpúreo se asemeja bastante al del queldon de ventana, y aunque no se le pueda comparar con el de la golondrina de chimenea por la gracia y la celeridad, es no obstante, rápido y gracioso. Á semejanza de todos los hirundínidos, bebe volando y se baña, aunque tambien se posa á menudo en tierra, y á pesar de sus cortas patas, se mueve con la suficiente destreza para cazar los insectos, corriendo asimismo con cierta agilidad en medio del ramaje de los árboles donde se posa.

Esta ave es tan atrevida y valerosa como la golondrina rústica: persigue y acosa á los carnívoros, á los mamíferos y á las aves, principalmente á los gatos, perros, halcones, cornejas y buitres; precipítase furiosa contra las rapaces, las inquieta y no las deja un momento de reposo hasta que se alejan de su nido.

En casi todos los Estados del centro se preparan cajones para que se alberguen estas aves, ó bien se cuelgan de los árboles calabazas vacías con un agujero, en las que les gusta anidar. Ahuyentan de ellas á las demás aves que se introducen, y no permiten en su vecindad la presencia de ninguna de las especies que anidan del mismo modo.

Su canto es agradable, aunque no variado: el gorjeo que produce el macho desde por la mañana es la señal de la llegada del día. Al indio mismo le seducen estas aves y procura que se fijen cerca de su choza.

En los Estados del centro hace su nido en el mes de abril, sirviéndose para ello de ramas secas, yerbas, hojas y plumas. Cada puesta es de cuatro ó seis huevos: á fines de mayo comienzan á volar los hijuelos de la primera; los de la segunda abandonan el nido en el mes de julio. En la Luisiana y en los otros Estados del sur ponen á menudo por tercera vez.

El macho cuida cariñosamente de la hembra cuando cubre; permanece cerca de ella y trata de distraerla con su canto y su gorjeo. Sucede á menudo que varias parejas anidan unas al lado de otras, sin que deje de reinar la mejor armonía entre ellas.



GRUPO DE HIRUNDÍNIDOS

Fam. III 306. + 307.

En todo lo demás, los cotilos de ribera se asemejan en un todo a los demás hirundinidos, y por lo tanto creo no haber mas que decir de ellos.

LOS ATICORES — ATTICORA

CARACTÉRES. — Los aticores, que se han llamado tambien golondrinas de los bosques, son aves muy graciosas, de alas prolongadas; la primera y segunda rémiges son iguales y las mas largas de todas; el pico pequeño y delgado; los tarsos altos y esqueléticos; non dedos cortos; la cola ahorquillada, y el plumaje cretoso, con brillo metálico.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. — Todas las especies que pertenecen a este género habitan el África y la América del sur.



Fig. 172. — EL PROGNEO PURPÚREO.

LOS PROGNEOS — PROGNE

CARACTÉRES. — Estas aves constituyen el tránsito de los hirundinidos a los cipsélidos: son robustas, y sus alas, largas y anchas, sobresalen de la cola, que es ancha tambien y ahorquillada. El pico, mas largo que la mitad de la cabeza, es robusto, comprimido desde la base a la punta; la mandíbula superior, recogida por dentro, representa al perfil una curva regular bien pronunciada; los tarsos son robustos, cortos y desnudos; los dedos son mas gruesos que los de los otros hirundinidos; las uñas medianas y el plumaje rígido.

EL PROGNEO PURPÚREO — PROGNE PURPÚREO

CARACTÉRES. — Esta ave (fig. 174) tiene 0m 20 de largo por 0m 45 de punta a punta de ala; esta plegada mide 0m 15 y la cola 0m 07; las pennas caudales medias no alcanzan mas que 0m 05. La hembra es algo mas pequeña que el macho: en la edad adulta tiene este todo el plumaje de un color azul negro con reflejos purpúreos; las pennas de las alas y de la cola de un pardo agrizado; el ojo pardo oscuro; el pico negro, y los piés de un negro púrpura.

La cabeza de la hembra es de un gris pardo con manchas negras; su plumaje, de un tinte mas gris que el del macho, está cubierto en las partes inferiores de otras longitudinales, negras tambien.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. — Esta especie habita la América septentrional, y solo se deja ver muy accidentalmente en Europa. Dicese que se han cogido varios individuos en la Gran Bretaña.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. — Segun Audubon, el progneo purpúreo aparece en los alrededores de Nueva Orleans entre el 1.º y el 9 de febrero, y algunas veces antes: entonces se le vé pasar por el interior de la ciudad y sobre el río. No llega hasta el 15 de marzo a las inmediaciones de las cascadas del Ohio, donde se presenta en reducidas bandadas de cinco a seis individuos, y no aparece en gran número hasta fines de dicho mes. No se le vé en el Missouri antes del 10 al 15 de abril; permanece allí hasta

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. — Encuéntranse sobre todo en los bosques, y andan en los troncos de los árboles huecos.

EL ATICOR FAJADO — ATTICORA FASCIATA

CARACTÉRES. — El aticor fajado tiene el plumaje enteramente negro, con una faja blanca que cruza el pecho y se prolonga por los lados. Mide 0m 26 de largo, el ala plegada 0m 12 y la cola 0m 08.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. — Este aticor habita el norte del Brasil.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. — Este aticor vive en los bosques; caza su presa sobre las copas de los árboles; se posa en las ramas inclinadas sobre los rios, y se distingue siempre por su vivacidad y buen humor.

mediados de agosto y se ve después hasta el fin de septiembre; man entonces bandadas de ellas sobre las copas de los árboles, y se ven en algun momento a un gran número de ellas volar y prender su emigración.

El vuelo del progneo purpúreo se esmera bastante en el momento de ventisca, y aunque no se le puede comparar con el de la golondrina de chimenea por la gracia y la elasticidad de sus alas, es rápido y gracioso. A consecuencia de todos los esfuerzos que hace al vuelo y se bala, siempre tambien se posa a descansar en las copas de sus árboles; se bala con la mandíbula abierta, para cazar los insectos, y tambien se ve a veces que se posa en el borde del ranaje de los árboles donde se cria.

Esta ave es tan silenciosa y voladora como la golondrina; persigue y acosa a los cucullidos, a los cucullidos y a las aves, principalmente a los gatos, perros, halcones, cornejas y bohemios; se precipita furiosa contra las rapaces, los águilas y no las deja en momento de reposo hasta que se acaban de su nido.

En casi todos los Estados del centro se reparan caperuzas que se alberguen estas aves, ó bien se cuelgan de los árboles, en las bázias vacias con un agujero, en las que les gusta anidar. Algunas de ellas a las demás aves que se introducen, y no permiten en ninguna de la presencia de ninguna de las especies que anidan en el mismo nido.

Su canto es agradable, aunque no variado: el gorjeo que se oye cuando se levanta por la mañana es la señal de la llegada de las aves; cuando mismo se vuelven estas aves y procura que se fijen en su choro.

En los Estados del centro hace su nido en el mes de mayo; se compone para esto de ramas secas, yerbas, hojas y pajas; la puesta es de cuatro ó seis huevos; á fines de mayo comienzan a volar los hijuelos de la primera; los de la segunda se ven en el nido en el mes de julio. En la Luisiana y en los otros Estados del sur ponen á menudo por tercera vez.

El macho cuida cariñosamente de la hembra cuando ella permanece cerca de ella y trata de distraerla con su canto. Sucede á menudo que varias parejas anidan unas cerca de otras, sin que deje de reinar la mejor armonía entre ellas.



GRUPO DE HIRUNDÍNIDOS.

Foin. III 306. + 307.