

manifiestaban un tenaz encarnizamiento contra una pareja de tiranos que tuvo la osadía de construir su nido sobre un árbol situado allí cerca. Cuando la hembra comenzó á cubrir, las golondrinas acometieron al macho sin dejarle tregua ni reposo, y á pesar de su valor y su fuerza, le maltrataron de tal modo que murió; viéndose la hembra precisada á ir en busca de otro compañero.

Allí donde hay campos de trébol en flor se vé al tirano intrépido volar sobre ellos, dejándose caer súbitamente en medio de las flores, para remontarse despues en persecucion de algun insecto que inútilmente trata de escapar. En tales circunstancias vuela á derecha é izquierda, sube, baja, describe zig-zags en el aire; y en una palabra, su vuelo se determina por el del insecto que persigue.

Hácia mediados de agosto guarda silencio el ave, y permanece entonces en los campos de cereales y en las praderas, posada en algun punto alto, desde donde acecha á los insectos; y cada vez que se apodera de uno vuelve á su sitio para matarle y comérsele. Con frecuencia vuela sobre el agua, á la manera de las golondrinas; lo mismo que ellas, bebe y se baña volando; pero si se sumerge, vuela despues á un árbol de la orilla y sacude el agua que cubre su plumaje.

El tirano intrépido abandona los Estados del centro antes que las demás aves. Durante su emigracion vuela con rapidez; aletea al principio precipitadamente seis ó siete veces, y recorre luego algunos metros sin moverlas. En los primeros dias de setiembre vió Audubon pasar de este modo bandadas de veinte á treinta individuos; iban muy silenciosos, y viajaban de dia lo mismo que de noche: hácia primeros de octubre no se vé ya un solo individuo en todos los Estados de la Union.

USOS Y PRODUCTOS.— Se matan muchas de estas aves porque su carne es delicada, y no porque devoren los insectos de que se alimentan: para los habitantes de la Luisiana constituye un manjar muy apetitoso el tirano intrépido, á quien ellos llaman *comedor de abejas*.

LOS SAURÓFAGOS—SAUROPHAGUS

CARACTÉRES.— Los saurófagos tienen las alas largas; cola ligeramente escotada; patas vigorosas; tarsos altos y fuertes; dedos largos; uñas encorvadas, pico del largo de la cabeza, mas alto que ancho, casi cónico, de arista redondeada, punta muy ganchuda, y algo escotado en la punta. Rodean el borde bucal varias sedas, que revisten toda la base del pico, y se desarrollan principalmente á lo largo de la línea que se corre desde aquel órgano al ojo. El plumaje es compacto, con plumas pequeñas.

EL SAURÓFAGO BENTEVEO—SAUROPHAGUS SULPHURATUS

CARACTÉRES.— Los naturales de la Guyana y del Brasil designan á esta ave con el nombre de *benteveo* y *tictivi*: tiene 0^m28 de largo por 0^m14 de ala á ala; esta plegada mide 0^m08. El lomo es de color pardo aceituna; la frente blanca, lo mismo que una línea que hay por encima del ojo; en la parte superior de la cabeza se ostenta una especie de moño de color amarillo de azufre; el resto de aquella, la línea que va del pico al ojo y las mejillas son de un tinte negro; las cobijas superiores, las rémiges y las rectrices están orilladas de un rojo de orin; la garganta y el cuello son de un color blanco; el pecho, el vientre, las nalgas y la rabadilla de un amarillo de azufre.

Los pequeños tienen un plumaje mas oscuro; la parte superior de la cabeza, las alas y la cola presentan anchos filetes de un tinte rojo de orin.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El benteveo es una de las aves mas conocidas de la América del sur; abunda principalmente donde los matorrales alternan con los lugares descubiertos.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Esta ave no huye de la vecindad del hombre; encuéntrase en los plantíos, en el lindero de los bosques, en los pastos y en medio del ganado.

Un árbol ó un matorral solitarios, una piedra, un montecillo, el suelo desnudo ó la espesa copa de un árbol, son para el saurófago otros tantos observatorios desde donde acecha su presa; es vivaz, activo, curioso y pendenciero, y cuando se encela, pelea con sus semejantes para disputarse la hembra: Schomburgk dice que está

en continúa lucha con ellos. El grito que continuamente dan el macho y la hembra llama la atencion del viajero, y los colonos le expresan de diverso modo; en el Brasil *ben-te-vii*, y en Montevideo y Buenos Aires *ben-te-veo*.

Las costumbres de esta ave son dignas de que fijemos por un momento nuestra atencion; el benteveo es un verdadero tirano, que no teme á ninguna otra ave: «Jamás, dice el príncipe de Wied, deja




Fig. 200.—EL SAVANA TIRANO

escapar la ocasion de acosar ó perseguir á una rapaz.» Su audacia vá mas allá todavía, pues acomete realmente á las rapaces; cae sobre ellas y las picotea repetidas veces.

Se acusa al benteveo de robar los nidos y no contentarse exclusivamente con los insectos; una observacion de Schomburgk, que vió á esta ave perseguida por otras pequeñas, parece confirmar el aserto. Á juzgar por lo que dicen Azara y d'Orbigny, no cabe duda que el benteveo es carnívoro, pues se le ha visto cojer cerca de las casas la carne que se habia puesto á secar; acude tambien cuando comen los buitres, y se mantiene á cierta distancia,

dispuesto á cojer los pedazos que aquellos abandonan por un momento. Los insectos, no obstante, constituyen la base de su régimen: el príncipe de Wied no halló en el estómago de los individuos que abrió, sino restos de coleópteros y de langostas, á las cuales da caza como lo hacen las especies afines; acéchalas posado en un punto culminante; las persigue al vuelo, y cuando las coje vuelve á su observatorio para devorar la presa.

Hácia la época del celo está el benteveo muy excitado: persigue á su hembra desplegando todas sus gracias en el vuelo; levanta su moño, y trata de hacerse agradable, si tal puede decirse. Despues del apareamiento comienzan á fabricar su nido macho y hembra: el príncipe de Wied le ha encontrado en la primavera, esto es, á fines de agosto ó principios de setiembre. El nido está situado en la bifurcacion de un arbusto ó de un árbol poco alto; consiste en

una gran bola compuesta de musgo, hojas y plumas, con una abertura lateral pequeña y redondeada. Cada puesta consta de tres ó cuatro huevos, de un color verde pálido, sembrados de espesas manchas negras y de un verde azul, numerosas principalmente hácia el extremo grueso. Durante la estacion del celo, muéstrase el benteveo mas pendenciero y valeroso que de costumbre.

CAUTIVIDAD.— Solo Azara nos habla de la vida de esta ave en el estado de cautividad: por lo que dice, parece que sería fácil conservarla; que vive en buena armonía con las demás avecillas, y deja oír con frecuencia su voz; pero carece de actividad.

Una de estas aves, que conservó Azara algun tiempo, pasaba casi todo el dia en el mismo sitio, sin moverse apenas mas que para tomar los pedacitos de carne cruda con que la alimentaban. Antes de tragárselos, cojialos con el pico y los golpeaba fuertemente




Fig. 201.—EL MEGALOFOS REAL

sobre el suelo, ó contra los barrotes de su jaula, cual si hubiese creído que estaban llenos de vida y quisiera matarlos; lo mismo hacia cuando le daban langostas y orugas.

LOS SAVANAS—MILVULUS

CARACTÉRES.— Los savanas, ó tiranos de cola ahorquillada, se caracterizan por tener esta muy larga y con una profunda escotadura. Las formas son esbeltas; el cuello corto; la cabeza grande y ancha, y las alas largas y agudas, con la segunda rémige mas larga. El pico viene á tener el mismo largo de la cabeza; es bastante fuerte, aplanado en su origen y un poco voluminoso lateralmente; tiene la punta ganchuda, y cubierta en parte la base de sedas. Los tarsos y sus dedos son cortos y raquíticos; las uñas un poco corvas, comprimidas lateralmente y muy puntiagudas. El plumaje es suave, aunque no muy abundante.

EL SAVANA TIRANO—MILVULUS TYRANNUS

CARACTÉRES.— El savana tirano, ó simplemente savana (figura 200) tiene 0^m39 de largo, de los cuales corresponden por lo menos 0^m27 á las rectrices laterales, mientras que las medias no pasan de 0^m07; las alas desplegadas miden tambien 0^m39. La cabeza y las mejillas son de un color negro oscuro; el moño amarillo en la base de las plumas; el lomo de un gris ceniciento, mas oscuro hácia la rabadilla, que es de un pardo negruzco; el vientre blanco; las cobijas superiores del ala y las rémiges, pardo negruzcas tambien, con un ligero filete gris; la mitad de las barbas externas de las rectrices laterales es blanca; el ojo pardo oscuro, y el pico y las patas de un tinte negro.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Audubon y Nuttall aseguran que el savana tirano escasea muchísimo en los Estados- Unidos: su patria es mas meridional; en las estepas de la América del centro y del sur es donde se le encuentra sobre todo en mayor número.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Segun Schomburgk, se ven numerosas bandadas de estas aves en las breñas, ocupadas en cazar insectos: por la tarde vuelven á su lugar de reposo y al dia siguiente aparecen de nuevo en las estepas. Mientras están posadas parecen tristes, silenciosas y melancólicas, al paso que

cuando vuelan llaman desde luego la atencion; á cada momento ensanchan su larga cola ó unen mas las plumas, de tal modo que parece una tijera que se abre y se cierra.

Cazan los insectos como las otras especies análogas, y persiguen á las aves pequeñas, ó por lo menos á las que están heridas. «Un savana tirano, refiere Burmeister, cojió al vuelo un colibrí que acababa de herir mi hijo y se lo llevó en el pico; pero un segundo tiro le mató tambien.» Nuttall dice que comen asimismo frutos, lo cual no parece inverosímil.

Forman un nido en espesos matorrales, á mediana altura del suelo: es semi-esférico, abierto por arriba, y se compone exteriormente de pequeñas brizas; el interior está relleno de fibras vegetales, lana, plumas y algodón.

Los huevos son blanquicos y están cubiertos de motas de color rojo pardo, mas compactas en el extremo grueso. Mientras que la hembra cubre, el macho persigue y caza todas las aves que se acercan al nido; y cuando los hijuelos han comenzado á volar, reúnese toda la familia para hostigar á las rapaces.

Hácia el otoño se reúnen los savanas tiranos para emprender su expedicion de invierno. «Á fines de la estacion de las lluvias; dice Schomburgk, en los meses de setiembre y octubre ví durante varios dias innumerables bandadas de estas aves, que pasaban sobre Georgetown; venian del norte y dirigíanse hácia el sur. Parecióme singular que llegasen siempre entre las tres y las cinco de la tarde; posábanse sobre los árboles de los alrededores de la ciudad, donde pasaban la noche, y á la mañana siguiente emprendian el camino hácia la sabana. Todos los años aparecen estas bandadas en la misma época, y es para los habitantes indicio de que se acaba la estacion de las lluvias. En las demás épocas del año no se les encuentra jamás cerca de las costas.»

LOS MEGALOFOS—MEGALOPHUS

CARACTÉRES.— Este género, basado sobre una especie que se ha clasificado mucho tiempo como tirano, tiene el cuerpo prolongado; alas cortas, puntiagudas y sub-obtusas, con la tercera y cuarta rémiges mas largas; la cola, de mediana longitud, está truncada en ángulo recto; el pico es muy deprimido, ancho, en forma de cuchara, de arista roma, punta bastante larga, ganchuda y

guarnecida en la base de sedas, algunas de las cuales alcanzan á la extremidad; los tarsos y los dedos relativamente cortos, las uñas endebles y poco ganchudas. El plumaje es blando y veloso; las plumas de la frente, bastante largas, forman un ancho moño que se abre en forma de abanico.

EL MEGALOFO REAL—MEGALOPHUS REGIUS

CARACTÉRES.—Esta ave se distingue por tener una especie de corona que adorna su cabeza, á cuyo carácter debe que se le haya designado con el nombre de *tirano coronado* ó *tirano rey*. Tiene el lomo de un magnífico color pardo claro; el vientre, la radilla y la cola de un amarillo rojo; la garganta blanquiza; las pennas de las alas de un pardo oscuro ó negruzcas, orilladas inte-

riormente de un tinte claro; las cobijas superiores del ala son de un amarillo pálido en la punta; las plumas que forman el moño de un rojo fuego ó rojo carmin, con una mancha negra terminal, precedida de un anillo amarillo claro. En el macho llegan estas plumas hasta la nuca; en la hembra son mas cortas y los colores menos vivos. El ojo es castaño claro; la mandíbula superior parda; la inferior del mismo tinte mas pálido; las patas de color de carne y las sedas negras (fig. 201).

En los hijuelos el moño es pequeño, de un tinte naranja, con las plumas del pecho listadas transversalmente de pardo y las del lomo manchadas del mismo color.

El megalof real mide 0^m.17 de largo, el ala plegada 0^m.10 y la cola 0^m.07.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Habita en las espesas y




Fig. 202.—EL GUBERNETO YETAPA

sombrias selvas vírgenes del Brasil y de la Guyana, principalmente en las inmediatas á los ríos.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Vive solitario y silencioso en la cima de los árboles; pero en todas partes le conocen los colonos y los indígenas, pues su belleza les ha llamado la atención. Los brasileños cuentan que cuando se mata á un macho en la época del celo, busca la hembra en seguida otro, con el cual se aparea. Hé aquí porqué los indígenas que cazan para los coleccionistas no matan mas que los machos apareados, y esperan á que la hembra contraiga una segunda union para quitarle su compañero. Créese que cada una puede tener así doce machos, uno despues de otro; al menos, así lo dice Burmeister. No se ha descrito el nido de esta ave: sus huevos son de un color rojo violeta claro, sembrados de puntos y manchas de un tinte pardo rojizo y color de sangre, mas compactos hácia el extremo pequeño.

LOS GUBERNETOS—GUBERNETES

CARACTÉRES.—Los gubernetos son aves bastante grandes y vigorosas: tienen las alas medianas y sub-agudas, con la segunda y tercera rémiges mas largas; la cola prolongada y muy escotada; los tarsos altos y fuertes; los dedos gruesos; las uñas cortas y ro-

bustas; el pico grande, grueso, mas alto que ancho, cónico, y de punta mas ó menos ganchuda. El plumaje es compacto, rígido y poco veloso.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Estas aves son propias de la América del sur.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Encuéntanse los gubernetos cerca de las casas, en los jardines, en las llanuras descubiertas, en la inmediación de los estanques, de los riachuelos y ríos, y en medio de los juncos y de las cañas. Aliméntanse de insectos, á los cuales dan caza como los tiranos y los papamoscas.

EL GUBERNETO YETAPA—GUBERNETES YETAPA

CARACTÉRES.—El yetapa ó *yiperu*, como le llaman los guaraníes, se asemeja mucho á los savanas. Tiene el lomo y el vientre gris; las alas y la cola negras; las primeras tienen un filete blanco en el pliegue del ala, y una mancha de color rojo de orin claro en el borde externo de las grandes rémiges. Una faja pardo roja que se corre entre los ojos separa el color blanco de la garganta del gris del pecho; la frente y el borde superior del ojo, que es pardo rojizo, tienen un tinte blanco, y el pico y las patas negro. El yetapa mide 0^m.41 de largo, de los que corresponden 0^m.25 á las pennas

caudales externas y 0^m.07 á las medias: las alas abiertas miden unos 0^m.41 (fig. 202).

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El yetapa habita en el Brasil y el Paraguay.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Vive de preferencia en los parajes descubiertos donde crecen aisladamente algunas breñas. Dice Azara que sus costumbres difieren mucho de las de los tiranos propiamente dichos: recorre con sus semejantes un canton bastante reducido; frecuenta los pantanos y las tierras contiguas; se posa sobre los juncos y los arbustos, y busca su alimento en tierra, aunque tambien sabe cojer los insectos al vuelo, cuando pasan á su alcance. Su grito consiste en un simple silbido que se oye desde lejos.

LOS GALLITES—ALECTRURUS

CARACTÉRES.—Los gallites pertenecen al grupo de los tiránidos fluvícolas. Se caracterizan por su cola corta, compuesta de rectrices ordinarias, ó sea de plano horizontal, y de rectrices sencillas, desigualmente barbadadas y de plano vertical; el pico es grueso, cónico, dilatado á los lados y con punta de gancho muy fino; los tarsos altos y delgados; los dedos gruesos; las uñas largas, delgadas y medianamente encorvadas; las alas de un largo regular y super-obtusas; la tercera y cuarta rémiges son las mas largas; las dos primeras terminan en punta muy aguda.

EL GALLITE TRICOLOR—ALECTRURUS TRICOLOR

CARACTÉRES.—Las aves de esta especie miden 0^m.30 de largo por 0^m.24 de punta á punta de ala; esta plegada 0^m.07 y la cola unos 0^m.04. El plumaje del macho es negro, excepto la garganta, la parte anterior del cuello, la interior del ala y el vientre, que tienen un tinte blanco. El ojo es pardo, el pico pardusco y las patas de un pardo oscuro.

La hembra y los hijuelos tienen el plumaje pardo amarillo, con la garganta blanca, y sus pennas caudales no son mas anchas unas que otras.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El gallite tricolor habita una gran parte de la América del sur. Azara le descubrió en el Paraguay, y mas tarde se le ha encontrado en el Brasil, en Bolivia y en la república Argentina, por manera que se le pueden asignar como patria todas las llanuras de la América del sur.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Por las observaciones de Azara y d'Orbigny sabemos que esta ave se posa siempre en la extremidad de los tallos de las yerbas; de vez en cuando se remonta para cojer un insecto; permanece algunos momentos en el aire y luego se deja caer verticalmente con las alas y la cola tendidas.

D'Orbigny la vió cojer insectos en tierra; pero no ha reconocido nunca que acostumbrara á posarse en el suelo. Su vuelo es cortado y de poca extension cuando no caza; y hasta parece que solo vuela por necesidad: no le inspira miedo el hombre.

LOS CAMPEFÁGIDOS—CAMPEPHAGÆ

Son tan numerosas todas las aves que por su género de vida y sus costumbres ofrecen semejanzas con las que acabamos de estudiar y con los muscápidos, que nos vemos en la precision de limitarnos mas de lo que desearíamos, pues para trazar la historia de todas necesitaríamos un gran volumen. Los países tropicales contienen un número infinito de insectívoros, siendo mucho mayor entre ellos el de los comedores de moscas, y por lo tanto no puedo hacer mas que indicar rápidamente las especies mas notables.

CARACTÉRES.—Estas aves forman una pequeña familia que se caracteriza por sus alas medianas, cola bastante larga, redondeada ó truncada; tarsos cortos y endebles; pico regular, ensanchado en la base y guarnecido de sedas endebles. En los campefágidos, son particularmente rígidas las plumas del lomo.

Los naturalistas no están de acuerdo acerca del lugar que debe asignarse á estas aves: para unos son verdaderos papamoscas; otros las clasifican con los lánidos, y algunos hasta con los paradísidos.




Fig. 203.—EL PERICROCOTO ESPLÉNDIDO

Hartlaub ha publicado últimamente una reseña de las especies conocidas, y describe sesenta y siete.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Todas estas aves habitan las Indias orientales, las islas próximas, la Nueva Holanda y el África.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—No tenemos detalles acerca de su género de vida; solo se sabe que por lo general viven en los bosques y jardines formando reducidas bandadas; que son insectívoros y que alternan este régimen con algunos frutos.

LOS PERICROCOTOS—PERICROCOTUS

CARACTÉRES.—Tienen el pico bastante corto, de base ancha y con arista ligeramente convexa; los dedos son de un largo regular, provistos de uñas sumamente corvas; las alas sub-obtusas,

con la cuarta y quinta rémiges mas largas; la cola regular, con las pennas medias truncadas en ángulo recto, y las laterales puntiagudas.

EL PERICROCOTO ESPLÉNDIDO—PERICROCOTUS SPECIOSUS

CARACTÉRES.—Es vulgarmente conocido con el nombre de *ave bermellon*: tiene 0^m.25 de largo por 0^m.34 de punta á punta de ala; esta plegada mide 0^m.12 y la cola 0^m.11. Su plumaje es magnífico: el lomo del macho, las alas y las dos pennas caudales medias son de un azul negro brillante; la parte baja de aquel, una ancha faja que cruza el ala, las rectrices laterales y toda la cara inferior del cuerpo son de un magnífico color rojo escarlata (fig. 203). El plumaje de la hembra presenta un tinte mas agrisado; la parte