

LOS TIMALIDOS — TIMALIÆ

CARACTÉRES.—Los timalidos, vulgarmente llamados *tordos ruidosos*, son muy afines de los mímidos: tienen el cuerpo recogido, alas muy cortas y redondeadas; cola mediana, mas ó menos redondeada tambien; pennas anchas; patas vigorosas; pico fuerte, comprimido lateralmente, con la punta de la mandíbula superior algo encorvada; plumaje lácio y colores oscuros.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Los timalidos habitan el África y el sur de Asia.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Por algunos conceptos se asemejan á los tordos, y por otros á los grajos, á las pegas-rebordadas ó á las currucas. Frecuentan las breñas, los tallares y las espesuras de cañas. Son muy sociables, mas no hasta el punto de formar numerosas bandadas; su vivacidad es notable, gritan




Fig. 233.—EL TIMALIA DE TOCA

mente redondeada por los lados; plumaje lácio de color oscuro, excepto las cobijas inferiores de la cola, que son de un color rojo ó amarillo vivos.

EL TURDOIDEO ARSINOE — PYCNONOTUS ARSINOE

CARACTÉRES.—El arsinoe, especie la mas conocida segun creo, y la mejor dotada del género, tiene 0^m20 de largo y 0^m30 de punta á punta de ala, la cola 0^m08 y el ala plegada 0^m09. El lomo y la cabeza son de color gris pardo oscuro; la garganta de un pardo negro; el vientre y el pecho de un pardo gris; el ojo pardo; el pico y las patas de color negro; el plumaje es el mismo en ambos sexos.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave es originaria de África y del sur de Asia; solo por excepcion se la vé en la Arabia Petrea; mas raro es aun encontrarla en Europa. Eherenberg la descubrió en el oasis de Jajiouw, donde la observé yo tambien; pero escasea todavia mucho en esta latitud, y no comienza á ser abundante sino á partir del 25° norte. En el norte de la Nubia se puede tener la seguridad de verla en casi todas las breñas de mimosa; en el Sudan oriental es una de las aves mas comunes.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Esta ave parece encontrarse bien en todas partes, así en el interior de las selvas vírgenes como en los jardines; lo mismo en las mimosas de las estepas, que en los achaparrados matorrales de las altas montañas. Busca no obstante los árboles y las breñas cubiertas de sombra, así es que en el valle inferior del Nilo se observa que prefiere los sicomoros á todos los demás árboles.

El arsinoe es un ave alegre, vivaz y agradable, que no teme fijarse cerca de las casas y que vaga siempre en medio de las chozas de los nubios y de los habitantes del Sudan. Por lo que mas llama la atencion es por su canto, pudiendo realmente considerarse como

casi de continuo, y algunos son buenos cantores. Casi todos se deslizan con la mayor lijereza entre los mas espesos jarales; no vuelan con perfeccion, y pocos hay que se remontan hasta la cima de los mas altos árboles. Aliméntanse de insectos, moluscos, gusanos, frutos, y principalmente bayas, tan abundantes en los bosques que habitan.

LOS TURDOIDEOS — PYCNONOTUS

CARACTÉRES.—Los turdoideos tienen el pico fuerte, de mediana largura, con el lado dorsal lijeramente convexo; patas vigorosas; alas regulares, con la quinta rémige mas larga; cola lijera-

una de las mejores cantoras del nordeste de África, que rivaliza con las aves de Europa. Su canto, claro, armonioso y rico, se parece al del tordo, y tiene además un carácter particular é indescriptible: su grito de llamada es el mismo en ambos sexos y se puede expresar por *gub, ga, gub*.

El arsinoe se mueve entre el ramaje con la mayor lijereza; en tierra salta bien; pero su vuelo es torpe y pesado. Desde la mañana hasta por la tarde se le vé en continuo movimiento, y su alegre canto indica su carácter alegre. Si se posa (lo cual no hace nunca mas que por un momento), endereza el cuerpo en actitud altiva; de vez en cuando levanta las largas plumas de su occipucio; mira al rededor de sí y avanza á saltitos, examinando cuidadosamente las flores y las hojas, á derecha é izquierda, pues ellas le proporcionan su alimento. Cuando las mimosas florecen, come casi exclusivamente los insectos que encuentra en las pequeñas flores amarillas, que sabe descubrir y sacar del fondo de su escondite. Entonces se llenan á menudo de pólen las plumas de sus costados, y adquieren un magnífico tinte amarillo de azufre. Caza tambien las orugas, y persigue á menudo á las mariposas: en tiempo de los frutos come asimismo bayas.

Se encuentran los turdoideos arsinoes por parejas ó reducidas familias, segun las estaciones; el macho y la hembra se conservan fieles uno á otro y las familias están muy unidas. Ni aun el periodo del celo basta para romper sus lazos; así es que durante él se ven á menudo varias parejas, si no en el mismo árbol, en un jardin, ó en una parte del bosque. Segun la localidad donde se hallan, andan mas ó menos tarde: en el norte, por la primavera, y en el Sudan á principios de la estación de las lluvias. El nido, situado en un espeso matorral, es de artística construccion, pero de paredes muy delgadas, casi transparentes; algunas raices, rastrojo, y yerbas, enlazadas con tela de araña, forman la parte exterior; el interior es muy liso y está cubierto de fibras corticales bastante finas. Los huevos son pequeños, de color blanco rojizo, sembrados de puntos

blanquicos y de un pardo oscuro que afectan la forma de corona al rededor de cada punta.

CAUTIVIDAD.—Los indígenas del norte de África son demasiado perezosos y apáticos para cojer arsinoes y conservarlos en jaula. En las Indias, por el contrario, se domestican algunos de sus congéneres, y se les aprecia mucho, no por su canto (ningun autor lo dice, por lo menos), sino por su ardor para la lucha. En Ceilan constituyen las peleas de *boulbous* (*Pycnonotus hamorrhous*) uno de los acostumbrados recreos de los indígenas: se cojen machos pequeños en el nido; se atan con una cuerdecita, y se les enseña á posarse en la mano; una vez que están adiestrados, se pone á los combatientes uno en presencia de otro; pero teniendo cuidado de tenerlos atados, á fin de poder retirarlos á tiempo, pues luchan con tal ardimiento, que se matarian si se les dejase.

EL TURDOIDEO DE LE VAILLANT — PYCNONOTUS VAILLANTII

CARACTÉRES.—Este turdoideo es un poco mayor que el arsinoe: tiene el lomo mas claro; y la parte interior de las alas y de la rabadilla de un magnífico amarillo de azufre.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Las aves de esta especie habitan el Cabo de Buena Esperanza y la Arabia Petrea.

Se ha dicho y repetido á menudo que en España existia otro turdoideo perteneciente al mismo género, y que figuraba, por consiguiente, entre las aves europeas; pero mis investigaciones no han confirmado este aserto.

LOS TIMALIAS — TIMALIA

CARACTÉRES.—Se ha dado á estas aves el nombre vulgar de *tordos charlatanes*: tienen el pico corto, fuerte, comprimido lateralmente, de arista dorsal redondeada, que avanza entre las plumas de la frente; los tarsos y los dedos son gruesos, sobre todo el pulgar; las uñas fuertes; las alas cortas, muy redondeadas y obtusas, con la quinta y sexta pennas mas largas; la cola mediana y redondeada; rodean la base del pico varias sedas que forman un bigote.

EL TIMALIA DE TOCA — TIMALIA PILEATA

CARACTÉRES.—El timalia de toca, ó de cabeza roja, tiene el lomo de color pardo aceituna; los lados del cuello de un gris ceniciento; las alas y la cola rayadas de pardo rojo; la parte anterior de la cabeza y la region auricular blancas; la coronilla de un rojo de orin brillante; la garganta, el cuello y el pecho de un blanco puro; en la segunda de estas partes hay unas rayas muy finas longitudinales; el vientre es rojo pálido, con visos de un pardo aceituna en los lados; el ojo de un tinte rojizo sucio; el pico negro y las patas de color de carne. El ave mide 0^m18 de largo, el ala 0^m07 y la cola 0^m08 (fig. 233).

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave fué descubierta por Horsfield en Java; mas tarde la observaron otros naturalistas en el continente indio.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Horsfield trazó una corta descripcion del género de vida del ave, observando que el canto del macho se compone solo de las cinco notas *dó, re, mi, fa, sol*, repetidas muy regularmente y con cortos intervalos. Bernstein, algo mas esplicito, dice: «El timalia de toca vive apareado en las espesas breñas que rodean los bosques ó que crecen en el sitio ocupado antes por aquellos; es mucho mas comun en las montañas que en el llano, y rara vez abandona la espesura. Solo por la mañana se le puede ver en alguna rama desnuda de hoja, alisando y secando su plumaje, humedecido por el rocío; el mismo sitio ocupa el macho mientras que la hembra cubre; allí entona tambien su canto. En aquel momento tiene pendientes las alas, y parece insensible á todo cuanto le rodea. Cuando está excitado ó llama su atencion algo sospechoso, eriza las plumas de la cabeza, levanta la cola y la ensancha: su grito se parece hasta cierto punto al del gorrión.

» El nido se halla situado en un espeso matorral, á muy poca altura del suelo y no lejos del sitio donde se coloca el macho para cantar; se parece al del hortelano, y su escavacion es igualmente

profunda; está abierto comunmente por arriba; á veces tiene una abertura oblicua y lateral. Todos los nidos que yo encontré se componian tan solo de hojas de alang-alang, solo que las del interior eran mas finas y estaban mejor entrelazadas que las del exterior. La construccion es endeble; carece completamente de solidez, y por lo mismo es necesario levantar el nido con precaucion si se quiere evitar que se deshaga ó se altere su forma. Cada uno contiene dos ó tres huevos blancos, sembrados de puntos de un rojo pardo, mas ó menos intenso, mayores y mas compactos en la punta gruesa, donde forman una especie de corona. A veces presentan tambien



Fig. 234.—EL GARRULAXO DE CHINA

puntos de un gris ceniciento, mucho menos numerosos, pero mas profundos, es decir, que parecen estar en el interior de la cáscara y no en la superficie.»

LOS CRATEROPOS — CRATEROPUS

CARACTÉRES.—Estas aves tienen el cuerpo grueso; el pico fuerte, largo, comprimido lateralmente y algo encorvado; las patas robustas y de un largo regular; las uñas curvas y aceradas; las alas cortas y obtusas, con la cuarta penna mas desarrollada; la cola bastante larga, lijeramente cónica y de plumas anchas; el plumaje abundante y erectil, de colores poco vistosos.

EL CRATEROPO DE RABADILLA BLANCA — CRATEROPUS LEUCOPYGIUS

CARACTÉRES.—El crateropo de rabadilla blanca tiene el lomo de color pardo chocolate; la cabeza y la rabadilla blancas; el vientre gris pardo, con manchas semicirculares blancas; las pennas de las alas y de la cola cruzadas por rayas angostas y transversales de color oscuro; el ojo de un rojo carmin intenso; el pico negro y las patas grises. El ave mide 0^m38 de largo por 0^m37 de punta á punta de ala, la cola 0^m11 y el ala plegada 0^m12.

La hembra difiere solo del macho por ser algo mas pequeña. Los hijuelos tienen la cabeza gris azul con un filete claro en las plumas del lomo.

