

moelle. — Lésions récentes. — Lésions anciennes. — Intégrité des nerfs. — Etat graisseux et atrophique des muscles. — Arrêt de développement. — Déformation articulaire. — Symptomatologie. — Début brusque. — Localisation de la paralysie. — Abaissement de température. — Atrophie. — Déviation des membres, des articulations. — Etat général normal après les premiers jours. — Pas de paralysie de la vessie ni du rectum. — Marche. — Diagnostic différentiel : paralysies cérébro-médullaires; — Diphthéritiques; — Ephémères, d'origine musculaire; — Pseudo-hypertrophique. — Atrophie musculaire progressive. — Contractions hystériques et autres. — Coxalgie récente, ancienne. — Luxation congénitale. — Croissance. — Pronostic. — Etiologie. — Traitement suivant les périodes..... 326

## TABLE ANALYTIQUE

### A

ACIDE SALICYLIQUE. — dans l'angine couenneuse et diphthérique, 21.  
ACONIT. — matière médicale, 60; alcaloïdes contre-indiqués pour l'enfance, 61; action physiologique, 63-71; dans les fièvres éruptives; dans les affections spasmodiques et douloureuses, 68; tableau comparatif avec opium et belladone, 70-71.  
ADÉNITES CERVICALES. — pansement à l'emplâtre de cigüe, avec la pommade à l'extract de cigüe et à l'iodure de potassium, 79.  
ADÉNITES SCROFULEUSES. Cataplasmes et fomentations des feuilles de cigüe dans les —, 80.  
ADÉNOPATHIE BRONCHIQUE. Belladone dans l' —, 54.  
AFFECTIONS CONGESTIVES ET INFLAMMATOIRES. Mercure dans le traitement des —, 245-246.  
AFFECTIONS SQUAMEUSES. Pommade à l'oxyde rouge ou jaune de mercure dans les —, 244.  
ALCOOL. — dans la broncho-pneumonie, 15; — dans les bronchites, 13-15.  
ALCOOLATURE DE RACINES D'ACONIT. Dosage usuel, exceptions, 65-63; correctif de la belladone, 67.  
ALLAITEMENT. — *maternel*, 251-258; de la femme *multipare*, 251; de la femme *primipare*, 252; *contre-indications*: âge, 253; affections des divers appareils, maladies diathésiques, 253; conditions sociales, 255; état des seins, 256. — *par une nourrice*, choix d'une nourrice, 253-261; glande mammaire, 261; âge du lait, 261; qualité, 262;

— *Propriétés du lait*: physiques, 263, chimiques, 264-265; rapports avec l'alimentation, 265-267; la menstruation, 267, la grossesse, 267; les relations sexuelles, 268; les troubles de l'innervation, 268-269, l'âge du lait, 269, les maladies aiguës intercurrentes, 269; — *Hygiène de la nourrice*, 271; changement de nourrice, 272-273; — *Hygiène de l'enfant*. Rôle des pesées, 272-275; ration par 24 heures, 274; régime et soins, 275-279. Tableau de l'augmentation en poids, 279. — *Allaitement artificiel*, choix d'un lait, 283-284; conditions, adjuvants, moyens, 284-285. — *Allaitement mixte*, 285.  
AMYGDALE. Absès de l' — et son traitement, 19-21.  
ANÉMIE PALUSTRE. Quinquina, fer, arsenic dans l' —, 170.  
ANGINE diphthérique. Traitement de l' —, 21; contre-indications du mercure, 247. — *herpétique*. Traitement de l' —, 19. — *inflammatoire*. Traitement de l' —, 19. — *phlegmoneuse*. Traitement, 19. — *puillacée*. Traitement, 19.  
ANTIPYRINE. — dans la chorée, 143.  
ANTISPASMODIQUES. — dans les bronchites (aconit, kermès), 13.  
ARSÉNIATE DE FER. Doses, 123-126.  
ARSENIC. — dans les affections catarrhales chroniques des voies respiratoires, 19; tolérance des enfants pour l' —, 122; eaux minérales arsénicales de France (Mont-Dore, la Bourboule, Royat), 123; graduation des doses arsé-

nicales, 123; préparations pharmaceutiques, 123-126; arséniate de soude, son dosage, 124; contre-indication de l'arsenic au dessous de deux ans, 125;

— *action physiologique*, 126-130; — *indications* (dermatoses, tuberculose pulmonaire et maladies des voies respiratoires, cachexies, maladies paludéennes, névroses), 130-149.

ARTHRITES. — *chroniques*, topiques à la ciguë, immobilité, cautérisations ponctuées dans les —, 79. — *fonqueuses*, pommades à l'extrait de ciguë et à l'iode de potassium, emplâtre de ciguë dans les —, 79.

ARTHRITIDES. — moins accessibles que les dermatoses herpétiques à l'arsenic, 140.

B

BELLADONE. *Matière médicale* (formes, mixtures, pommades, liniments), formules magistrales, 45-47; tolérance des enfants pour la —, 47; élimination de la — par les urines, 48;

— *action physiologique*, antagoniste de l'opium, 50-53. Synergiques et antagonistes de la —, 53;

— *Indications et contre-indications*, 53-59; dans les bronchites quinteuses, la coqueluche, 54.

— *Tableau comparatif* avec opium et aconit, 70-71.

BITTER COMPOSÉ. — à la rhubarbe et au fer, 27.

BLÉPHARTES. Traitement général des —; pommade au bioiodure de mercure dans les —, 246-247.

BORIQUE (acide). — en lavage et irrigations dans le traitement de l'angine couenneuse et diphthérique, 21.

BROMHYDRATE DE CONICINE. Seul sel utilisable des alcaloïdes de la ciguë; dans les bronchites quinteuses, 73, — de quinine, 163.

BRONCHITE des grosses et moyennes bronches. Traitement par les vomitifs de la —, 13;

— *Bronchite capillaire*. Insuffisance de la méthode évacuante, 13; méthode de révulsion, 14; préparations alcooliques, 15;

— *Bronchite chronique*. Traitement de la —, 18;

— *Bronchites quinteuses, coqueluche*, opium ou codéine après deux ans avec belladone et aconit dans la —, 41; bromhydrate de conicine dans les —, 73.

BRONCHO-PNEUMONIE. Traitement de la —, 13.

C

CALOMEL. Préparations, doses, 26; *altérant*, 26; à la vapeur, préférable, 196;

— à l'intérieur, substances incompatibles, 195-196.

CATHARTIQUES (purgatifs), magnésie calcinée, citrate de magnésie, sel marin, sulfate de soude, crème de tartre, calomel, sené et rhubarbe, 25.

CHANCRE (*syphilitique* des adultes). Traitement local du —, traitement, 235.

— *phagédénique*, contre-indication du mercure dans le —, traitement tonique du —, 244.

CHLOROSE ET ANÉMIE. Préparations quiniques dans la — et dans l'—, 191.

CHORÉE. Emétique dans la —; bains de vapeur, ventouses sur le rachis, antispasmodiques dans la —, 24; traitement par l'arsenic, 143; traitement de l'auteur, 143.

CŒUR (*vices de conformation*). Persistance du trou de Botal, ouverture de la cloison interventriculaire, persistance du canal artériel, précipitation, irrégularité du pouls, cyanose; — Digitale dans les —, dosage, mode d'administration, 100, alternant avec scille, 115.

— *Irritation cardiaque, palpitations*, digitale, aconit et bromure, 101; — *hypertrophie* (croissance), révulsifs locaux, scille et digitale, 103; dans la 2<sup>e</sup> enfance, scille plutôt que digitale, 115.

— *Affections organiques* du —, petits vésicatoires volants, digitale, médication tonique, 105; massage et frictions stimulantes, 106.

— *Affections cardiaques de l'enfance* en général, 110.

— *Pathologie clinique des affections du cœur dans l'enfance*, résumé, 113-121.

— *Traitement des maladies infantiles du cœur*, résumé, 119-121.

CONGESTION HÉPATIQUE ET POLYCHOLIE. — dans la dyspepsie des nouveau-nés; diagnostic, 299.

CONVULSIONS (de la 1<sup>re</sup> enfance), manifestation de la fièvre intermittente avec les contractures, 183-185; — causées par la dyspepsie, 195; bains sinapisés, bromures dans les —, 24.

COPAHU ET CUBÈBE. — dans les angines couenneuses et diphthériques (formes, doses), 22.

COQUELUCHE. Sirop Desessarts dans la —, 5; traitement de la —, 16; café noir dans la —, 17; traitement des lésions consécutives de l'appareil respiratoire (emphysème pulmonaire, catarrhe, adénopathie bronchique) dans la —, 18; cure de Caunterets, 19; révulsion au croton-tiglion (crayon Limousin), 19.

CORYZA CHRONIQUE. — dans la syphilis congénitale, 218.

CRÈME DE TARTRE. — Seule ou associée, 26.

CROUP. — Indications et contre-indications des vomitifs dans le —, 12.

CROTON (Huile de —), 19.

D

DARTRES (infantiles). Traitement général des —, 141.

DENTITION. Dermatoses liées à la —, traitement des —, 323.

DERMATOSES. — *aiguës* et à poussées *subaiguës*, contre-indications de l'arsenic dans les —; indications étiologiques, alimentation déficiente, 311;

— *syphilitiques*, fumigations au cinabre dans les —, 195.

DESESSARTS. Sirop de —, 3; dans les toux spasmodiques, dans la coqueluche, 5.

DIARRHÉE. Régime diététique, fomentations chaudes, lavement d'amidon cuit, opiacés, dans la —, 39;

— *de la dentition*, doit être traitée, 40.

DIASCORDIUM. — dans la diarrhée chronique, potion avec laudanum et bismuth, 33.

DIGESTIF (maladies de l'appareil —), belladone dans les —, 57.

DIGITALE. Ses effets accumulés, 67 et 90.

— *Matière médicale, feuilles et poudre*, dose; *extrait* (pilules et potion); *teintures* alcoolique et éthérée; *sirop; digitaline*, ses dangers, surtout en granules, 90-92; aux préparations de —, 91.

— *action physiologique*, 92-99; nécessité de fractionner les doses, d'interrompre le traitement, élimination lente, 99, 104.

— *Indications* (cardiaques, fébrifuges et diurétiques), 100-108.

DOSES. Importance du fractionnement, de l'échelonnement des —, 2.

DOWER. Poudre de —, 3; dose suivant l'âge, 5.

DROSER. — Représenté à tort comme un spécifique des affections spasmodiques des voies respiratoires, 88.

DYSENTÉRIE VRAIE. — Très rare chez les enfants, 179.

— *dysentériques* (accidents) dans l'empoisonnement palustre chronique.

DYSPEPSIE DES NOUVEAU-NÉS. — intestinale, stomacale, gastro-intestinale, 290-291.

— *physiologie pathologique*, 291-292.

— *complications*, éruptions, accidents nerveux, 310-312.

— *traitement propre* de la — (estomac, intestin), 324-325.

E

EAUPHAGÉDÉNIQUE (noire, allemande), 194; (du Codex), 194.

Eaux-Bonnes. — Dans les suites de la coqueluche (adénopathie bronchique, 18; l'emphysème, 18-19; bronchite chronique, 18-19).

EMBARRAS GASTRIQUE. Vomitifs et purgatifs dans l'—, 23.

EMPHYSÈME PULMONAIRE. Traitement de l'— consécutif à la coqueluche, 18.

EMPLÂTRE de ciguë. Mode d'emploi, 75; dans la phtisie pulmonaire, 81.

— *de Vigo cum mercurio*. Préparation et emploi, 194.

ENDO-PÉRICARDITES. — traitées par la digitale, 102; pronostic atténué chez l'enfant; traitement au début par les révulsifs, puis par le calomel à dose fractionnée, la digitale et la scille, 116.

EPILEPSIE. Traitement par la belladone, 58.

ERUPTIONS CUTANÉES. — au-dessous de deux ans. Gourmes. Traitement des — sans arsenic, 131.

— après deux ans, dartres, arsenic, 139; érythème noueux, 140; eczéma chronique herpétique traité par l'arsenic à l'intérieur et la pommade d'oxyde rouge à l'extérieur, 243.

ERUPTION SCARLATIFORME de la belladone, 58.

EUCALYPTUS. — dans la diphthérie, 21.

EVACUANTE (méthode). — en général, 2-3.

EXTRAITS de la belladone. — alcoolique, — de suc dépuré (les plus usités);

— de semences, — de suc non dépuré, 46.

EXTRAITS (de ciguë). — alcoolique et de suc dépuré, deux bonnes préparations; dans les corps gras, usage externe, 75.

F

FAUX CROUP. Voir laryngite striduleuse.

FIÈVRES éruptives. Indications et contre-indications des vomitifs dans les —, 23; de l'opium dans les —, 42;

— fièvres intermittentes: jusqu'à deux ans, après deux ans, jusqu'à six ou huit ans; type irrégulier, fièvres pernicieuses; états fébriles symptomatiques, formes ataxiques; empoisonnement palustre. Traitement par le sulfate de quinine. Doses massives, ivresse quinique, 170-181.

FISSURE A L'ANUS. Traitement de la — par la belladone, 57.

FOWLER (Liquueur de —), 19.

G

GARGARISMES ÉMOLLIENTS, 19.

GOURMES. Y a-t-il une répercussion à craindre?

— Traitement des — par l'emmaillement dans le taffetas gommé ou la toile caoutchoutée, 132-137.

H

HÉMORRHAGIES. Manifestations lar-

vées de l'impaludisme traitées par le sulfate de quinine, 190.

HERPÈS labialis, 140; — zona, 140.

HERPÉTISME. Psoriasis capitis. Diagnostique avec le favus, 139.

HERPÉTIQUE. Traitement de l'angine —, 19.

HUILE d'amandes douces, associée à huile de ricin, purgatif des nouveau-nés, 25.

— de jusquiame composée ou baume tranquille. Sa composition, 84-85.

— de morue, dans les suites de la coqueluche, 19.

HYSTÉRIE NAISSANTE. Symptomatologie, diagnostic de P — avec le petit mal; traitement, 143-149.

I

ICHTYOSE. Son traitement, 141.

IMPALUDISME CHRONIQUE. Traitement par l'arsenic, avec hydrothérapie, 142.

INCONTINENCE D'URINE. Son traitement par la belladone, 57.

IODE. Coton iodé, 19.

IPÉCACUANHA. Poudre, sirop, préparations composées, poudre (dose), 3, 4, 5.

— action physiologique, hyposthénisante, excitatrice de la sécrétion glandulaire, 7.

J

JUSQUIAME. Matière médicale (teinture, extrait, huile simple ou composée), son alcaloïde, l'hyoscyamine, contre-indiquée pour l'enfant, 83-84;

— action physiologique, 85-86.

— indications: correctif de la belladone, 86-87.

K

KÉRATO-CONJONCTIVITE. — traitée par le sulfate de quinine, 50.

KERMÈS minéral et oxyde blanc d'antimoine. — contre-indiqués tous deux dans la pneumonie des enfants, 16.

L

LARYNGITE (traitement par les vomitifs de la —) simple, légère, 8, intense, 9, striduleuse ou faux croup, 11, croup, 12.

— Traitement de la laryngite striduleuse par la belladone, 53.

LAUDANUM DE SYDENHAM. Doses, mode d'administration, 31-32.

LAVEMENT PURGATIF du Codex; — modifié, 26.

LAXATIFS (purgatifs), purgeant par indigestion (manne, mannite, huile de ricin, d'amandes douces, tamarin, podophyllin, sirop de fleurs de pêcher, pruneaux, sirop de chicorée), 25.

LICHEN INFANTILE. — associé au prurigo, 139.

LIENTÉRIE. Traitement de la — par les eupéptiques, les laxatifs, le bon régime, 40.

LINIMENT CALMANT, à la jusquiame, formule, 85.

LIQUEUR DE VAN SWIETEN. — dans la syphilis infantile, 232.

LUPUS scrofuleux. Traitement général du —; emploi du biiodure de mercure, 244.

— syphilitique, traité par le nitrate acide de mercure et la pommade biiodurée, 244.

M

MAGNÉSIE CALCINÉE (de Manchester. Henry). Doses, mode d'administration; citrate de —, doses, formes, 25.

MANNE, MANNITE. Doses, formes et mode d'administration; — associée au calomel, 25.

MÉNIÈRE (Maladie de —). Traitement de la — par le sulfure de quinine, 188-189.

MÉNINGITE TUBERCULEUSE des enfants. Traitement général de la —, 246; traitement mercuriel de la —, 246.

MÉNINGITIFORMES. Des manifestations — dans la fièvre intermittente chez les enfants, 183-185.

MENSTRUATION. Traitement des douleurs dans l'établissement de la — par la belladone, 57.

MERCURE. Oxydes de —; protoxyde (noir); bioxyde (rouge), 194;

— Sulfures de —: protosulfure (peu employé); bisulfure (cinabre), en fumigations, 195;

— Chlorures de —: protochlorure (calomel); bichlorure (sublimé corrosif), préparation et mode d'emploi des —, 195-197;

— Iodures de —: protoiodure (en

pilules), pour les adultes; biiodure (sirop de Gibert) pour l'enfance, 197;

— Nitrate acide de — (onguent citrin), 198; doit être manié avec précaution comme caustique, 199.

ACTION PHYSIOLOGIQUE du — locale, 204, sur la muqueuse des voies digestives, 202; pénétrante, 203; débilitante chez l'homme sain, reconstituante chez le malade; — sur le foie, 207; sur l'appareil uropoïétique, 208; sur la peau (eczéma mercuriel), 208; voies d'élimination, hydrargyrie aiguë (stomatite mercurielle), hydrargyrie chronique (intoxication professionnelle), 209-212; — sur les appareils digestifs; de l'innervation, 213.

USAGES du — et de ses dérivés, 214-215.

INDICATIONS du — contre la syphilis, 214-215.

MERCURIELLE (Médication). Revendication de sa haute valeur pour le traitement de la syphilis, 192-193; 214-215.

MERCURIELLES (Préparations), 193-200; dosage et mode d'emploi des —, 198-199; usages externes, 199.

MONT-DORE (Eau du). — dans les affections catarrhales chroniques des voies respiratoires; dans les suites de la coqueluche, 18-19.

MORPHINE en injections hypodermiques. Usage de la — à doses réduites, dans l'asthénie, l'asthme cardiaque chez les enfants de 8 à 12 ans, 34.

N

NARCISSE DES PRÉS. Infusion de — employée comme vomitif, 5-6.

NERVEUSES (Affections). Hystérie des petites filles. Traitement général de P —, 40, 43, 143-149.

NÉVRALGIES. — traitées par le sulfate de quinine, 188.

NÉVROSES. — Chorée, son traitement par le sirop diacode ou de codéine (après 5 ans), 43.

NOUVEAU-NÉS. Constipation des —. Traitement de la — 312.

NOUVEAU-NÉS (DYSPEPSIE des —). — Symptomatologie, 292-295;

— Étiologie: Ingesta, allaitement, 296-298; circumfusa et applicata,



BIBLIOTECA 1000515

299; *hernies* inguinales, ombilicales, testicule arrêté dans l'anneau, 300; *système nerveux*, 300; rôle des odeurs, 301-302; *empoisonnement* par les narcotiques, 303; *syphilis congénitale*, 304; *impaluisme*, 304; *médication intempesitive* (purgatifs, huile de morue), 304; *anémie*, *rachitisme*, air vicié, 305; *période prodromique des maladies aiguës*, 305.  
 — *Diagnostic*, 305-306: avec l'embaras gastrique, 306-307; avec l'entérite et la gastro-entérite, 307; *étiologique*, 308-310.  
 — *Pronostic*, 310.  
 — *Traitement*, 312-313.  
 NOYER (Eau de feuilles de —), 21.

O

OCULAIRE, maladies du globe. Belladone dans les —, 58.  
 ONGUENTS. — *napolitain belladoné*, 47, 194; à l'opium, à la ciguë, 194; — en frictions dans la syphilis infantile, 232; — en onctions contre les oxyures, 242.  
 — *populeum* (jusquiame), 84.  
 OPIUM. *Matière médicale* (extrait thébaïque; sirop thébaïque, — de Karabé; laudanums; morphine, exclue de la thérapeutique infantile), 34; *action physiologique* de l' —, 35-38; *indications et contre-indications*, 38-44. — Médication opiacée chez les tous jeunes enfants, 43-44; pour l'enfance en général, 303-304.  
 — *Tableau comparatif* de ses propriétés avec belladone et aconit, 70-71.  
 OSTÉOPÉRIOSTITE. De P — comme cause de boiterie; son diagnostic, 341.  
 OXYURES. Traitement des —, 242.  
 OZÈNE (scrofuleux ou syphilitique). Traitement de l' —; traitement de P — syphilitique par les lotions au sublimé et le sirop de Gibert, 248.

P

PALPITATIONS chlorotiques. Diagnostic des —, 102;  
 — nerveuses de la chlorose; contre-indication de la digitale dans les —, 102.  
 PARALYSIE INFANTILE. (Spinale, atro-

phique): *historique*, 376; *lésions*, 327; *symptômes*, 329; symptômes anormaux (convulsions, diarrhée intense, érythème scarlatiniforme), 330-331; localisation dans la —, 332; insensibilité absolue aux courants faradiques et momentanée aux courants voltaïques dans la —, 332; abaissement de la température, circulation déficiente, 333; — *pronostic*, 333; — diagnostic, 334-346; avec les paralysies cérébrales ou médullaires, 335; avec la paralysie diphthérique, 336; les paralysies éphémère, 337, amyotrophique, 337, pseudo-hypertrophique, 339, hystérique, 341;  
 — *étiologie*, 346-347;  
 — *traitement*: période initiale, 347-348; période d'état, 348; période des difformités, 349.  
 PARASITAIRES (Affections). Traitement des — par le mercure, 241.  
 PASTILLES. Ipécaouanha en — (vomitif), dans les bronchites spasmodiques, 5.  
 PAVOTS. Décoction de têtes de —, préparation infidèle, 30.  
 PEARSON. Liqueur de —, 124.  
 PEAU. Lotions de sublimé dans les maladies de la —, 243.  
 PEMPHIGUS. — dans la syphilis congénitale des nouveau-nés, 216-217.  
 PERCHLORURE DE FER. — dans le traitement de l'angine couenneuse et diphthérique, 22.  
 PÉRICARDITE. — Unie presque toujours à l'endocardite chez les enfants; signes physiques de la —; diagnostic de la — avec l'insuffisance aortique, 140.  
 PÉRITONITE. Traitement général et mercuriel de la —, 246.  
 PHELLANDRIE. Sans propriétés, 87.  
 PHÉNOL, 21.  
 PHOSPHATE DE CHAUX. — dans les affections chroniques des voies respiratoires, 19.  
 PILULES. — d'extrait et de poudre de digitale, 92.  
 PITHYRIASIS INFANTILE, 139; — versicolor traité par le sublimé, 242.  
 PLAQUES MUQUEUSES. Traitement des —, 237.  
 PLEURÉSIE. Traitement diurétique avec la digitale, associée à la scille de la —, 107;  
 — *aiguë* franche. Traitement de la

— dans le plus grand nombre des cas, 107.  
 PNEUMONIE. Traitement de la —; contre-indication des vomitifs, 15; limites de l'administration de la digitale dans la —, 106.  
 PODOPHYLLIN (purgatif). Formes pharmaceutiques du —, 25.  
 POLYGALA, 3; tisane de — dans les bronchites quinteuses, 6.  
 OSOLOGIE. Importance exceptionnelle de la — dans la thérapeutique infantile, 1-2.  
 POTIONS calmantes (kermès, belladone, aconit). Emploi des — dans la coqueluche.  
 POUDRE de Dover, 5.  
 — de feuilles ou de racines de belladone, 46; — de digitale, 90.  
 PRURIGINEUSES (Affections). Lotions de sublimé dans les —, 243.  
 PURGATIFS. Matière médicale, 24; indications, 27-28.  
 PURGATIVES. Eaux minérales peu acceptées par les enfants, 26.

Q

QUININE (Sulfate de), 150; sa découverte, 152; son mode d'administration, 159, 469-472; préparations titrées au tolu ou à la glycérine pour la garde, 160; en lavements, 160-161; en injections hypodermiques, 161-162; en injections dans la trachée, 162; en insufflations, 162; bromhydrate, lactate, tannate, tartrate, valériannate de quinine, 163; dosage du sulf. de q. suivant l'âge, 163-164; effets sur la peau intacte ou dépourvue de son épithélium, 165.  
 QUINQUINA. Emploi prématuré des préparations de — chez le nouveau-né, chez les fillettes de 5 à 10 ans, 150-151; *préparations pharmaceutiques*, 152; *sortes*, 153-154; *richesse* en alcaloïdes, 154; poudres, usages et formules, 154-155; extrait aqueux, 155; quinium, 155-156; sirop de quinquina, 156; vins, bière de —, 156-157; — pas au-dessous de deux ans, 157; teinture, 158; *action physiologique*, 165-169; *indications*, dans l'intoxication palustre chronique, 172; dans les affections cardiaques, 190; dans les palpitations, 190.  
 — abus de la médication quinique


chez les enfants de tout âge, 191.

R

RÉVULSIFS. — dans la bronchopneumonie, 14; — dans les affections catarrhales chroniques des voies respiratoires, 19.  
 RHUMATISME. Maniement prudent du salicylate de soude, du sulfate de quinine, de la digitale et de l'opium dans le — chez les enfants, 109; fortes doses de sulfate de quinine contre-indiquées dans le —, 189.

S

SALICYLIQUE (Acide). — dans la diphthérie, 21.  
 SCILLE. Matière médicale, 111; dosage, 111; effets physiologiques, 111-112; indications, 112.  
 SCROFULEUSES (Adénites). Ciguë à l'intérieur dans les —, 80.  
 SEL. — marin en lavements, 26.  
 SÉNÉ. Follicules de —, 27.  
 SEVRAGE. — prématuré, ses dangers, 280-283; ne doit être ni prématuré ni brusque, 285-289; — combattu par la propagation de l'allaitement artificiel, illusions de cette théorie, 281-282.  
 SIROP de Desessarts, 5; de *codéine*, réservé aux enfants au-dessus de deux ans, 32-33; — *diacode*, moins actif que le sirop d'opium, plus que le sirop de codéine; doses, 34;  
 — de *belladone*, dosage, usages, 49;  
 — de *digitale*, fait avec la teinture alcoolique, 91;  
 — de *Gibert*, dans la syphilis infantile, doses, 199, 233.  
 SPASME DE LA GLOTTE, 54.  
 STOMATITE mercurielle, — pierre de touche du traitement dans la syphilis des enfants et des adultes, 239.  
 SUBLIMÉ. Bains de — dans la syphilis infantile, 233.  
 SUEURS PROFUSES. Atropine dans les —, 59.  
 SULFATE DE CUIVRE. — comme vomitif, 7, 8.  
 SYPHILIS INFANTILE. — *acquise*, 215; — *héréditaire, congénitale*, cause fréquente d'avortement, 216; symptômes: peau et muqueuses,



1030000228

