

nouveau obliquement 10, 11, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminiez le bandage par quelques circulaires autour du tronc avec le chef terminal 29. 26 et 28 indiquent les deux derniers obliques du bandage.

**9. T de l'aine (bandage inguinal ou triangulaire de l'aine)**  
[fig. 225].

Ce bandage sert pour maintenir des pansements peu compliqués sur la région de l'aine; il est très-suffisant lorsque le malade reste couché.

Prenez une pièce de linge en forme de trapèze, *c, d, e, f*, et cousez aux deux angles supérieurs du linge *c, d*, deux bandes de quatre centimètres de largeur, l'une d'une longueur de deux mètres, l'autre de trois. Cousez une bande *g, g*, d'un mètre environ de longueur, sur quatre centimètres de largeur, au bord inférieur de la pièce de linge.




FIG. 225. — T de l'aine.

Placez le bord supérieur de la pièce au-dessus de l'aine, conduisez la bande *a 1* au-dessus de la crête iliaque du côté opposé, en contournant la partie postérieure du tronc, et ramenez-la à son point de départ, dans le sens de la flèche *a 2*. Prenez la bande *b 1*, faites-la passer au-dessus du grand trochanter et contournez la partie postérieure des fesses obliquement en bas et en dehors, vers la cuisse opposée, que vous contournez dans le sens de *b 2*, pour la ramener au-dessous des fesses, puis sur le côté, où vous ferez un nœud *a 3, b 3*, avec la première bande. Roulez la bande inférieure *g 1, g 2*, autour de la cuisse, et assujettissez par des épingles, en avant et en arrière, la bande oblique *b 2*.

**10. Triangle-bonnet du sein (fig. 226).**

Ce bandage *plein* rend de grands services pour maintenir les pansements sur le sein, ou bien comme *suspensoir*.

Prenez un linge triangulaire ayant un mètre de base et mesurant cinquante centimètres du sommet à la base.



FIG. 226. — Triangle-bonnet du sein.

Placez obliquement la base du triangle 1 sous le sein malade, faites passer l'un des bouts sous l'aisselle du côté malade, et l'autre 2 sur l'épaule du côté sain; nouez les deux bouts en arrière; relevez le sommet du triangle 3 au-devant de la mamelle, faites-le passer sur l'épaule, et fixez-le en arrière avec les autres extrémités.

**11. Cravate inguinale ou cruro-pelvienne (fig. 227).**

Autre bandage très-commode pour les pansements de l'une des aines.

Prenez un linge en forme de cravate, long d'un mètre et demi.

Placez le plein *a* de la cravate obliquement sur l'aine, dirigez l'un des

bouts *b* en haut et en dehors, vers l'épine iliaque, et contournez la partie supérieure des fesses; portez l'autre bout *b'*, *b'*, en dehors de la cuisse




FIG. 227. — Cravate inguinale.

que vous contournez en arrière, et ramenez-le obliquement sur l'aîne en sens inverse, pour faire un nœud sur le côté.

**12. Triangle coxo-pelvien, ou triangle-bonnet de la fesse (fig. 228).**

Bandage commode et très-suffisant pour maintenir un vésicatoire, un cataplasme, etc., sur la fesse ou la hanche.




FIG. 228. — Triangle-bonnet de la fesse.

Prenez un linge en forme de cravate, d'un mètre et demi de longueur,

et un autre, triangulaire, d'un mètre de longueur, mesurant cinquante centimètres du sommet à la base.

Fixez la cravate 6, 6, autour de la ceinture, et faites un nœud. Placez le milieu de la base du triangle 1 sur la racine de la cuisse, faites passer les bouts 2, 2, en avant, croisez-les et ramenez-les en arrière 3, 3, pour faire un nœud. Dirigez en haut le plein 4 du triangle dans le sens de la flèche, faites passer le sommet sous la ceinture, et rabattez-le, 5, pour le fixer avec une épingle.

**13. Spiral d'un doigt (fig. 229).**

Bandage destiné à exercer la compression et à maintenir des pansements autour d'un doigt.

Prenez une bande d'un mètre et demi, mesurant deux centimètres de largeur.




FIG. 229. — Spiral d'un doigt.

Faites deux ou trois circulaires 1, 2, autour du poignet, en laissant libre un bout suffisant du chef initial pour faire le nœud. Ramenez obliquement la bande 3 sur le dos de la main, arrivez à la racine du doigt, et contournez-le par une spirale pour arriver à son extrémité libre 4.

Remontez alors vers la base du doigt, en décrivant des *doloires* de 5 à 11 dans le sens des flèches. Arrivez à la base du doigt, remontez obliquement sur le dos de la main en 12, en croisant la bande 3, et revenez sur le côté opposé du poignet en 13, pour faire le nœud 14.

**14. Gantelet (spiral de tous les doigts) [fig. 230].**

On emploie ce bandage lorsqu'on veut empêcher une adhérence vicieuse des doigts, dans le cas de brûlure, par exemple; on l'emploie aussi dans les fractures et les luxations des phalanges; enfin on s'en sert

pour empêcher le gonflement des doigts, lorsque l'avant-bras ou le bras est serré par quelque bandage.

Prenez une bande de dix mètres de longueur, sur deux centimètres de largeur.

Laissez pendre un bout de la bande pour faire plus tard le nœud, et faites deux ou trois circulaires autour du poignet. Descendez obliquement en 4 sur la face dorsale de la main, pour gagner la racine du petit doigt, que vous contournez par une ou deux spirales jusqu'à son som-




FIG. 230. — Gantelet.

met 5. Comme dans le bandage précédent, remontez vers la base du petit doigt, en décrivant des doloires de 6 à 14, dans le sens des flèches. De la racine du petit doigt remontez obliquement sur la face dorsale de la main en 15, et croisez la face palmaire, pour regagner le bord radial et descendre de nouveau en 16 sur la face dorsale, vers la racine de l'annulaire. Comme pour le petit doigt, gagnez en spirale le point 17, et suivez le sens des flèches, pour remonter en faisant des doloires de 18 à 26. Comme précédemment, passez sur la face dorsale de la main en 27; passez à la face palmaire, gagnez 28 le bord radial de la main, redescendez vers la racine du médius, et comportez-vous exactement comme sur les autres doigts; remontez de nouveau en 40 sur la face dorsale, revenez en 41 sur le bord radial, comportez-vous de même au niveau de l'index, et remontez en 52. Il faut alors venir gagner la base du pouce en 53, en passant sur la face palmaire de la main, se comporter sur le pouce comme sur les autres doigts, et, après avoir fait le dernier doloire 59, remonter en 60, passer devant le poignet et venir en 61 pour faire le nœud 62.

**15. Huit du pouce et du poignet (spica du pouce) [fig. 231].**

Excellent bandage pour les lésions de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, pour l'immobilisation de l'articulation, etc. Il vaut mieux généralement faire un spica ascendant.

Prenez une bande de deux mètres de longueur, sur deux centimètres de largeur.




FIG. 231. — Spica du pouce.

Laissez pendre un bout de bande pour faire le nœud, et fixez-la autour du poignet par deux circulaires horizontaux 2, 3. De 3 portez obliquement la bande sur la face palmaire de la main, vers le bord cubital, et descendez en 4 sur la face dorsale, pour gagner le bord externe du pouce en 5, et le contourner en 6 pour remonter obliquement sur sa face dorsale en 7, et gagner de nouveau le bord cubital de la main en 8, en passant sur la face palmaire. Recommencez le même système, c'est-à-dire descendez obliquement de 8 en 9, contournez la partie antérieure du pouce de 9 en 10, remontez obliquement en arrière du pouce de 10 en 11, et regagnez 12, pour continuer jusqu'à la fin du bandage. De la sorte, vous descendrez en dernier lieu de 23 en 24, pour revenir à 25 et terminer en 26 faire le nœud.

**16. Huit extenseur de la main sur l'avant-bras (fig. 232).**

Ce bandage est employé pour éviter la flexion de la main par suite de rétraction des cicatrices, surtout dans les brûlures.

Prenez une bande roulée à deux globes, de sept mètres de longueur, sur quatre de largeur.

Placez la main dans l'extension, appliquez le plein de la bande 1 sur la face dorsale, ramenez les deux globes sur la face palmaire, entrecroisez-les en les changeant de main, ramenez-les à la face dorsale de la main en sens inverse 2, 2, passez de nouveau sur la face palmaire, et gagnez avec les deux globes la face dorsale de l'avant-bras, où vous entrecroiserez les deux bandes 3, 3, pour arriver au bras immédiatement au-dessus de l'épitrôchlée et de l'épicondyle. Arrivé là, faites les circu-




FIG. 232. — Huit extenseur de la main sur l'avant-bras.

lares 4, 4, avec les deux bandes, et redescendez sur la face dorsale de l'avant-bras en 5, 5, pour entrecroiser de nouveau les deux globes à la face palmaire de la main, et pour fixer les deux chefs sur la face dorsale de la main ou sur tout autre point, si la bande est plus longue.

**17. Grand plein oblique du bras et de la poitrine (grande écharpe) [fig. 233].**

Bandage destiné à soutenir le bras et l'avant-bras dans diverses lésions.

Prenez une pièce de linge d'un mètre carré et pliez-la en triangle. Fléchissez l'avant-bras, placez la base 1 du triangle sous la main et faites-en monter les deux extrémités, l'une en arrière de la poitrine, l'autre en

avant 2, pour les nouer sur l'épaule du côté opposé. Prenez le sommet du triangle, embrassez le bras et le coude avec le plein du linge, et ramenez




FIG. 233. — Grande écharpe.

ce sommet 3 au-devant de la poitrine, pour le fixer avec une épingle.

**18. — T perforé de la main (fig. 234 et 235).**

Prenez une pièce de linge 3, 4, de trente centimètres de haut, sur dix centimètres de large; vers le milieu du grand diamètre, percez-y cinq




FIG. 234. — T perforé de la main, avant l'application.

trous qui serviront à laisser passer les doigts; cousez à l'extrémité 2 du linge une bande 1, 1, de cinquante centimètres.

Pour appliquer ce bandage, faites passer les doigts dans les trous du linge, appliquez le milieu de la bande sur le dos du poignet et l'autre extrémité du linge sur la face antérieure, et fixez le tout par deux ou trois circulaires et un nœud.



FIG. 235. — T perforé de la main, après son application.

1, 2, 3. Circulaires et nœud.—  
4, 4. Les deux angles de l'extrémité de la pièce de linge, qui a été ramenée en avant de la main.

Ce bandage, qui peut servir à maintenir les pansements sur la main, ressemble à une mitaine lorsqu'il est appliqué.

#### 19. Huit postérieur du genou (fig. 236).

Bandage servant à maintenir les pansements dans la région du creux poplité, et pouvant servir à la compression d'un anévrysme.




FIG. 236. — Huit postérieur du genou.

Prenez une bande de quatre mètres de longueur, sur cinq centimètres de largeur, placez le chef initial 1 au-dessus du genou, faites un circu-

laire horizontal 2, et descendez obliquement en 3, vers le creux poplité, pour faire un circulaire au-dessous du genou, en passant en avant, puis en arrière, dans le sens de la flèche. Remontez obliquement en arrière en 5, faites un demi-circulaire horizontal au-dessous de la rotule, descendez de nouveau obliquement en 6, faites un demi-circulaire horizontal au-dessous du genou, et remontez obliquement en 7, pour terminer le bandage 6 au-dessus du genou par des circulaires horizontaux.

#### 20. Triangle-bonnet du moignon des amputés (fig. 237).

Ce bandage est excellent dans le pansement des amputations et peut remplacer avantageusement les bandes, qui ne servent qu'à comprimer douloureusement les moignons.

Prenez une pièce de linge triangulaire ayant un mètre à la base et cinquante centimètres du milieu de la base au sommet.




FIG. 237. — Triangle-bonnet des moignons.

Placez le milieu de la base 1 du triangle sur la face postérieure du membre, à une certaine distance du moignon, portez les deux extrémités en arrière dans la direction de 2, 3, et ramenez-les en avant en 2', 3', où vous les fixerez avec une épingle.

Prenez le sommet du triangle, recouvrez le pansement du moignon, et fixez-le en avant avec une épingle. On peut maintenir ce bandage avec un cordon attaché au tronc, lorsqu'on craint qu'il ne glisse.