

Dése la leche, á condición de que la neurosis pertenezca á la clase de las *hiperclorhídricas*. La leche no produce buenos efectos en las *anaclorhidrias* ni en las *hipoclorhidrias*.

Hayem.

Neurosis dolorosas del tubo digestivo.— Están en ellas particularmente indicadas las preparaciones de opio solas ó asociadas á la cocaína.

NEUROSISMO

Julio Simón.

Neurosismo de las jóvenes.—Prescribáse:

Tintura de colombo.	10 gramos.	
— de belladona.		} aa. 4 —
Elixir paregórico.		

M.—5 á 10 gotas en las comidas.

Huchard.

Tartrato férricopotásico.	10 gramos.	
Extracto de valeriana.	8 —	
Polvo de castóreo.	2 —	
Esencia de menta.		} aa. x gotas.
— de anís.		

M. para 100 píldoras. Dos en cada comida.

OFTALMÍA SIMPÁTICA

Panas.

Es necesario no oponerse al desenvolvimiento de la oftalmía simpática por medio de la sección ó resección del nervio óptico, ya sea solas ó com-

binadas con la de los vasos y nervios ciliares, porque todas estas operaciones exponen á un hematoma de la órbita y á una exoftalmía tan grande que produzca la meningitis y la muerte como consecuencia.

Por todas estas razones conviene ser fiel á la enucleación, que está reputada como un medio preservativo por excelencia contra la oftalmía simpática. Practicada antisépticamente, la enucleación constituye una de las operaciones más inofensivas para el enfermo.

No quiere esto decir que el tratamiento quirúrgico sea el único ni que sea siempre aplicable.

Una vez desenvuelta la oftalmía simpática, hay poca esperanza de dominarla con la enucleación.

En semejante caso me ha dado excelentes resultados el tratamiento hidrargírico intensivo, particularmente las fricciones y las inyecciones hipodérmicas de mercurio.

Abadie.

Inyecciones intravasculares de una gota de sublimado (solución acuosa al 1 por 1.000) en el ojo simpaticizante y en el ojo simpaticizado.

Combinense las inyecciones con la cauterización ígnea, por medio del termocauterio, del conducto de la herida.

ONOMATOMANÍA

Charcot y Magnan.

La onomatomanía no es incurable.

La primera indicación es la de apartar al sujeto de su medio ambiente habitual; el aislamiento

en un establecimiento especial no presenta más que ventajas, que es donde la autoridad moral del médico adquiere toda su influencia sobre los desequilibrados.

La hidroterapia presta servicios.

ORINA TÓXICA EN LOS EPILÉPTICOS ENAJENADOS

Seglas.

La terapéutica somática, que da buenos resultados, es la que atiende á mejorar la nutrición.

Las emisiones sanguíneas, los purgantes, los sudoríficos y diuréticos que antiguamente se empleaban son acaso útiles, porque favorecen la eliminación del veneno.

La antisepsia gastrointestinal es igualmente digna de ser empleada.

PALPITACIONES NERVIOSAS

Peter.

La digital, que alivia momentáneamente, aumenta más tarde las palpitations, por esto no debe prescribirse.

En los anémicos, dense los tónicos:

N.º 1. Valerianato de amoniaco.

De 3 á 4 cápsulas cada día.

N.º 2. Bromuro potásico. 4 gramos.

Agua. 40 —

Jarabe de corteza de naranja. 100 —

A cucharadas durante el día.

Gingcot.

Liciones frías en la región precordial. Hágase uso de una compresa doblada; empátese en agua fría, y después de exprimida para privarla del exceso de líquido, aplíquese en la región precordial y cúbrase en seguida con otra no humedecida; manténgase aplicada mientras esté fría.

Pulverizaciones etéreas en la indicada región.

Quinquaud.

Fumigaciones en las extremidades superiores dos veces al día.

Puntas de fuego y vejigatorios en el trayecto de los nervios.

Brocq.

I. TRATAMIENTO EXTERNO.—Envoltura de los dedos, sobre los cuales se aplica un linimento de láudano ó de cloroformo.

Aplicaciones irritantes en la región cervical y en el trayecto de los nervios.

II. TRATAMIENTO INTERNO. — Valerianato de amoniaco y de quinina.

PAQUIMENINGITIS

Charcot.

Paquimeningitis hipertrófica. — La paquimeningitis cervical hipertrófica no es incurable; puede curarse la paraplegia que determina, aunque sea muy acentuada y aunque se acompañe de flexión de la pierna sobre el muslo.