

jour à l'autre; et cette extrême mobilité des signes fournis par l'auscultation, jointe à la fixité de ceux que donne la percussion, est un élément important du diagnostic.

L'absence de matité permet d'ailleurs de différencier le souffle de l'adénopathie du souffle trachéo-bronchique qu'on entend à la première pièce du sternum chez certains vieillards, et de la respiration soufflante que l'on entend dans la région interscapulaire chez les jeunes enfants maigres.

La matité et le souffle bronchique dus à l'adénopathie peuvent être attribués à une induration pulmonaire d'un ou des deux sommets. Dans le premier cas, la matité augmente du moignon de l'épaule vers la colonne vertébrale, le souffle s'entend en ce dernier point seulement; dans le second, la matité augmente de la colonne vertébrale vers le moignon de l'épaule, le souffle s'entend aussi bien en dehors qu'en dedans. Mais il ne faut pas oublier que la tuberculose pulmonaire et la tuberculose ganglionnaire sont souvent associées, et qu'on doit toujours rechercher l'une quand l'auscultation révèle l'autre.

Les signes fonctionnels et les signes physiques sont sensiblement les mêmes dans l'adénopathie bronchique et dans les tumeurs du médiastin; mais les considérations tirées de l'âge du sujet, de l'examen complet de la poitrine et des autres organes, de l'évolution de la maladie permettent d'arriver à faire le diagnostic.

Certains signes fonctionnels seuls rapprochant l'adénopathie du croup, de la laryngite striduleuse, de l'asthme nerveux rare chez les enfants, de la coqueluche, maladie épidémique et contagieuse, de la trachéo-bronchite, etc., on peut dire que le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique est « relativement facile, et qu'il suffit d'y penser pour éviter une grosse erreur » (Cadet de Gassicourt). La coexistence d'adénopathies cervicales sera parfois un indice qui mettra sur la voie du diagnostic.

Enfin les conditions dans lesquelles apparaît cette affection établiront suffisamment, dans la majorité des cas, la nature tuberculeuse des lésions ganglionnaires.

Traitement. — Les règles du traitement général de la tuberculose sont en tous points applicables à la phtisie bronchique; mais l'arsenic, le sirop d'iodure de fer, l'huile de foie de morue, l'hydrothérapie, le séjour au bord de la mer trouvent plus particulièrement leur indication dans cette forme de tuberculose torpide, d'ancienne scrofule interne.

Des révulsions répétées à la teinture d'iode, des onctions à la pommade iodurée seront faites aux régions sternale et interscapulaire.

La toux, la dyspnée, les accès de suffocation étant sous la dépen-

dance directe d'une lésion organique, il sera bien difficile d'arriver à les calmer.

Contre la toux on emploiera les préparations de belladone, de jusquiame, d'opium, le chloral, et surtout chez les enfants l'extrait de ciguë à la dose de 2 à 10 centigrammes, suivant l'âge, ou l'extrait de laitue vireuse à la dose de 2 à 5 centigrammes.

Contre les accès dyspnéiques on emploiera, sans grande chance de succès, il est vrai, des lavements d'asa fœtida, de valériane, des potions narcotiques, le bromure de potassium, des inhalations de pyridine, d'iodure d'éthyle, et, s'il est nécessaire, des injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine.

La dyspnée permanente sera combattue encore par les mêmes moyens, dont le seul effet sera souvent d'adoucir les derniers moments du malade.

JULES RENAULT.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. UANL

FORMULAIRE

DES

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

SYMPTÔMES COMMUNS A DIVERSES MALADIES

DOULEUR

Traitement externe :

Réulsion. — Ventouses, sèches ou scarifiées; sinapismes, vésicatoires, mouches de Milan, emplâtre de thapsia, teinture d'iode, teinture d'iode morphinée :

Chlorhydrate de morphine 0,50 centigr.
Teinture d'iode..... 15 grammes.
F. dissoudre.

Chlorure de méthyle en pulvérisations.

Frictions avec le liniment suivant :

Chloroforme 10 grammes.
Baume tranquille..... } *aa* 50 gram.
Huile camphrée..... }
M.

Oncions avec la pommade suivante :

Chlorhydrate de cocaïne. 0,50 centigr.
Menthol 3 grammes.
Vaseline..... 30 —
F. s. a.

Badigeonnages sur les muqueuses (fosses nasales, larynx) avec l'une des solutions suivantes :

Chlorhydrate de cocaïne. 1 gramme.
Eau distillée bouillie.... 10 grammes.
F. s. a.

Chlorhydrate de cocaïne. 1 gramme.
Glycérine..... 10 grammes.
F. s. a.

Traitement interne :

Opium. — Sirop d'opium (Codex) dont une cuillerée à bouche (20 grammes) contient 4 centigrammes d'extrait d'opium. Dose: 1 à 2 cuillerées à bouche par jour.

Pilules d'opium :

Extrait d'opium 0,05 centigr.
Poudre de réglisse..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 10.
1 à 2 pilules par jour.

Morphine. — Sirop de morphine (Codex) dont une cuillerée à bouche (20 grammes) contient 1 centigramme de chlorhydrate de morphine. Dose: 1 à 3 cuillerées à bouche par jour.

Pilules de morphine :

Chlorhydrate de morphine.....	0,01 centigr.
Poudre de guimauve....	0,02 —
Sirop de gomme.....	q. s.

Pour 1 pilule. — N° 20.
1 à 3 pilules par jour.

Injection hypodermique :

Chlorhydrate de morphine.....	0,10 centigr.
Eau distillée bouillie....	10 grammes.

F. s. a. — Une seringue de Pravaz ou 1 centimètre cube de cette solution contient 1 centigramme de chlorhydrate de morphine. Dose : 1 à 3 injections par jour.

Chloral. — Sirop de chloral (Codex) dont une cuillerée à bouche (20 grammes) contient 1 gramme d'hydrate de chloral. Dose : 1 à 5 cuillerées à bouche.

Potion au chloral :

Hydrate de chloral.....	2 à 4 gr.
Sirop de sucre.....	30 grammes.
Hydrolat de menthe.....	60 —

M. — A prendre en une ou deux fois.

Lavement au chloral :

Hydrate de chloral.....	2 à 4 gr.
Eau.....	150 grammes.
Jaune d'œuf.....	N° 1.

F. s. a.

Antipyrine. — Dose : 1 à 5 grammes par jour en cachets de 1 gramme.

Potion à l'antipyrine :

Antipyrine.....	2 à 5 gr.
Sirop de limon.....	30 grammes.
Eau distillée.....	100 —

F. s. a.

Hypnal (monochloral-antipyrine). — Dose : 1 à 3 grammes en cachets de 50 centigrammes.

Potion à l'hypnal :

Hypnal.....	2 grammes.
Rhum.....	30 —
Sirop d'éc. d'or. am....	30 —
Eau distillée.....	60 —

F. s. a. — A prendre en deux ou trois fois.

Exalgine. — Dose : 1 à 3 cachets de 25 centigrammes chacun.

DYSPNÉE

Révolusifs. — Ventouses, sinapismes.

Injections hypodermiques de morphine (voir la médication de la Douleur), — d'éther (1 à 2 seringues de Pravaz).

Inhalations. — Oxygène, éther. Iodure d'éthyle (VI à X gouttes versées sur un mouchoir).

Nitrite d'amyle (IV à X gouttes).
Pyridine (4 à 5 grammes, ou une cuillerée à café sur une assiette dans une chambre).

Potions :

Sirop d'éther.....	40 grammes.
Eau de fleur d'oranger..	10 —
— de tilleul.....	100 —

M. — Par cuillerées à bouche.

Éther sulfurique.....	2 grammes.
Alcoolat de mélisse....	20 —
Sirop de morphine.....	30 —
Eau distillée.....	90 —

M. — Par cuillerées à bouche.

Liqueur d'Hoffmann....	4 grammes.
Eau de laurier-cerise....	10 —
Sirop de sucre.....	40 —
Eau distillée.....	100 —

M. — Par cuillerées à bouche.

Sirop d'éther (1 à 3 cuillerées à bouche).
Perles d'éther (4 à 8).
Quelques gouttes d'éther (VI à XII) sur du sucre.

TOUX

Potions calmantes :

Sirop d'opium.....	} aa 20 gram.
— de Tolu.....	
Hydrolat de tilleul.....	120 —

M. — Par cuillerées à bouche.

Sirop de morphine.....	30 grammes.
Eau de laurier-cerise....	10 —
— distillée de laitue... 110 —	

M. — Par cuillerées à bouche.

Sirop de codéine.....	} aa 20 gram.
— de belladone.....	
Eau de fleur d'oranger..	10 —
— de tilleul.....	100 —

M. — Par cuillerées à bouche.

Bromure de potassium... 2 grammes.
Eau de laurier-cerise... 10 —
Sirop de morphine..... 30 —
Eau de tilleul..... 110 —

F. s. a. — Par cuillerées à bouche.

Bromure de potassium... 2 grammes.	
Sirop d'éther.....	} aa 20 gram.
— de fleur d'oranger }	
Eau de tilleul.....	120 grammes.

F. s. a. — Par cuillerées à bouche.

Eau chloroformée saturée	100 grammes.
Sirop de menthe.....	30 —

M. — Par cuillerées à bouche.

Chez les enfants :

Sirop de codéine.....	10 grammes.
Looch blanc.....	80 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à café toutes les heures.

Sirop de belladone.....	} aa 10 gram.
— diacode.....	
Eau de laurier-cerise... 2 —	
Julep gommeux.....	75 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à café toutes les heures.

Sirops calmants :

Sirop de morphine.....	} aa 40 gram.
— de belladone.....	
— de baume de Tolu. }	
— de coquelicot.....	aa 60 —

M. — 4 ou 5 cuillerées à bouche par jour.

Sirop de codéine.....	} aa 30 gram.
— d'aconit.....	
— de capillaire.....	
— de capillaire.....	150 —

M. — 4 à 5 cuillerées à bouche par jour.

Chez les enfants :

Sirop de lactucarium... 20 grammes.	
— de capillaire.....	} aa 50 gram.
— de coquelicot.....	

M. — 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Pâtes et tablettes pectorales :

Pâtes de réglisse, jujube, guimauve, lichen. Tablettes de Tolu, de gomme.

Pilules :

Pilules de cynoglosse de 20 centigrammes. Chacune de ces pilules contient 2 centigrammes d'extrait d'opium.

2 à 3 pilules par jour.

Extrait de belladone....	} aa 0,01 cent.
— de jusquiame....	
— d'opium.....	

Poudre de réglisse..... q. s.

Pour une pilule. — N° 20.
3 pilules par jour.

Cachets :

Poudre de Dower..... 0,25 centigr.
Pour un cachet. — N° 8.
2 à 4 cachets par jour.

EXPECTORATION

Pour faciliter l'expectoration :

Vomitifs :

Poudre d'ipéca.....	1 gr., 50.
Tartre stibié.....	0,05 centigr.

M. et divisez en 3 paquets.

Prendre chaque paquet dans un demi-verre d'eau sucrée tiède, à dix minutes d'intervalle.

Chez les enfants :

Poudre d'ipéca.....	0,50 centigr.
Sirop d'ipéca.....	50 grammes.

M. — Par cuillerées à café toutes les cinq minutes jusqu'à vomissement.

Expectorants :

Kermès..... 0,10 à 0,30 cent.
Julep gommeux ou looch
blanc 150 grammes.

F. s. a. — Potion à prendre par cuillères à bouche toutes les deux heures.

Chez les enfants :

Kermès..... 0,05 à 0,10 cent.
Julep gommeux ou looch
blanc 90 grammes.

F. s. a. — Une cuillerée à café toutes les deux heures.

Oxyde blanc d'antimoine. 1 à 3 gr.
Julep gommeux ou looch
blanc..... 150 grammes.

F. s. a. — Potion à prendre par cuillères à bouche toutes les deux heures.

Chez les enfants :

Oxyde blanc d'antimoine. 0,25 centigr.
Julep gommeux ou looch
blanc 90 grammes.

F. s. a. — Potion à prendre par cuillères à café toutes les deux heures.

Tartre stibié..... 0,05 centigr.
Sirop d'ipéca..... 30 grammes.
Eau de fleur d'oranger.. 10 —
— distillée..... 110 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillères à bouche toutes les deux heures.

Tablettes de kermès, d'ipéca; elles contiennent 1 centigramme de kermès ou d'ipéca.

Iodure de potassium.... 5 grammes.
Eau distillée..... 5 —
Sirop d'opium..... 50 —
— d'éc. d'or. am.... 140 —

F. s. a. — Une cuillerée à bouche de ce sirop contient 50 centigrammes d'iodure de potassium et 1 centigramme d'extrait d'opium. Dose : 1 à 4 cuillères à bouche par jour.

Pour modifier l'expectoration :

Astringents :

Tannin } aa 0,05 cent.
Cachou pulvérisé..... }
Extrait de ratanhia..... 0,10 —

Pour une pilule. — N° 20.
4 pilules par jour.

Capsules de créosote à 5 centigrammes, 6 à 12 par jour.

Balsamiques :

Baume de Tolu (sirop, pastilles).
Térébenthine. — Sirop de térébenthine,
3 à 5 cuillerées par jour.

Pilules de térébenthine :

Térébenthine d'Alsace.. } aa 0,10 cent.
Acide benzoïque..... }
Pour une pilule. — N° 60.
4 à 10 pilules par jour.

Pilules de térébenthine cuite de 30 centigrammes chacune, 5 à 15 par jour.

Térébenthine et essence en capsules;
4 à 8 par jour.

Terpine..... 0,20 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 20.
3 à 5 cachets par jour.

Terpine..... 0,10 centigr.
Extrait de laitue..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 60.
5 à 10 pilules par jour.

Goudron. — Eau et sirop de goudron.
Capsules de goudron, 4 à 10 par jour.
Copahu. — 4 à 10 capsules par jour.

Fumigations balsamiques :

Faire évaporer dans une casserole les mélanges suivants :

Goudron..... 100 grammes.
Eau..... 1 litre.

Teinture de benjoin ... } aa 15 gram.
— de baume de Tolu. }
Eau..... 1 litre.

Térébenthine..... 40 grammes.
Eau..... 1 litre.

Fumigations antiseptiques :

Acide phénique..... 5 grammes.
— thymique..... 1 gramme.
Alcool à 90 degrés..... 20 grammes.

Faire dissoudre et mélanger cette solution à 1 litre d'eau.

Créosote..... 5 grammes.
Teinture d'eucalyptus... 30 —
Eau..... 1 litre.

Inhalations médicamenteuses :

Elles se font à l'aide d'appareils spéciaux, mais on peut aussi les exécuter facilement de la façon suivante : on met le liquide médicamenteux dans un flacon dont l'ouverture est fermée par un bouchon que traversent deux tubes. L'un de ces tubes est droit et plonge dans le liquide; il sert à faire pénétrer l'air

dans le flacon. L'autre tube est coudé et sert à aspirer l'air qui sort du flacon, imprégné de vapeurs médicamenteuses. Le flacon est placé dans un vase plein d'eau chaude.

Solution de créosote pour inhalations :

Créosote..... 4 grammes.
Alcool à 90 degrés..... 100 —
Eau..... 200 —

On peut dans la formule précédente remplacer la créosote par le gaiacol ou l'eucalyptol.

MALADIES EN PARTICULIER

CORYZAS AIGUS

Badigeonnages de la muqueuse avec une des solutions suivantes :

Nitrate d'argent..... 0,50 centigr.
Eau distillée..... 15 grammes.

Chlorhydrate de cocaïne.. 1 gramme.
Glycérine..... 10 grammes.
Eau distillée..... 20 —

Pommade contre l'irritation des narines et de la lèvre supérieure :

Chlorhydrate de cocaïne.. 0,50 centigr.
Acide borique..... 2 grammes.
Vaseline..... 20 —

F. s. a.

Fumigation aromatique :

Espèces aromatiques ... } aa 15 gram.
Fleurs de sureau.. }
Eau bouillante..... 1 litre.

Fumigation émolliente :

Racine de guimauve..... 30 grammes.
Tête de pavot..... N° 1.

Faire bouillir pendant une demi-heure dans 1 litre d'eau.

Fumigations balsamiques et antiseptiques.

(Voir plus haut les préparations indiquées pour l'Expectoration.)

Poudres à priser :

Tannin 1 gramme.
Salicylate de bismuth... } aa 5 gram.
Camphre..... }
M. — 6 à 8 prises par jour.

Menthol..... 0,20 centigr.
Acide borique..... } aa 10 gram.
Talc..... }
M. — Une prise toutes les heures.

Dans les formes douloureuses, s'accompagner de courbature et malaise général :

Poudre de Dower..... 0,30 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 8.
2 à 4 cachets par jour.

Antipyrine (voir plus haut les calmants de la Douleur).

CORYZAS CHRONIQUES

Solutions pour douches nasales :

Acide borique..... 30 grammes.
Eau chaude..... 1000 —

Naphtol..... 4 grammes.
Alcool à 90 degrés..... 60 —

Faire dissoudre et verser une cuillerée à café de cette solution dans 1 litre d'eau chaude.

Chlorate de potasse....	10 grammes.
Eau chaude.....	1000 —
Acide phénique.....	20 grammes.
Eau chaude.....	1000 —

Poudre à priser :

Salol.....	2 grammes.
Borate de soude.....	30 —
M. —	6 à 8 prises par jour.

Pommade pour les narines :

Résorcine.....	3 grammes.
Vaseline.....	30 —
F. s. a.	

ÉPISTAXIS

Introduire dans la narine un tampon imbibé de l'une des solutions suivantes :

Perchlorure de fer.....	5 grammes.
Eau distillée.....	15 —

Alun.....	2 grammes.
Chlorhydr. de cocaïne...	0,30 centigr.
Eau distillée.....	30 grammes.

Antipyrine.....	4 grammes.
Eau distillée.....	20 —

Acide citrique.....	2 grammes.
Eau distillée.....	30 —

Poudres à priser :

Poudre d'alun.....	} aa 5 gram.
— de cachou.....	
— de ratanhia.....	
M.	

Tannin.....	3 grammes.
Gomme arabique pulvér.	} aa 5 gram.
Poudre de talc.....	
M.	

Potion à l'ergotine :

Ergotine.....	2 grammes.
Sirop d'opium.....	20 —
— d'éc. d'or. am.....	30 —
Eau.....	110 —
F. s. a. —	Par cuillerées à bouche.

Injections hypodermiques de la solution titrée d'ergotine Yvon; 1 centimètre cube représente 1 gramme d'ergot de seigle. Une ou deux seringues de Pravaz.

LARYNGITES AIGÜES

Fumigations calmantes :

Racine de guimauve....	30 grammes.
Tête de pavot.....	N° 1.
Eau.....	1 litre.

Faire bouillir pendant un quart d'heure.

Teinture de benjoin....	20 grammes.
Eau bouillante.....	1 litre.

Faire prendre 2 à 4 des cachets suivants :

Bicarbonate de soude...	} aa 0,50 cent.
Benzoate de soude.....	
M. —	Pour 1 cachet. — N° 12.

Benzoate de soude.....	30 grammes.
Sirop de capillaire.....	} aa 150 gram.
— de Tolu.....	

Faire dissoudre à chaud et filtrer. — 3 à 5 cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Solutions pour pansements intralaryngiens :

Chlorure de zinc.....	2 grammes.
Eau distillée.....	60 —
F. dissoudre et filtrer.	

Menthol.....	2 grammes.
Huile d'amandes douces.	10 —
M.	

LARYNGITE CATARRHALE
CHRONIQUE*Fumigations :*

Maintenir à l'ébullition pendant une demi-heure le mélange suivant :

Goudron.....	100 grammes.
Teinture d'eucalyptus...	20 —
Eau.....	1 litre.
M.	

Solutions pour pulvérisations :

Acide phénique.....	1 gramme.
Eau distillée.....	300 grammes.
Tannin.....	15 grammes.
Eau distillée.....	300 —

Solutions pour attouchements du larynx :

Chlorure de zinc.....	1 gramme.
Glycérine.....	30 grammes.
F. s. a.	

Nitrate d'argent.....	1 gramme.
Eau distillée.....	30 grammes.
F. dissoudre.	

LARYNGITE STRIDULEUSE

Potion antispasmodique :

Sirop d'éther.....	15 grammes.
— diacode.....	20 —
Eau distillée de tilleul..	60 —

M. — 2 à 3 cuillerées à bouche dans la nuit.

Potion calmante :

Hydrate de chloral.....	1 gramme.
Sirop de groseilles.....	30 grammes.
Eau de tilleul.....	60 —

M. — Par cuillerées à café jusqu'à effet.

CROUP

Potions toniques :

Extrait de quinquina....	4 grammes.
Acétate d'ammoniaque...	3 —
Rhum ou cognac.....	30 —
Sirop d'éc. d'or. am....	40 —
Eau distillée.....	100 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les heures.

Extrait de quinquina....	} aa 3 gram.
Acétate d'ammoniaque..	
Teinture de cannelle....	10 —
Sirop d'éc. d'or. am....	30 —
Vin de Malaga.....	100 —

F. s. a. — Une cuillerée à bouche toutes les heures.

PHTISIE LARYNGÉE

Douleur et dysphagie :

Solutions pour badigeonnages du larynx :

Chlorhydrate de cocaïne.	1 gramme.
Glycérine.....	5 grammes.
Eau distillée.....	5 —
F. s. a.	

Chlorhydrate de morphine.....	1 gramme.
Glycérine.....	5 grammes.
Eau distillée.....	10 —
F. s. a.	

Menthol.....	4 grammes.
Huile d'amandes douces.	20 —
F. s. a.	

Solutions pour pulvérisations :

Acide borique.....	5 grammes.
Décoction de guimauve et pavot.....	500 —
M.	

Hydrate de chloral.....	3 grammes.
Eau de laurier-cerise....	20 —
— distillée.....	280 —
F. s. a.	

État catarrhal du début :

Solutions pour pansements intralaryngiens :

Chlorure de zinc.....	1 gramme.
Eau distillée.....	30 grammes.
Filtrer.	

Nitrate d'argent.....	1 gramme.
Eau distillée.....	50 grammes.

Teinture d'iode.....	4 grammes.
Glycérine.....	40 —
M.	

Ulcérations :

Attouchements avec le naphthol ou le salol camphré :

Naphthol β.....	10 grammes.
Camphre.....	20 —

Salol.....	3 grammes.
Camphre.....	2 —

et surtout la solution suivante :

Acide lactique.....	10 à 100 gram.
Eau distillée.....	100 grammes.
M.	