

SYPHILIS LARYNGÉE

Iodure de potassium... 15 grammes.
Eau distillée..... 250 —

Prendre graduellement depuis 1 jusqu'à 6 cuillerées à bouche de cette solution dans de la bière.

Solutions pour pansements intralaryngiens :

Nitrate d'argent..... 1 gramme.
Eau distillée..... 30 grammes.

Teinture d'iode..... 4 grammes.
Iodure de potassium... 1 gramme.
Glycérine..... 10 grammes.

Solution pour pulvérisations :

Sublimé..... 0,20 centigr.
Alcool..... 20 grammes.
Eau distillée..... 230 —

F. s. a.

Inhaler trois fois par jour deux cuillerées à bouche de cette solution.

Solution pour badigeonnages sur les ulcérations :

Acide phénique..... 1 gramme.
Glycérine..... 10 grammes.

CANCER DU LARYNX

Solutions pour pulvérisations :

Acide phénique..... 2 grammes.
Eau distillée..... 200 —

Hydrate de chloral..... 4 grammes.
Eau distillée..... 200 —

Faire trois fois par jour des pulvérisations de cinq minutes avec les solutions précédentes.

Chlorhydr. de morphine. 0,10 centigr.
Eau distillée..... 150 grammes.

2 cuillerées à bouche de cette solution pour une pulvérisation.

CÉDÈME DE LA GLOTTE

Traitement local :

Poudre pour insufflations :

Chlorhydrate de cocaïne. 0,50 centigr.
Alun pulvérisé..... }
Sucre pulvérisé..... } *aa* 10 gram.
M.

Solutions pour pansements intralaryngiens :

Alun..... 2 grammes.
Glycérine..... 10 —
Eau distillée..... 20 —

Nitrate d'argent..... 0,50 centigr.
Eau distillée..... 25 grammes.

Traitement général :

Solution sudorifique :

Nitrate ou chlorhydrate
de pilocarpine..... 0,10 centigr.
Eau distillée bouillie... 10 grammes.

F. s. a. — Pour injections hypodermiques; 1 seringue de Pravaz par jour.

Potion diurétique :

Azotate de potasse..... 2 grammes.
Sirop des cinq racines... 30 —
Eau distillée..... 100 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche.

Poudre purgative :

Calomel..... 0,10 centigr.
Sucre pulvérisé..... 0,20 —

M. — Pour 1 paquet. — N° 10.
2 à 5 paquets par jour.

ACCIDENTS LARYNGÉS D'ORIGINE NERVEUSE

Bromure de potassium.. 5 grammes.
Eau distillée..... 5 —
Sirop d'éc. d'or. am... 200 —

F. s. a. — Une cuillerée à bouche de ce sirop contient 50 centigrammes de bromure de potassium. Dose : 1 à 4 cuillerées par jour.

Teinture de musc..... XX gouttes.
Julep gommeux..... 130 grammes.
Sirop de fleur d'oranger. 20 —
F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les heures.

Oxyde de zinc..... 0,05 centigr.
Poudre de feuilles de belladone..... 0,02 —
Extrait de quinquina... 0,05 —
Pour une pilule. — N° 30.
1 à 3 pilules par jour.

BRONCHITES AIGÜES

Vomitifs (voir Expectoration).

Tisanes :

Tisanes pectorales de fleurs de violette, mauve, guimauve, coquelicot, bouillon-blanc, de capillaire, hysope, lierre terrestre, etc.

Fleurs pectorales..... 10 grammes.
Eau bouillante..... 1000 —

Faire infuser pendant une demi-heure, passer et sucrer chaque tasse de tisane avec une ou deux cuillerées à bouche de sirop de Tolu ou du sirop suivant :

Sirop de gomme..... }
— de Tolu..... } *aa* 50 gram.
— de fleur d'oranger. }
M.

Carragaheen mondé.... 5 grammes.

Laver le carragaheen à l'eau froide, puis le faire bouillir pendant dix minutes dans la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un litre de tisane. Passer.

Lichen d'Islande..... 10 grammes.

Laver le lichen à l'eau bouillante pour enlever le principe amer; puis le faire bouillir pendant une demi-heure dans une quantité d'eau suffisante pour obtenir un litre de tisane. Passer.

Bourgeons de pin... 20 grammes.
Eau bouillante..... 1 litre.

Faire infuser pendant deux heures et passer.

Couper les tisanes précédentes avec moitié de lait chaud et édulcorer chaque tasse avec une ou deux cuillerées à bouche du sirop suivant :

Sirop de laurier-cerise.. 50 grammes.
— d'orgeat..... 200 —
M.

Pâtes et tablettes pectorales :

Pâtes de lichen, réglisse, jujube, guimauve.
Tablettes de Tolu, de gomme.

Calmans (voir plus haut, dans la médication de la Toux, les potions calmantes, sirops, pilules).

Alcoolature d'aconit (f^les) 1 gramme.
Sirop de morphine..... 30 grammes.
Julep gommeux..... 120 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les heures.

Alcoolature d'aconit (f^les) 5 grammes.
Eau de laurier-cerise... 10 —
Sirop de codéine..... 50 —
— de Tolu..... }
— de Désessartz..... } *aa* 100 gram.

M. — 3 à 4 cuillerées à bouche de ce sirop par jour.

Teinture d'ext. d'opium } *aa* 5 gram.
— de rac. d'aconit }

M. — X gouttes trois fois par jour dans une tasse de tisane sucrée.

Chez l'enfant :

Poudre de Dower..... 0,20 centigr.
Sirop de Tolu..... 20 grammes.
Julep gommeux..... 75 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à café toutes les heures.

Sirop de Tolu..... } *aa* 40 gram.
— de gomme..... }
— de Désessartz..... } 60 —

M. — 4 à 5 cuillerées à dessert de ce sirop par jour.

Expectorants (voir plus haut la médication de l'Expectoration).

BRONCHITES CHRONIQUES

Narcotiques :

Potions, sirops, pilules indiqués dans le traitement de la Toux et des Bronchites aiguës.

Expectorants :

Tartre stibié.....	0,05 centigr.
Eau de fleur d'oranger..	10 grammes.
Sirop de Désessartz.....	40 —
Eau distillée.....	100 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche.

Kermès, oxyde blanc d'antimoine (voir Expectoration).

Ipéca pulvérisé.....	0,50 centigr.
Julep gommeux.....	150 grammes.

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les deux heures.

Pastilles d'ipéca, de kermès, 6 à 10 par jour.

Kermès.....	} aa 0,02 cent.
Ipéca pulvérisé.....	
Extrait d'aconit (feuilles).	} aa 0,01 cent.
— de jusquiame.....	
Pour 1 pilule. — N° 30.	
4 à 8 pilules par jour.	

Balsamiques :

Tisane de bourgeons de pin (voir Bronchites aiguës).

Sirop balsamique :

Sirop de goudron.....	} aa 50 gram.
— de bourgeons de pin.	
— de térébenthine.....	
— de baume de Tolu..	

M. — Par cuillerées à bouche.

Capsules de goudron, de copahu, de térébenthine, de créosote.

Baume du Pérou.....	0,10 centigr.
Poudre de Dower.....	} aa 0,05 cent.
Benjoin pulvérisé.....	
Pour 1 pilule. — N° 30.	
6 pilules par jour.	

Terpine.....	0,10 centigr.
Extrait de laitue.....	q. s.
Pour 1 pilule. — N° 60.	
4 à 10 pilules par jour.	

Capsules d'eucalyptol à 20 centigrammes, 5 à 10 par jour.

Vin créosoté :

Créosote de hêtre.....	10 grammes.
Alcool à 90 degrés....	150 —
Teinture de cannelle....	20 —
Sirop d'éc. d'or. am....	100 —
Vin de Malaga.....	q. s. pour 1 lit.

M. — 2 à 4 cuillerées à bouche par jour.

Astringents :

Tannin.....	} aa 0,05 cent.
Cachou pulvérisé.....	
Extrait de ratanhia.....	0,10 —
Pour 1 pilule. — N° 30.	
4 pilules par jour.	

DILATATION DES BRONCHES

Balsamiques indiqués au traitement de l'Expectoration.

Créosote.....	} aa 0,05 cent.
Goudron.....	
Poudre d'eucalyptus.....	
— de benjoin.....	} aa 0,05 cent.
Pour 1 pilule. — N° 60.	
6 à 12 pilules par jour.	

Teinture d'eucalyptus...	3 grammes.
Sirop de Tolu.....	} aa 25 gram.
— de térébenthine..	
Eau de tilleul.....	100 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Inhalations médicamenteuses (voir Expectoration).

COQUELUCHE

1^{re} période. — Traitement de la bronchite aiguë.

2^e période. — **Vomitifs :**

Poudre d'ipéca.....	0,50 centigr.
Sirop d'ipéca.....	50 grammes.
M. — Par cuillerées à café toutes les cinq minutes, jusqu'à vomissement.	

Chez les enfants au-dessus de huit ans :

Tartre stibié.....	0,03 centigr.
Poudre d'ipéca.....	1 gramme.
M. et divisez en trois paquets.	

Un paquet toutes les dix minutes dans un peu d'eau sucrée tiède.

Calmants et antispasmodiques :

Extrait de belladone....	0,05 centigr.
Sirop diacode.....	30 grammes.
Eau de fleur d'oranger..	10 —
— de tilleul.....	90 —

M. — 3 à 5 cuillerées à dessert de cette potion par jour.

Teinture de belladone..	XV gouttes.
Sirop de pavot blanc....	30 grammes.
Eau de laurier-cerise...	5 —
— de tilleul.....	90 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à café toutes les heures.

Sirop de belladone.....	30 grammes.
— de Désessartz.....	80 —

M. — 4 à 6 cuillerées à café de ce sirop par jour.

Bromure de potassium..	2 grammes.
Sirop de groseilles.....	40 —
Eau de tilleul.....	60 —

M. — 2 à 3 cuillerées à bouche de cette potion par jour.

Bromure de potassium...	5 grammes.
Eau distillée.....	5 —
Sirop d'éc. d'or. am....	90 —

M. — Une cuillerée à bouche de ce sirop contient 1 gramme de bromure de potassium.

Hydrate de chloral.....	3 grammes.
Sirop de menthe.....	30 —
Eau distillée.....	100 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche.

Bromure de potassium..	} aa 2 gram.
Hydrate de chloral....	
Sirop de groseilles.....	40 —
Eau de tilleul.....	90 —

M. — 2 à 3 cuillerées à bouche de cette potion par jour.

Sulfate de quinine.....	0,10 centigr.
Miel.....	q. s.
Pour une pilule. — N° 20.	
2 à 5 pilules par jour.	

Antipyrine.....	1 gramme.
Sirop de limon.....	30 grammes.
Eau distillée.....	60 —

M. — Une cuillerée à café toutes les deux heures.

Teinture de drosera....	XXX gouttes.
Julep gommeux.....	60 grammes.

M. — A prendre en trois fois dans les vingt-quatre heures.

Teinture de drosera....	XXX gouttes
— de belladone..	XV —
Sirop de lactucarium...	30 grammes.
Eau de tilleul.....	100 —

M. — 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

ASTHME**Accès d'asthme :**

(Voir le traitement de la Dyspnée.)

Fumigations :

Papier nitré du Codex.

Faire brûler dans une assiette une cuillerée à café de la poudre suivante :

Azotate de potasse.....	3 grammes.
Poudre de f ^l es de datura.	} aa 5 gram.
— de belladone.	
— de jusquiame.	

M.

Potions :

Sirop d'opium.....	20 grammes.
— de belladone.....	15 —
Eau de laurier-cerise...	10 —
— de tilleul.....	110 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche.

Teinture de lobélie....	1 gramme.
Sirop de morphine....	30 grammes.
Eau de laurier-cerise...	10 —
— de laitue.....	90 —

M. — Potion à prendre en deux ou trois fois à une demi-heure d'intervalle.

En dehors des accès :

Iodure de potassium....	10 grammes.
Eau distillée.....	300 —

F. dissoudre. — Une cuillerée à bouche contient 50 centigrammes d'iodure de potassium. — 1 à 4 cuillerées par jour.

Iodure de potassium....	5 grammes.
Eau distillée.....	5 —
Sirop d'opium.....	50 —
— d'éc. d'or. am....	140 —

M. — Une cuillerée à bouche contient 50 centigrammes d'iodure de potassium et 1 centigramme d'extrait d'opium. — 2 à 4 cuillerées par jour.

Extrait d'opium.....	0,20 centigr.
Teinture de lobélie.....	10 grammes.
Iodure de potassium....	10 —
Eau distillée.....	290 —
F. s. a.	

Une cuillerée à bouche de cette solution contient 1 centigramme d'extrait d'opium, 50 centigrammes de teinture de lobélie et 50 centigrammes d'iodure de potassium. — 2 à 4 cuillerées par jour.

Pour la bronchite consécutive :

Voir expectorants et balsamiques dans les Bronchites.

Asthme lié à une lésion nasale :

Badigeonnages dans les fosses nasales avec la solution suivante :

Chlorhydrate de cocaïne.	1 gramme.
Glycérine.....	10 grammes.
Eau distillée.....	20 —
M.	

Asthme des arthritiques :

Alcalins :

Bicarbonate de soude...	1 gramme.
Benzoate de soude.....	0,25 centigr.
Pour un cachet. — N° 24.	
4 à 6 cachets par jour.	

Asthme des herpétiques :

Arsenicaux :

Liquueur de Fowler.....	15 grammes.
V à X gouttes aux deux principaux repas.	

Arséniate de soude.....	0,10 centigr.
Eau distillée.....	300 grammes.
F. dissoudre. — Une ou deux cuillerées à bouche par jour.	

Arséniate de soude.....	0,05 centigr.
Sirop d'éc. d'or. am....	200 grammes.
F. dissoudre. — Une à deux cuillerées à bouche par jour.	

EMPHYSÈME PULMONAIRE

Iodure de potassium....	10 grammes.
Eau distillée.....	300 —

Chaque cuillerée à bouche de cette solution contient 50 centigrammes d'iodure de potassium. — 1 à 2 cuillerées par jour dans de la bière.

Iodure de potassium....	5 grammes.
Eau distillée.....	5 —
Sirop d'éc. d'or. am....	200 —

Chaque cuillerée à bouche de ce sirop contient 50 centigrammes d'iodure de potassium. — 1 à 2 cuillerées par jour.

Voir plus haut les préparations indiquées contre la Dyspnée.

Contre la bronchite :

Alcoolature de rac. d'aconit.	XXX gouttes.
Sirop de Tolu.....	} aa 25 gram.
— de codéine.....	
Eau de laurier-cerise...	10 —
— de laitue.....	100 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Kermès.....	0,10 centigr.
Gomme arabique.....	10 grammes.
Sirop d'ipéca.....	40 —
Eau de fleur d'oranger..	10 —
— de tilleul.....	100 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

CONGESTION ET ŒDÈME DU POU MON

Congestion idiopathique :

Vomitifs (voir Expectoration).

Potion calmante :

Sirop de belladone.....	} aa 20 gram.
— de codéine.....	
Eau de laurier-cerise....	10 —
— de tilleul.....	100 —

M. — A prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Extrait thébaïque.....	0,05 centigr.
Poudre de réglisse.....	q. s.
Pour une pilule. — N° 10.	
1 pilule le soir.	

Congestion passive :

Teinture de cannelle....	} aa 10 gram.
— de quinquina..	
Sirop d'éc. d'or. am....	30 —
Vin de Grenache.....	150 —
M. — A prendre par cuillerées à bouche.	
Caféine.....	} aa 1 gram.
Benzoate de soude.....	
Sirop de groseilles.....	30 —
Eau distillée.....	120 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les heures.

Teinture de digitale....	XX gouttes.
Sirop des cinq racines...	30 grammes.
Eau distillée de menthe.	100 —

M. — A prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

PNEUMONIE LOBAIRE AIGÜE

Médication calmante (voir le traitement de la Douleur, de la Dyspnée et de la Toux).

Bromure de sodium.....	3 grammes.
Hydrate de chloral.....	2 —
Sirop de groseilles.....	40 —
Eau de tilleul.....	90 —

F. s. a. — Par cuillerées à bouche.

Extrait thébaïque.....	0,05 centigr.
Poudre de réglisse.....	q. s.

Pour une pilule. — N° 10.
1 à 2 pilules.

Expectorants : Kermès, oxyde blanc d'antimoine (voir Expectoration).

Antipyrétiques :

Sulfate de quinine.....	0,50 centigr.
Pour un cachet. — N° 8.	
2 à 4 cachets par jour.	

Antipyrine.....	4 grammes.
Rhum.....	40 —
Sirop d'éc. d'or. am....	30 —
Eau.....	80 —

M. — Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

Poudre de f ^l es de digitale.	1 gramme.
Eau bouillante.....	120 grammes.

Faire infuser, passer et ajouter :

Eau de fleur d'oranger..	10 grammes.
Sirop d'opium.....	30 —

F. s. a. — Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

Teinture de digitale....	XXX gouttes.
Sirop diacode.....	40 grammes.
Eau de tilleul.....	120 —

M. — Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

Médication tonique :

Potion de Todd :

Eau-de-vie ou rhum....	40 grammes.
Sirop de sucre.....	30 —
Teinture de cannelle....	5 —
Eau distillée.....	75 —

M. — Par cuillerées à bouche toutes les heures.

Extrait de quinquina....	4 grammes.
Rhum.....	40 —
Sirop d'éc. d'or. am....	30 —
Eau distillée.....	80 —

F. s. a. — Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

Extrait de quinquina gris.	} aa 0,05 cent.
— jaune.....	
Poudre de cannelle.....	q. s.
Pour une pilule. — N° 30.	
6 pilules par jour.	

Vin de quinquina.....	} aa 200 gram.
— de gentiane.....	
Sirop d'éc. d'or. am....	100 —

M. — 3 verres à bordeaux par jour.

Teinture de cannelle...	30 grammes.
Sirop de quinquina.....	} aa 100 gram.
— d'éc. d'or. am....	

Vin de Bordeaux..... q. s. pour 1 litre.
M. — 3 verres à bordeaux par jour.

Pneumonie des enfants :

Rhum ou cognac.....	20 grammes.
Sirop de limon.....	20 —
Eau distillée.....	50 —

M. — Par cuillerées à dessert.

Teinture de musc.....	X gouttes.
Bromure de sodium....	1 gramme.
Sirop diacode.....	30 grammes.
Julep gommeux.....	60 —

F. s. a. — Par cuillerées à café.

Sirop de chloral.....	15 grammes.
— de groseilles.....	30 —
Eau de tilleul.....	60 —

M. — Par cuillerées à café.

Pneumonie des vieillards :

Acétate d'ammoniaque..	3 grammes.
Extrait de quinquina..	4 —
Rhum.....	40 —
Sirop de Tolu.....	30 —
Eau de laitue.....	100 —

F. s. a. — Par cuillerées à bouche.

Pneumonie des buveurs :

Rhum ou cognac.....	80 à 100 gr.
Extrait d'opium.....	0,10 centigr.
Sirop d'éc. d'or. am....	40 grammes.
Eau de tilleul.....	80 —

F. s. a. — Une cuillerée à bouche toutes les heures.

Pneumonie bilieuse :

Poudre d'ipéca.....	1 gr.,50.
Sirop d'ipéca.....	30 grammes.

M. — A prendre en deux fois à dix minutes d'intervalle, dans un verre d'eau tiède.

Tartre stibié.....	0,10 centigr.
Sirop de fleur d'oranger.	30 grammes.
Eau distillée.....	120 —

M. — Par cuillerées à bouche toutes les deux heures.

Tartre stibié.....	0,05 centigr.
Sulfate de soude.....	20 grammes.
Eau distillée.....	500 —

M. — Un verre tous les quarts d'heure.

BRONCHO-PNEUMONIES AIGUËS

Voir Expectoration.

Potions calmantes :

Alcoolature de rac. d'aconit.	XXX gouttes.
Sirop de belladone.....	} aa 20 gram.
— de morphine.....	
Eau de laurier-cerise...	10 —
— de tilleul.....	100 —

M. — A prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Chez les enfants :

Alcoolature de rac. d'aconit.	VI gouttes.
Sirop de codéine.....	5 grammes.
— de belladone.....	} aa 10 gram.
— de fleur d'oranger..	
Eau de tilleul.....	70 grammes.

M. — A prendre par cuillerées à café toutes les heures.

Potions toniques et stimulantes :

Rhum ou cognac.....	80 grammes.
Extrait de quinquina...	4 —
Teinture de cannelle....	5 —
Sirop d'éc. d'or. am....	30 —
Eau distillée.....	60 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Acétate d'ammoniaque..	5 grammes.
Teinture de cannelle....	10 —
Sirop de quinquina.....	30 —
Vin de Malaga.....	100 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Éther.....	2 grammes.
Alcoolat de mélisse....	20 —
Sirop de sucre.....	30 —
Eau distillée de menthe..	100 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche.

Chez les enfants :

Rhum ou cognac.....	20 à 60 gr.
Eau de fleur d'oranger..	10 grammes.
Sirop de sucre.....	30 —
Eau distillée.....	50 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

PNEUMONIES CHRONIQUES

Révulsifs, balsamiques. Voir Douleur, Expectoration, Bronchites chroniques.

HÉMOPTYSIE

Extrait d'opium.....	0,02 centigr.
Poudre de réglisse.....	q. s.

Pour une pilule. — N° 10.
2 à 5 pilules; une pilule d'heure en heure.

Tannin.....	2 grammes.
Sirop d'opium.....	30 —
Eau de fleur d'oranger..	10 —
— de tilleul.....	90 —

M. — Par cuillerées à bouche d'heure en heure.

Extrait de ratanhia....	3 grammes.
Sirop de morphine.....	30 —
Eau distillée.....	100 —

M. — Une cuillerée à bouche toutes les heures.

Perchlorure de fer....	XXX gouttes.
Sirop d'opium.....	30 grammes.
Eau distillée.....	100 —

M.

Par cuillerées à bouche.

Eau de Rabel.....	3 grammes.
Extrait thébaïque.....	0,10 centigr.
Alcoolature de citron...	XX gouttes.
Sirop de sucre.....	40 grammes.
Eau distillée.....	110 —

F. s. a. — A prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Seigle ergoté pulvérisé..	0,50 centigr.
---------------------------	---------------

Pour un cachet. — N° 8.

4 cachets par jour.

Ergotine.....	2 grammes.
Sirop de digitale.....	30 —
Eau de fleur d'oranger..	10 —
— de tilleul.....	90 —

F. s. a. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les heures.

Solution titrée d'ergotine Yvon en injections hypodermiques (1 à 2 seringues

de Pravaz), ou à l'intérieur, à la dose de X gouttes toutes les heures, jusqu'à L gouttes.

Caféine.....	} aa 0,60 cent.
Benzoate de soude.....	
Sirop de groseilles.....	30 grammes.
Eau distillée.....	100 —

M. — Par cuillerées à bouche.

Solutions de caféine pour injections hypodermiques :

Caféine.....	2 gr., 50
Benzoate de soude.....	3 grammes.
Eau distillée.....	q. s. pour 10 centimètres cubes.

Chaque centimètre cube renferme 25 centigrammes de caféine.

Ipéca.....	2 gr., 50
Julep gommeux.....	250 grammes.

Une cuillerée à bouche tous les quarts d'heure.

EMBOLIES PULMONAIRES

Éther, morphine. Voir Dyspnée.

GANGRÈNE PULMONAIRE

Inhalations médicamenteuses (voir les préparations indiquées dans le traitement de l'Expectoration).

Potion à l'hyposulfite de soude :

Hyposulfite de soude....	3 grammes.
Sirop de fleur d'oranger.	25 —
Eau distillée.....	100 —

F. s. a. — A prendre par cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures.

Teinture d'eucalyptus...	10 grammes.
Sirop de goudron.....	} aa 250 gram.
— de térébenthine...	

M. — 4 cuillerées à bouche de ce sirop par jour.

Créosote.....	} aa 0,05 cent.
Goudron.....	
Aristol.....	
Benjoin pulvérisé.....	q. s.

Pour 1 pilule. — N° 60.
5 à 10 pilules par jour.

PHTISIE PULMONAIRE

Agents antiseptiques en inhalations
(voir inhalations médicamenteuses dans
le traitement de l'Expectoration.)

Pilules d'iodoforme :

Iodoforme 0,10 centigr.
Café pulvérisé..... 0,05 —
Extrait de quinquina.... 0,05 —
Pour 1 pilule. — N° 60.
3 à 6 pilules par jour.

Iodoforme } aa 0,05 cent.
Terpine..... }
Acide benzoïque..... }
Extrait de gentiane..... 0,10 —
Pour 1 pilule. — N° 60.
5 à 10 pilules par jour.

Injection hypodermique d'iodoforme :

Iodoforme 1 gramme.
Huile d'olive stérilisée.. 20 grammes.

Pilules de créosote :

Créosote..... 0,05 centigr.
Savon amygdalin..... 0,10 —
Benjoin pulvérisé..... q. s.
Pour 1 pilule. — N° 60.
6 à 12 pilules par jour.

Créosote..... } aa 0,05 cent.
Goudron..... }
Poudre d'eucalyptus.... }
— de benjoin..... }
Pour 1 pilule. — N° 60.
6 à 12 pilules par jour.

Huile de foie de morue créosotée :

Créosote..... 5 grammes.
Huile de foie de morue. 500 —
M. — 2 à 4 cuillerées à bouche par
jour.

Glycérine créosotée :

Créosote..... 2 grammes.
Glycérine..... 200 —
M. — 1 à 2 cuillerées à bouche par
jour.

Rhum créosoté :

Créosote..... 3 grammes.
Rhum 300 —
M. — 2 à 3 cuillerées à bouche par jour.

Vin créosoté :

Créosote..... 10 grammes.
Alcool à 90 degrés..... 150 —
Teinture de cannelle.... 30 —
Sirop d'éc. d'or. am.... 100 —
Vin de Grenache..... q. s. p^r faire 1 lit.

M. — 2 à 4 cuillerées à bouche par
jour.

Élixir créosoté :

Créosote..... 5 grammes.
Alcool à 80 degrés..... 150 —
Sirop d'éc. d'or. am.... 100 —
— de quinquina..... 250 —

M. — 2 à 4 cuillerées à bouche par
jour.

Créosote en inhalations (voir Inhalations
médicamenteuses dans l'Expectoration.)

Injection hypodermique de créosote :

Créosote pure..... 10 grammes.
Huile d'olive stérilisée.. 150 —

On injecte de 5 à 15 grammes par
jour de cette solution sous la peau à la
région des omoplates, avec une seringue
d'une contenance de 5 à 20 grammes.

Gaïacol (mêmes formules que la créosote).

Injection hypodermique :

Gaïacol..... 5 grammes.
Iodoforme..... 1 gramme.
Huile d'olive stérilisée.. 100 cent. c.

Injecter 2 ou 3 centimètres cubes de
cette solution.

Préparations tanniques :

Tannin..... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 20.
2 à 6 cachets par jour.

Tannin..... 0,15 centigr.
Extrait de ratanhia..... 0,10 —
Pour 1 pilule. — N° 60.
5 à 10 pilules par jour.

Préparations arsenicales :

Arséniate de soude..... 0,10 centigr.
Eau distillée..... 300 grammes.

F. dissoudre. — Une à deux cuillerées
à bouche par jour.

Arséniate de soude..... 0,10 centigr.
Sirop d'éc. d'or. am.... 100 grammes.
— de gentiane..... } aa 150 gram.
— de quinquina..... }
F. dissoudre et M. — Une à deux cuil-
lerées à bouche par jour.

Préparations phosphatées :

Phosphate de chaux.... 1 gramme.
Pour 1 paquet. — N° 20.
Un paquet matin et soir dans une tasse
de lait.

Sirop de chlorhydro-phosphate ou de
lacto-phosphate de chaux (Codex).
2 cuillerées à bouche par jour.

Sirop d'hypophosphite de }
chaux..... } P. E.
Sirop d'hypophosphite de }
soude..... }
M. — 2 cuillerées à bouche par jour.

Vin phosphaté :

Phosphate de soude.... } aa 10 gram.
— de potasse... }
Vin de Grenache..... 500 —
F. dissoudre et filtrer. — Un verre à
madère aux deux principaux repas.

Huile de foie de morue aromatisée :

Essence d'eucalyptus.... 3 grammes.
Huile de foie de morue. 500 —
M. — 2 à 4 cuillerées à bouche par
jour.

Contre la fièvre :

Antipyrine, 2 à 4 grammes en cachets
de 1 gramme.

ou :
Antipyrine..... 1 gramme.
Bicarbonate de soude... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 10.
2 à 4 cachets par jour.

Antifébrine (acétanilide). 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
1 à 2 cachets par jour.

Phénacétine 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 6.
1 à 2 cachets par jour.

Contre les sueurs :

Sulfate d'atropine..... Un centigr.
Poudre de guimauve.... 0,50 —
Sirop de gomme..... q. s.

Pour 20 pilules.

Chaque pilule contient un demi-milli-
gramme de sulfate d'atropine. — 1 à 3
au plus par jour.

Agaric blanc..... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 10.
1 à 2 cachets par jour.

Agaric blanc..... 0,20 centigr.
Extrait de ratanhia..... 0,10 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 5 pilules par jour.

Seigle ergoté..... 0,50 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 4.
1 à 2 cachets par jour.

Contre la diarrhée :

Sous-nitrate de bismuth. 4 grammes.
Laudanum de Sydenham. XX gouttes.
Sirop de ratanhia..... 30 grammes.
Julep gommeux..... 120 —

F. s. a. — A prendre par cuillerées à
bouche dans les vingt-quatre heures.

Sous-nitrate de bismuth. } aa 4 gram.
Diascordium }
Sirop de coings..... 30 —
Julep gommeux..... 120 —

F. s. a. — A prendre par cuillerées à
bouche dans les vingt-quatre heures.

Poudre de talc.. 100 à 200 grammes.
A prendre dans du lait.

Diascordium..... } aa 0,15 cent.
Tannin }
Pour 1 pilule. — N° 20.
10 pilules par jour.

Sous-nitrate de bismuth. 1 gram.
Poudre d'opium..... 0,02 centigr.
Pour 1 cachet. — N° 10.
5 cachets par jour.

Pour la Toux, la Dyspnée, l'Expectora-
tion difficile, l'Hémoptysie, voir les for-
mules indiquées à ces articles.

SYPHILIS PLEURO-PULMONAIRE

Traitement général de la syphilis.

CANCER DU POUMON

Voir les articles Douleur, Dyspnée, Hémoptysie.

PLEURÉSIES

Traitement de la Douleur, de la Dyspnée.

Diurétiques :

Bicarbonate de soude... 1 gramme.
Benzoate de soude..... 0,25 centig.
Pour 1 cachet. — N° 12.
4 à 6 cachets par jour.

Poudre de scille..... } aa 0,05 cent.
— de scammonée... }
Extrait de chiendent..... 0,10 —
Pour 1 pilule. — N° 20.
2 à 5 pilules par jour.

Chez les enfants :

Oxymel scillitique..... } aa 15 gram.
Sirop des cinq racines... }
Eau distillée de menthe.. 100 —

M. — A prendre par cuillerées à bouche.

Purgatifs :

Eau-de-vie allemande... } aa 15 gram.
Sirop de nerprun..... }
M.

Chez les enfants :

Manne en larmes..... 25 grammes.
A prendre dans du lait.

ADÉNOPATHIE
TRACHÉO-BRONCHIQUE

(Voir la Phtisie.)

Pommade pour onctions sur les régions sternale et interscapulaire.

Iodure de potassium.... 6 grammes.
Extrait de ciguë..... 4 —
Axonge benzoinée..... 50 —
F. s. a.

Contre la toux :

Extrait de belladone.... }
— de jusquiame.... } aa 0,01 cent.
— d'opium..... }
Poudre de réglisse..... q. s.

Pour une pilule. — 3 à 5 pilules par jour.

Sirop de belladone..... } aa 20 gram.
— de chloral..... }
Eau de laurier-cerise... 10 —
— de laitue..... 100 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à bouche toutes les heures.

Chez les enfants (2 ans) :

Teinture de ciguë..... XV gouttes.
Sirop de Tolu..... 30 grammes.
Eau de fleur d'oranger... 10 —
— de laitue..... 50 —

M. — Potion à prendre par cuillerées à café toutes les heures.

Sirop de lactucarium... 40 grammes.
— de belladone..... } aa 15 gram.
— de fleur d'oranger. }
— de baume de Tolu. 70 grammes.

M. — 4 à 6 cuillerées à café de ce sirop par jour.

E. GOURIN.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME

PRÉFACE v

PREMIÈRE PARTIE

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Considérations générales..... Ch. Achard..... 1

MALADIES DES FOSSES NASALES

Coryzas aigus..... Pierre Bouloche..... 14
Coryzas chroniques..... Pierre Bouloche..... 20
Épistaxis..... Pierre Bouloche..... 28

MALADIES DU LARYNX

Laryngites..... 37
Laryngites aiguës..... H. Cuvillier..... 37
Laryngite catarrhale chronique..... H. Cuvillier..... 42
Laryngite striduleuse..... R. Wurtz..... 45
Croup..... Pierre Bouloche..... 50
Phtisie laryngée..... H. Cuvillier..... 69
Syphilis laryngée..... H. Cuvillier..... 8
Cancer du larynx..... H. Cuvillier..... 85
Œdème de la glotte..... R. Wurtz..... 90
Accidents laryngés d'origine nerveuse.. A. Dutil..... 97

MALADIES DE LA TRACHÉE ET DES BRONCHES

Bronchites..... 114
Bronchites aiguës..... L. Thoinot..... 115
Bronchite capillaire..... J. Darier..... 122
Bronchites chroniques..... L. Thoinot..... 126
Bronchite pseudo-membraneuse.... L. Thoinot..... 133
Dilatation des bronches..... F. de Grandmaison..... 135