

Diagnostic des abcès péri-hystériques.....	783
Traitement préventif des abcès péri-hystériques. — Intervention active seulement dans les abcès iliaques.....	787
XCIX. — Nouvelle espèce d'anasarque, suite de rétention d'urine.	789
On voit l'anasarque et l'on méconnaît la rétention d'urine. — On méconnaît, à plus forte raison, la relation de causalité entre l'anasarque et la rétention. — La vessie distendue prise pour une tumeur de mauvaise nature. — Accumulation d'urine.....	<i>ib.</i>
Anasarque rapidement guérie par l'évacuation de l'urine. — Comment la rétention d'urine peut-elle produire l'anasarque.....	793
C. — Des reins mobiles.....	797
Fréquence de la mobilité des reins. — Raison de cette fréquence dans la faiblesse des moyens de fixité de ces organes. — Fréquence plus grande de la mobilité du rein à droite et chez la femme. — Pourquoi.....	<i>ib.</i>
Les reins mobiles ne sont pas toujours douloureux. — Comment ils le deviennent.....	806
Erreurs de diagnostic multiples. — Moyen de les éviter. — Traitement contentif et protecteur.....	807
CI. — Du relâchement des symphyses du bassin.....	810
Accident ordinairement méconnu. — On croit à une affection de la moelle ou de l'utérus. — Difficulté ou impossibilité de la locomotion.....	<i>ib.</i>
Marche particulière des malades. — Douleur au niveau des symphyses du bassin. — Marche rendue tout à coup facile par un lien constricteur. — Conditions auxquelles doit satisfaire ce bandage d'ailleurs très-simple.....	815
L'état puerpéral peut entraîner la suppuration des articulations du bassin et la mort.....	817
CII. — De la percussion.....	819
Influence de la philosophie sensualiste sur le mouvement scientifique contemporain et sur les tendances de l'école de Paris. — Pinel et l'histoire naturelle des maladies. — Anatomie pathologique et sémiotique inaugurées par Corvisart. — Découverte de la percussion par Avenbrugger, et de l'auscultation par Laennec. — Succession de travaux en sémiotique. — Percussion immédiate et médiate.....	<i>ib.</i>
Du plessimètre.....	824
Du plessigraphe; manière de s'en servir. — Valeur comparée des divers procédés de percussion.....	825
Toute la médecine n'est pas dans l'étude des lésions et dans la sémiotique. — Micrographie et nihilisme en thérapeutique. — Nécessité d'associer la précision moderne aux doctrines médicales du passé.....	827

FIN DE LA TABLE DU TOME TROISIÈME ET DERNIER.

TABLE ANALYTIQUE.

TABLE ANALYTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LES TROIS VOLUMES¹.

ABCÈS multiples dans la variole confluyente, 66; dans l'infection purulente puerpérale, III, 676 (*voy.* ces mots); abcès développé entre le larynx et l'œsophage dans le cours d'une variole et ayant occasionné la mort, 67; — multiples dans la scarlatine, 167, 173; — pulmonaires dans la pneumonie lobulaire des enfants, 857; — pulmonaires non métastatiques, 859; — pulmonaires vomiques, 857 (*voy.* VOMIQUES).

ABCÈS péri-hystériques, III, 769.

ABCÈS PÉRINÉPHRIQUES, III, 740.

ABSENCES (*voy.* VERTIGES ÉPILEPTIQUES).

ACÉPHALOCYSTES (*voy.* HYDATIDES DU FOIE).

ADDISON (Maladie d'), III, 580; symptômes fondamentaux, adynamie croissante, coloration noire de la peau; symptômes variables, troubles gastro-intestinaux, douleurs lombéo-abdominales, III, 586; abaissement de la température, III, 588; rôle possible du grand sympathique, III, 592.

ADÉNIE, III, 609; adénie viscérale (glandes de Peyer), III, 628; ganglions mésentériques, III, 628; — du foie, de la rate, III, 630.

ADÉNOÏDE (Tissu), sa prolifération dans la dothiéntérie, 289; elle expliquerait la leucocytose dans cette affection, 289; sa prolifération dans l'adénie, III, 611, 629; et dans la leucocytémie, III, 601.

ADYNAMIE, 329.

AFFUSIONS FROIDES (Emploi et utilité des) dans la scarlatine, 180.

AGLOBULIE dans la dyspepsie, III, 42.**ALALIE**. *Voy.* APHASIE.**ALBUMINURIE**, dans la variole, 70; dans la scarlatine, 169; dans la dothiéntérie, 306; dans la diphthérie, 491; dans les maladies du cœur, II, 41; dans l'éclampsie puerpérale, II, 197; dans le diabète sucré, II, 779 et 785.**ALCALINS** (le bicarbonate de soude en particulier), d'une utilité fort contestable dans les cas d'angine diphthérique vraie, 524; leur emploi et leur abus dans le diabète sucré, II, 805; leur utilité dans les vertiges dyspeptiques, III, 18; leur emploi dans la colique hépatique liée aux calculs biliaires, III, 259.**ALCOOLIQUES** (Emploi des), dans la métrorrhagie, III, 546; dans la pneumonie, 883.**ALCOOLISME** (Considérations générales sur l'), II, 374; accidents successifs multiples causés par l'alcool circulant à travers les tissus, III, 381; altération générale des vaisseaux et des parenchymes, III, 389.**ALGIDE** (Fièvre pernicieuse), III, 463.**ALIÉNATION MENTALE** (Rapports de l'épilepsie avec l'), II, 122, avec la spermatorrhée, II, 741.**ALIMENTATION** (Influence d'une mauvaise) sur le rachitis, III, 520.**ALIMENTATION** insuffisante, cause de diarrhée, III, 133.**ALLAITEMENT** (artificiel, mixte, naturel), III, 156; utilité du pesage avant et après que l'enfant a tété, III, 161.

1. La table n'est marquée que pour le second et le troisième volume. Le —, dans le cours d'un article, représente le mot en tête de l'article : ainsi dans l'article ABCÈS, « — multiples dans la scarlatine », signifie « abcès multiples dans la scarlatine ».

AMÉNORRHÉE, III, 636; son traitement, III, 640 et 642.

AMMONIAQUE (De l'emploi de l'), dans l'asthme, II, 493.

AMNÉSIE dans l'aphasie, II, 716, 719 et 724.

ANASARQUE, dans la variole, 70; dans la scarlatine, 169; dans la dothiéntérie, 361; influence des constitutions médicales sur le développement de l'— dans la dothiéntérie, 362; dans le typhus, 395; — suite de rétention d'urine, III, 729.

ANÉMIE, III, 70; III, 533.

ANESTHÉSIE dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 604; où elle manque quelquefois, II, 615; — dans les névralgies, II, 399.

ANGINE aphtheuse, 406; — *couenneuse commune* (herpès du pharynx), 402; quelquefois difficile à diagnostiquer de l'angine couenneuse diphthérique, 405 et 410; suivant les constitutions médicales, peut se transformer en angine diphthérique, 411; angine couenneuse cantharidique, syphilitique, mercurielle, 403; angine pultacée de la dothiéntérie, 403; angine couenneuse scarlatineuse sans gravité, 163; très-grave quand elle se complique de diphthérie, 164; dans la rougeole, 214; — *diphthérique*, 431; quand elle se propage au larynx constitue le croup (*voy.* les mots **DIPHTHÉRIE** et **CROUP**), 430; — *gangréneuse* par excès d'inflammation, 413; complication de maladies septiques et graves: dysenterie, dothiéntérie, 413; des angines couenneuses scarlatineuses et diphthériques, 414; — *gangréneuse primitive* telle, 420; — *laryngée œdémateuse*, 646; accident dans les maladies du larynx, 646; causée par la pharyngite catarrhale; par l'érysipèle du pharynx; par l'angine phlegmoneuse; par le phlegmon de la base de la langue; par le cancer de cet organe, 651; par la laryngite aiguë, 652; par la laryngite ulcéreuse aiguë ou chronique non spécifique ou spécifique (syphilitique, cancéreuse, tuberculeuse), 652 (*voy.* **PHTHISIE LARYNGÉE**); — dans la variole, 63 et 67; dans la scarlatine, 170; dans la dothiéntérie, 368 et 374; exemples de guérison spontanée dans ce cas, 375; chez les jeunes enfants à la suite de l'ingestion de thé bouillant, 656; traitement de l'—, scarifications, 662; trachéotomie, 367, 664; — *pultacée* de la dothiéntérie, 403; — *phlegmoneuse*, 423; son peu de

gravité en général, 425; la médecine doit être expectante, 426; — *rhumatismale*, 428; —s occasionnées par le produit concrété et altéré des sécrétions des amygdales, 429.

ANGINE DE POITRINE (ANGOR PECTORIS), névrose, II, 527; symptomatique d'affection du cœur ou des gros vaisseaux, II, 528; dans ces cas même, les lésions organiques ne sont que l'occasion du développement de la névrose, II, 529; — essentielle, ses causes prédisposantes, 534; liée à la diathèse rhumatismale ou goutteuse, II, 535; elle peut être l'expression de l'épilepsie et constituer alors, soit une variété de névralgie épileptiforme, soit une variété de l'*aura epileptica*, II, 537, et II, 420 (*voy.* **EPILEPSIE PARTIELLE**); ses causes occasionnelles et rôle de l'hérédité II, 539; ses symptômes variables, II, 539; elle peut entraîner la mort subite, II, 542; son diagnostic différentiel d'avec la pleurodynie, les névralgies thoraciques et cervico-brachiales, II, 543; son traitement, II, 544.

ANTIMONIAUX dans la pneumonie franche, 877.

ANTIPHLOGISTIQUE (Médication). *Voy.* SAIGNÉE.

APHASIE, II, 669; passagère (sans paralysie, II, 670; persistante, II, 678; discussion nosologique sur la cause prochaine de l'—, II, 692; l'intelligence n'est pas lésée en proportion de la perte de la parole, II, 706; il y a amnésie, II, 716; amnésie des mots au service de la pensée, II, 719; généralement dans l'— avec hémiplegie, on trouve une lésion de l'hémisphère cérébral gauche, exceptionnellement de l'hémisphère cérébral droit, II, 698; la lésion est surtout dans un lobe antérieur, et du côté gauche, II, 706; cette lésion est le plus souvent un ramollissement, II, 706; valeur diagnostique de l'— dans les cas d'apoplexie, II, 707; — chez les goutteux, II, 672; alalie, alalie et —, II, 724; diagnostic, II, 725; l'— n'est pas l'alalie des auteurs, II, 725; confusion et erreurs grossières à ce sujet, II, 726.

APHONIE chronique (De la cautérisation du larynx dans certains cas d'), 665; la simple introduction du laryngoscope a quelquefois suffi pour guérir l'aphonie, 672; — nerveuse, rôle méconnu du nerf laryngé supérieur, 668; complète par lésion du nerf laryngé inférieur, 669.

APHTHES CONFLUENTS (*apthæ lactantium*), 564 (*voy.* MUGUET).

APOPLECTIFORMES (Accidents), subits et transitoires liés à l'épilepsie; stupeur apoplectique, II, 84.

APOPLEXIE, II, 50; ne doit pas être confondue avec l'hémorrhagie cérébrale, l'apoplexie séreuse, l'apoplexie nerveuse, II, 53.

APOPLEXIE (Paralysie dans l'), II, 53, 54, 55.

ARSENIC et des préparations arsenicales (Emploi de l'), dans le traitement de la bronchorrhée, 694; dans l'asthme, II, 492 et 497; arsenic à l'intérieur dans le diabète sucré, II, 806; dans la fausse chlorose, III, 535; dans les fièvres palustres, III, 487; dans le rhumatisme nouveau (bain d'arséniate de soude), III, 411.

ARTÈRE TEMPORALE (Section de l'), dans les névralgies rebelles, II, 427.

ARTÉRIELLE (Oblitération), cause de gangrène, 319.

ASPIRATION PNEUMATIQUE dans la ponction de la poitrine, 827.

ASTHME, II, 460; ses attaques nocturnes, II, 461; quelquefois diurnes, II, 462;

le coryza (*voy.* ce mot), le catarrhe, un des éléments de l'asthme, en constitue en quelques cas la seule manifestation, II, 463; causes occasionnelles des attaques, leurs variétés, leurs bizarreries, II, 468; influences des milieux, des climats, des saisons, des températures, II, 471; nature de l'asthme, II, 474; asthme symptomatique d'une maladie du cœur ou des gros vaisseaux, II, 474; de l'emphysème pulmonaire, qui n'est que consécutif à l'asthme essentiel, II, 478; d'un catarrhe chronique, II, 479; l'asthme essentiel est une névrose diathésique, II, 484; son traitement, II, 490

ASTHME THYMIQUE, II, 184. *Voy.* CONVULSIONS INTERNES.

ASYNERGIE VOCALE, ce que c'est, 674.

ATAXIE en général, 330, 352.

ATAXIE CÉRÉBELLEUSE, II, 631.

ATAXIE LOCOMOTRICE PROGRESSIVE, II, 601; paralysie dans l'—, II, 607, 608, 609, 615, 617; — fruste, II, 617; discussion à propos du sens musculaire de Ch. Bell, et du sentiment d'activité musculaire de Gerdy, II, 621; lésions anatomiques, II, 633; arthropathies, II, 619, 635.

ATROPHIE musculaire progressive, II, 648; sa nature, II, 666; atrophie des cellules nerveuses trophiques, II, 667.

AURA epileptica, II, 116; viscérale, II, 118; diagnostic différentiel avec l'*aura hysterica*, II, 119; *aura* intellectuelle, II, 126.

AVORTEMENT, une des conséquences de la syphilis du fœtus, III, 319.

BAINS ARSENIQUES, III, 411.

BAINS SINAPISÉS, III, 146.

BALSAMIQUES (Emploi des préparations) dans le traitement de la bronchorrhée, 691; dans la diphthérie, 527.

BASEDOW (Maladie de). *Voy.* GOÏTRE EXOPHTHALMIQUE et GRAVES (maladie de).

BASSIN (Relâchement des symphyses du), III, 810.

BELLADONE et atropine dans l'épilepsie, II, 151; dans les névralgies en applications locales, en injections sous-cutanées, II, 412; dans l'asthme, à l'intérieur et en fumigations, II, 491; dans la coqueluche (son mode d'administration à doses croissantes), II, 520; dans l'angine de poitrine, II, 546; dans l'incontinence nocturne de l'urine, II, 758, 763 et 767; dans la spermatorrhée, II, 751; dans la dyspepsie, III, 53; dans la diarrhée, III, 426; dans la constipation, III, 198.

BILIAIRES (Calculs), III, 228, 230; distension de la vésicule à la suite des calculs biliaires, III, 241; kélotomie, III, 246; gravelle, III, 233; *hydropisie de la vésicule* par —, 241; *atrophie de la vésicule* par —, III, 242; *rupture de la vésicule* par —, III, 242.

BILIAIRES (Fistules), III, 244; internes, III, 246.

BILIEUSE (Dothiéntérie), 328.

BILIEUSE (Dysenterie), III, 179.

BLENNORRHAGIE, ses rapports avec les diathèses, 689; — pulmonaire. *Voy.* BRONCHORRÉE.

BLENNORRHÉE GOUTTEUSE, III, 349.

BOUCHE (Gangrène de la) dans la rougeole, 158.

BOULIMIQUE (Dyspepsie), III, 39.

BRONCHES (Dilatation des), 676; son diagnostic différentiel avec la phthisie tuberculeuse, 677; avec la pleurésie, 684; avec la perforation pulmonaire, 684; la fétilité de l'haleine peut en imposer pour l'existence d'une gangrène pulmonaire, 684; pronostic, 686.

BRONCHITE (dans l'asthme), II, 463; dans la coqueluche, 512.

BRONCHITE capillaire dans la rougeole, 208.

BRONCHITE DIPHTHÉRIQUE, sa fréquence, 445.

BRONCHORRHÉE, 688.
BRONZÉE (Maladie). *Voy.* MALADIE D'AD-DISON, III, 580.
BRUIT SKODIQUE, 734. *Voy.* PLEURÉSIE.
BRUTS DU CŒUR, II, 29.
BUBONS dans les maladies pestilentiellés; dans la scarlatine, 166; méésentériques dans la dothiéntérie, 287; dans le typhus, 395; dans la diphthérie maligne, 458; dans l'érysipèle, 235.
BUCCALE (Diphthérie), 480.
BULLEUSE (Éruption de la varicelle), 144.
CACHEXIE exophtalmique. *Voy.* MALADIE DE GRAVES, II, 551.
CACHEXIE palustre (Névrâlgie dans la), II, 403.
CALCULS biliaires, III, 228 et 230.
CANCER de l'estomac, III, 102; cancer de l'estomac en nappe, III, 103.
CANULE MOBILE après la trachéotomie pratiquée pour le croup, 556.
CARTILAGES (Nécrose des). *Voy.* NÉCROSE.
CATARRHALE (Diarrhée), III, 109; consécutiue, III, 115; par indigestion, III, 119.
CATARRHE intestinal dans la diarrhée, III, 109; catarrhe intestinal de la dothiéntérie, sa spécificité, 322.
CATARRHE péripneumonique consécutif à la rougeole (Urtication dans le), 205.
CATARRHE pulmonaire dans l'asthme, II, 463; spécifique dans la coqueluche, II, 504 et 505; dans la goutte, III, 367; dans la dothiéntérie, 324; — morbilleux de la trompe d'Eustache, cause de surdité, dans la rougeole, 197; — pulmonaire au début, 197; — suffocant comme complication, 204; — péripneumonique (bronchite capillaire), d'une excessive gravité, 208; — dans la coqueluche, II, 512.
CATHÉTÉRISME du larynx dans le croup, 539.
CAUSTIQUES (Emploi des) dans l'angine diphthérique, 532; acide chlorhydrique, 535; azotate d'argent, 536; ses inconvénients et les avantages du sulfate de cuivre, 538; caustiques dans le traitement du croup, 539; cautérisation de la plaie après la trachéotomie, 553.
CÉPHALÉES rebelles (Section de l'artère temporale dans les), II, 427.
CÉRÉBELLEUSE (Ataxie), II, 631.
CÉRÉBRAL (Ramollissement), II, 64; l'aphasie indice du —, II, 706.
CÉRÉBRALE (Congestion) dans l'épilepsie et l'éclampsie, consécutiue aux attaques, II, 84 et 86; ce qui se passe dans l'atta-

que d'épilepsie ressemble bien plus aux phénomènes de la syncope qu'à ceux de la congestion cérébrale, II, 84; la même modalité encéphalo-rachidienne qui cause l'attaque épileptique ou éclamptique, suffit pour produire la stupeur apoplectique qui suit l'attaque, II, 86; congestion consécutiue dans les convulsions de l'enfance, II, 190; dans la coqueluche, II, 518. *Voy.* APOPLECTIFORMES (Accidents) et RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL.

CÉRÉBRALE (Fièvre), II, 293; cri hydrencéphalique, II, 309; tache cérébrale ou méningitique (sa valeur dans la méningo-encéphalite), II, 301.

CÉRÉBRALE (Hémorrhagie), II, 50; la forme apoplectique proprement dite est rare, II, 54; observation montrant l'apoplexie arrivant graduellement, II, 55; observation d'apoplexie subite, II, 57; ramollissement cérébral, conséquence et non cause de l'hémorrhagie, II, 59; traitement, II, 59; hémorrhagie cérébrale dans l'épilepsie, suite et non cause, II, 101; dans la maladie de Graves, II, 574.

CÉRÉBRALE (Tache), sa valeur dans la fièvre cérébrale, II, 301; son apparition dans la maladie de Graves, II, 566.

CÉRÉBRO-SPINALE (Forme) de la dothiéntérie, 332.

CERVICO-BRACHIALE (Névrâlgie), II, 543.

CHALEUR (Influence de la) dans le traitement de la syphilis des enfants nouveau-nés, III, 341.

CHALEUR dans les maladies. *Voy.* TEMPÉRATURE.

CHIMIE (Son rôle en médecine), introduction, 4 et passim, II, 545, 806; III, 56, 57, 259, 381, 388.

CHIRAGRE (*Voy.* GOUTTE), III, 347.

CHLORATE DE POTASSE, s'il est avantageux dans l'angine diphthérique, c'est dans les cas de moyenne intensité, 526.

CHLORHYDRIQUE (Emploi de l'acide) à l'intérieur, dans certaines formes de la dyspepsie, III, 62; principalement dans la dyspepsie liée à la diathèse tuberculeuse, III, 64.

CHLOROFORME (Inhalations de) dans les convulsions de l'enfance, II, 194; dans l'éclampsie des femmes en couche, II, 201; dans la danse de Saint-Guy, II, 259; dans l'asthme, II, 500; dans les névralgies, II, 422; dans les coliques hépatiques, III, 260; en applications topiques dans les névralgies, II, 421; dans la tétanie, II, 220.

CHLOROSE (Névrâlgies multiples dans la), II, 403.

CHLOROSE ménorrhagique, III, 543.

CHLOROSÉS VRAIE ET FAUSSE III, 533.

CHOLÉRA INFANTILE, III, 142; diffère du choléra-morbus, III, 143.

CHOLESTÉRÉMIE dans la cirrhose, III, 571.

CHORÉES, II, 222, 264 (*chorea saltatoria, festinans*), II, 265; chorées laryngées ou diaphragmatiques, II, 268; *chorea scriptorum* (*Voy.* CRAMPE DES ÉCRIVAINS et SPASMES FONCTIONNELS IDIOPATHIQUES), chorées histériques, II, 272; chorée de Saint-Guy, II, 225 (*Voy.* DANSE DE SAINT-GUY).

CICATRISATION DES PUSTULES, dans la variole, 57; dans la variole confluyente, 66; dans la variole modifiée, 83.

CIRRHOSE DU FOIE, III, 553; est une phlegmasie chronique, III, 556, 558; par maladie du cœur, III, 556; par alcoolisme, II, 384, et III, 558; formes spéciales de — suivant la cause de celle-ci, III, 561; — syphilitique, III, 559, 574; — palustre, III, 560; veines portes accessoires, III, 563; *circulations de compensation*: 1° pariétale, III, 563; 2° dans l'artère hépatique, III, 565; symptomatologie, III, 567; acholie, III, 569; cholestérémie, III, 571.

CLAVELISATION, 89.

COCTION DANS LES MALADIES, 8.

CŒUR (Affections organiques du), II, 28; albuminurie dans les maladies du —, II, 41; théorie des bruits du —; celle de Rouanet seule admissible, II, 29; phénomènes généraux, II, 31; renseignements diagnostiques fournis par le sphymographe, II, 31; pronostic difficile, II, 35; dans le rhumatisme articulaire, III, 418; dans le rhumatisme noueux, III, 402; dans la goutte, III, 367; état du cœur dans la maladie de Graves, palpitations, II, 552; hypertrophie, II, 555, 574, 577.

COLALGIE, III, 34.

COLIQUES HÉPATIQUES, III, 228 et 234; causées par des hydatides du foie, III, 278, 282, 285; douleurs gastralgiques et névralgie intercostale, brachiale; cervicale, II, 396.

COLIQUES DE MISERERE. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.

COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, III, 359 et 366.

COLITE dans la rougeole, ne doit pas être confondue avec la dysenterie, 207.

COMATEUSE (Fièvre intermittente pernicieuse), III, 464.

COMPENSATION (Circulation de) dans la cirrhose: 1° pariétale, III, 563; 2° dans l'artère hépatique, III, 565.

COMPRESSEUR DE LA PROSTATE (Emploi du) dans l'incontinence nocturne de l'urine, II, 769; dans la spermatorrhée, II, 753.

CONFLUENTS (Aphthes), 564.

CONGESTION de cause nerveuse dans l'asthme, II, 483; dans la maladie de Graves, II, 584 et 585; ses conséquences matérielles (exsudation plastique interstitielle, hypertrophie et consécutivement atrophie des tissus), II, 591.

CONGESTION CÉRÉBRALE (la); coup de sang, II, 53; n'est niée par personne, II, 87; on confond avec elle les vertiges liés à une affection de l'oreille interne, II, 79; les vertiges dyspeptiques, II, 79; dans l'épilepsie et dans l'éclampsie, est consécutiue aux attaques, II, 81 et 85; ce qui se passe dans l'attaque d'épilepsie ressemble bien plus aux phénomènes de la syncope qu'à ceux de la congestion cérébrale, II, 84; la même modalité encéphalo-rachidienne qui cause l'attaque épileptique ou éclamptique suffit pour produire la stupeur apoplectique qui suit l'attaque, II, 86.

CONGESTION CÉRÉBRALE CONSÉCUTIVE dans les convulsions de l'enfance, II, 190; dans la coqueluche, II, 518. *Voy.* ACCIDENTS APOPLECTIFORMES.

CONSANGUINS (Mariages), leur fâcheuse influence sur la propagation de l'espèce, II, 140; influence d'un premier mari sur les enfants du second, II, 138.

CONSTIPATION, III, 191; son traitement, 195; phénomène le plus habituel dans la variole discrète des adultes, 46; se montrant quelquefois dans la dothiéntérie, 324; le fait ordinaire dans la fièvre cérébrale, II, 306; — cause de dyspepsie, III, 33.

CONSTITUTIONS MÉDICALES (Influence des) sur l'action des médicaments, 879.

CONTAGION, 593; de la variole, 45; de la scarlatine, 150; de la rougeole, 195; de la dothiéntérie, 344; de la diphthérie, 489; de l'érysipèle, 239; de la coqueluche, II, 204.

CONTRACTILITÉ MUSCULAIRE électrique, conservée dans la paralysie faciale de cause cérébrale, éteinte dans la paralysie de Bell, II, 336.

CONTRACTURE consécutiue aux paralysies, II, 67; consécutiue à la paralysie

faciale, II, 343; et spasme de la portion dure de Bell, II, 343.

CONTRACTURE essentielle des extrémités, spasmodique des nourrices, II, 203. *Voy.* TÉTANIE, II, 202.

CONVULSIONS de l'enfance, II, 168, peuvent être protopathiques, essentielles ou symptomatiques, II, 169; deutéropathiques, sympathiques (par action réflexe), II, 173; causes prédisposantes, II, 174; causes occasionnelles, II, 172; dans toute convulsion on distingue trois périodes: une tonique qui ne manque jamais, II, 176; l'autre clonique, II, 176; la troisième, période de stupeur, II, 177; elles sont intermittentes, II, 179; quelquefois cependant elles paraissent continues (*état de mal, status eclampticus*), II, 179; quelquefois elles sont réellement continues, II, 179; convulsion générale, II, 177; convulsions partielles, II, 181; des membres, du tronc, du visage, II, 180; de la langue, des muscles de l'œil, II, 181; convulsions internes, II, 182; convulsions du diaphragme, II, 183; convulsion laryngée (*asthme thymique*), II, 183; accidents consécutifs aux convulsions, II, 186; comment arrive la mort à la suite des convulsions, II, 188; 1^o par *asphyxie*, c'est le fait le plus ordinaire, l'asphyxie peut être causée par des accès de suffocation, II, 188; elle peut être causée par l'insuffisance de l'hématose, II, 188; 2^o par *syncope*, II, 190; *convulsions initiales* dans les maladies, II, 191; au début de la variole chez les enfants, 46 et 75; dans la scarlatine, 154; dans la rougeole, 196 et 200; dans la fièvre cérébrale, rares dans la première période, dans la deuxième réapparaissent, et jouent le rôle principal dans la troisième, II, 313; dans la coqueluche, II, 518; les convulsions *terminales* de beaucoup plus graves que les convulsions initiales, II, 192; dans la variole, 58 et 75; dans la scarlatine, 192; dans la rougeole, 196 et 215; les convulsions des chorées et en particulier de la danse de Saint-Guy, interrompues pendant le sommeil, II, 241; le pronostic varie suivant les causes et suivant les individus, II, 193; traitement, II, 193.

COPAHU dans la diphtérie, 526.

COQUELUCHE, II, 504; pleurésie dans la —, II, 512; toux convulsive dans la —, II, 506.

CORYZA dans la rougeole, 194 et 211; coryza syphilitique chez les enfants

nouveau-nés, III, 323; coryza, seule manifestation de l'asthme, II, 462.

COUENNEUSE (Angine) commune, 402; quelquefois difficile à diagnostiquer de l'angine couenneuse diphtérique, 405 et 410.

COURBE des températures dans les maladies. *Voy.* TEMPÉRATURE.

COWPOX. *Voy.* VACCINE.

CRACHATS de la rougeole, nummulaires, rappelant ceux des phthisiques, 198; des vomiques, 866; des hydatides des poumons, 852; de la pneumo-hémorragie (apoplexie pulmonaire), 704.

CRAMPE DES ÉCRIVAINS, II, 268. *Voy.* CHORÉES et SPASMES FONCTIONNELS IDIOPATHIQUES.

CROUP, 437; chez l'adulte, 448; trachéal, laryngé, bronchique, d'emblée, 446; dans la variole, 68; sa propagation aux bronches plus ou moins rapide suivant les épidémies, 438 et 445.

CROUP (Faux). (*Voy.* LARINGITE STRIDULEUSE), dans la rougeole, 203.

CROUP (Trachéotomie dans le), 543.

CROUPALE (Toux), est bien plus la toux du faux croup que celle du croup, 438 et 642; voix —, 438.

CUBÈBE dans la diphtérie, 526.

CUTANÉES (Affections) et dyspepsie, III, 37; dans la goutte, III, 366; dans la dentition, III, 168; affections — syphilitiques des enfants nouveau-nés, III, 326; diphtérie —, 471; hémorrhagies —, *Voy.* HÉMORRHAGIES; sécrétions — chez les diabétiques, II, 782.

DALTONISME, II, 137.

DANSE DE SAINT-GUY, ce nom préférable à celui de chorée, II, 225; conditions de développement, II, 226; âges (une observation chez une vieille femme), II, 226, 227; rapport du rhumatisme articulaire aigu avec la —, 230; — suite de la scarlatine, 173; la — peut précéder le rhumatisme articulaire aigu, II, 231; la —, partielle au début, l'est rarement jusqu'à la fin, II, 236; elle peut se terminer par la mort, qui est la suite d'épuisement nerveux ou de vastes suppurations, II, 241; par les complications du rhumatisme, II, 245; influence des maladies fébriles intercurrentes sur la —, 247.

DÉLIRANTE (Fièvre pernicieuse), III, 464.

DÉLIRE: dans la variole discrète normale sans gravité, grave dans la variole discrète anormale, 58; dans la variole confluente, 65; dans la scarlatine, 161 et

186; dans l'érysipèle de la face, 237; dans la convalescence de la dothiéntérie, 356; dans la pneumonie, 886 et 889; dans l'alcoolisme, ses caractères, II, 377; dans la coqueluche, II, 519; conditions qui, dans la marche de l'épilepsie, favorisent le plus la production du délire, II, 135.

DENTITION, III, 162; première —, ses périodes, III, 163; ses accidents, III, 167; conditions du sevrage pendant la —, III, 171.

DESQUAMATION dans la rougeole, 198; de la scarlatine, 159; l'élévation de la température à ce moment peut expliquer les accidents parfois redoutables de cette période, 160.

DIABÈTE SUCRÉ, II, 771; intermittent, périodique, II, 777; ses caractères, II, 777; la polyurie n'en est pas le caractère essentiel, II, 777; affaiblissement de la vue dans le —, II, 784; albuminurie dans le —, II, 779, 785; influence des affections intercurrentes sur le —, II, 787; physiologie pathologique du —, II, 789; sa cause prochaine, II, 799; son traitement, II, 803.

DIAPHRAGMATIC GOUT, III, 365.

DIAPHRAGME (Convulsion du), II, 183.

DIARRHÉE, III, 108; catarrhale, III, 108; sudorale, III, 111; nerveuse, III, 114; catarrhale consécutive, III, 117; par tonicité exagérée, III, 117; par indigestion, III, 119; traitement de ces diverses espèces, III, 122; — dans la variole confluente au début, surtout chez les enfants, où elle remplace la salivation, 59; cessant chez l'adulte vers le troisième jour, phénomène fâcheux quand il est violent et qu'il persiste, 65; son traitement dans ces cas, 77; — dans la scarlatine, 162; dans la rougeole, 496, 207; dans la dothiéntérie, fait habituel, 322; dans la pneumonie, 872; dans la convalescence de la dothiéntérie, 355; dans les maladies du cœur, II, 38; dans la coqueluche, II, 515.

DIARRHÉE CHRONIQUE, III, 131; liée à la tuberculisation, III, 132; syphilitique, III, 134; herpétique, III, 136; dépendant d'une alimentation insuffisante, III, 133.

DIATHÈSE, III, 345; III, 449.

DIGITALE (Emploi de la) dans l'épilepsie, II, 154; dans la maladie de Graves, II, 597.

DILATATION FORCÉE DE L'ANUS, dans le traitement de la fissure à l'anus, III,

208; dans le traitement de la spermatorrhée, II, 756.

DIPHTHÉRIE, 430; maligne, 452; son extrême gravité, elle tue à la façon des maladies septiques, 453-457; contagion, 489; tentatives impuissantes d'inoculation, 489; — nasale, et sa propagation à la trompe d'Eustache, 459; larmolement causé par l'obstruction du canal nasal et des conduits lacrymaux, 460; la — nasale d'une excessive gravité, guérit cependant quelquefois spontanément, 461; — bronchique, sa fréquence, 445; — palpébrale, 465; — vaginale, 468; — utérine, 470; — des parties génitales; vulvaire, préputiale, 470, 471; — cutanée, 471; — buccale, 480; nature de la —, 485; traitement, 521.

DIPHTHÉRIE (Albuminurie dans la), 491.

DIPHTHÉRIQUE (Angine), 431; — (ophtalmie), 465; — (paralyse), 494.

DOIGTS (Déformation hippocratique des), dans la phthisie, 843.

DOTHIÉNTÉRIE, 285; fièvre typhoïde et autres synonymes, 286; la lésion spécifique est l'éruption furonculaire de l'intestin, 287; lésion des plaques de Peyer et leucocytose, 289; la gravité des symptômes généraux n'est pas en rapport avec l'intensité de l'éruption intestinale, 291; hémorrhagies intestinales dans la dothiéntérie, 297; leur pronostic plutôt favorable, 299; catarrhe intestinal spécifique dans la dothiéntérie, 322; élément catarrhal dans cette affection, 324; altérations possibles des reins, 305; albuminurie et urémie possibles; 306; myocardite et endocardite, 307; altérations du sang, 308; dégénérescence granuleuse et cirreuse des muscles striés, 309; marche de la température caractéristique, 312-316, parallélisme entre les lésions intestinales et la marche de la température, 317; taches rosées lenticulaires, leur valeur, 318; miliaire pellucide, 321; taches bleues, 322; formes de la dothiéntérie: muqueuse, 327; bilieuse, 328; inflammatoire, 328; adynamique, 329; ataxique, 330; spinale et cérébro-spinale, 332; maligne, 334; parotides, surdité, leur pronostic, 335; phénomènes intermittents dans la dothiéntérie, 336; conditions du développement de la dothiéntérie, 341; contagion, 341; faits qui la démontrent, 342; âge des sujets, encombrement; acclimatement, 346; traitement, 347; im-

portance du régime, 350; accidents multiples de la convalescence, 355; affaiblissement des facultés intellectuelles, 357; albuminurie, 361; paralysie, 358; accidents de la période d'état ou de déclin, 363; fonte de la cornée, 363; nécrose des cartilages du larynx, 367; des cartilages du nez, 372; eschares et accidents consécutifs, 376; gangrène spontanée des membres, 379; par thrombose artérielle, 381; diagnostic différentiel entre la dothiéntérie compliquée d'accidents cérébraux et la fièvre cérébrale, souvent des plus embarrassants, II, 311.

DYSENTERIE, III, 173; bilieuse, III, 179; inflammatoire, rhumatismale, III, 179; intermittente, III, 180; lésions, III, 181; traitement, III, 184.

DYSENTÉRIQUE (Fièvre pernicieuse), III, 466.

DYSPEPSIE, III, 24; sympathique, des maladies du foie, de l'utérus, etc., III, 35; ses formes: boulimique, III, 39; flatulente, III, 39; acide, III, 40; ces formes se confondent, III, 41; son retentissement sur le système nerveux, III, 41; aglobulie dans la dyspepsie, III, 42; la dyspepsie dans le diabète, II, 783; dans la goutte (symptôme prémonitoire de l'attaque), III, 347; liée à l'affection hydatique du foie, III, 274; son traitement des plus variables, III, 45.

DYSPNÉE nerveuse dans la scarlatine, 161; dans le typhus (sa gravité pronostique), 394; dans le croup et accès intermittents de suffocation, 439.

DYSPNÉE symptomatique. *Voy.* ASTHME.

DYSURIE au début de la variole, 47.

Eaux aux Jambes (*Grease*) chez le cheval. *Voy.* COWPOX et VACCINE.

ECCHYMOSES SOUS-CUTANÉES consécutives à l'attaque d'épilepsie, II, 100.

ÉCHINOQUES. *Voy.* HYDATIDES.

ÉCLAMPSIE des enfants (*Voy.* CONVULSIONS); des femmes en couche, III, 196.

ECZÉMA des parties génitales chez les diabétiques, II, 782; eczéma et asthme, II, 463.

EMBOLIES, II, 43; embolie pulmonaire, III, 708; embolie cardiaque, III, 715; anatomie pathologique de l'embolie, III, 724.

EMPHYSÈME PULMONAIRE, vésiculaire et interlobulaire dans la diphthérie, 451, 452; dans l'asthme; plus souvent effet que cause de l'affection pulmonaire, II, 479; dans la coqueluche, II,

514; sous-cutané consécutif et trachéotomie, 550.

EMPIRISME thérapeutique, 15.

ENCÉPHALIQUES (Lésions) dans l'épilepsie, II, 101; dans l'éclampsie des enfants, II, 169; dans la fièvre cérébrale, II, 319.

ENCÉPHALO-MÉNINGITE, qu'elle soit ou non tuberculeuse, la maladie affecte les mêmes allures, II, 320.

ENDOCARDITE dans le rhumatisme articulaire aigu, III, 417; dans la variole, 71; dans la scarlatine, 172.

ENDOCARDITE ULCÉREUSE, II, 48; III, 414.

ENFANTS (Convulsions des), II, 168; coryza syphilitique des —, III, 323; croup, 431, 437; syphilis des nouveau-nés, III, 317; éruptions syphilitiques, III, 326; érysipèle des — nouveau-nés, 244; muguet chez les —, 566; pemphigus dans la syphilis du fœtus et de l'enfant nouveau-né, III, 320; tuberculisation pulmonaire chez les —, 749; variole chez les —, 75.

ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES. *Voy.* ADÈNE et BUBONS.

ENTÉRITE et **GASTRO-ENTÉRITE**, III, 111; entérite dans la diphthérie, 451; dans la rougeole, etc. *Voy.* DIARRHÉE et COLITE.

ÉPANCHEMENTS PLEURAUX. *Voy.* PLEURÉSIE et PARACENTÈSE DE LA POITRINE.

ÉPANCHEMENTS TRAUMATIQUES DU SANG DANS LA PLEÛRE, 832; rapidité avec laquelle se fait la coagulation du sang épanché, 834; le sang n'est pas irritant pour la plèvre, 838; rapidité avec laquelle il se résorbe, 839.

ÉPILEPSIE. La prétendue congestion cérébrale apoplectiforme, liée beaucoup plus souvent qu'on ne le croit en général à l'épilepsie, II, 81 [*Voy.* APOPLECTIFORMES (Accidents)]; l'épilepsie et l'éclampsie, névroses identiques avec elles-mêmes dans leur expression phénoménale et leur cause prochaine, II, 83; la grande attaque d'épilepsie, II, 93; ses synonymes (haut mal, grand mal, etc.), II, 98; l'attaque simulée, II, 93; trois périodes dans l'attaque: 1^o de convulsions toniques, II, 96; 2^o de convulsions cloniques, II, 97; 3^o de stupeur apoplectique, II, 98; variétés, II, 108; épilepsie partielle, II, 120, 121; angine de poitrine, II, 120; *aura epileptica*, II, 116; névralgie épileptiforme, II, 121 et 156; l'— et l'éclampsie (diagnostic différen-

tiel entre), II, 143; la seconde peut se transformer en la première, II, 146; diagnostic différentiel avec l'hystérie, II, 147; traitement de l'épilepsie, II, 151; rapports de l'épilepsie avec l'aliénation mentale, II, 122 (*Voy.* ÉTAT MENTAL); — symptomatique, II, 83, 148.

EPILEPTICA (*Aura*), II, 116.

ÉPILEPTIFORME (Névralgie), II, 121, 156.

ÉPILEPTIQUES (Vertiges), II, 108.

ÉPILEPTOCÈNE (Zone), II, 103.

ÉPISTAXIS dans la diphthérie maligne, 462.

ÉRUPTION de la variole *discrète*, 48; généralement plus abondante dans les parties les plus vasculaires, 55; de la *variole confluente*, 60; de la variole modifiée, 80; — de la rougeole; ses caractères, 196; rougeole boutonneuse, 197; — *bulleuse* de la *varicelle*, se fait par poussées successives, 144; de la *scarlatine*; ses caractères, 152; gravité de la scarlatine en raison directe de l'intensité de l'éruption; excepté quand l'— est empêchée par quelque grande fluxion antagoniste, de grandes hémorrhagies, des perturbations nerveuses profondes, 159.

ÉRUPTIONS CUTANÉES, taches rosées lenticulaires, 287 et 348; miliaire pellucide, 321; taches bleues de la dothiéntérie, 322; éruption furonculaire de l'intestin, 287; — particulières; morbilliformes, scarlatiniformes, dans la variole modifiée, 81; morbilliformes, scarlatiniformes, érythémateuses, miliaires, ortiées et pemphigoides dans la diphthérie maligne, 458.

ÉRYSIPELATO-PHLEGMONEUSE (Pneumonie), 884.

ÉRYSIPELE et principalement de l'— de la face, 230; sa pathogénie, 231; causes externes et causes générales, 232; peut se développer indépendamment de tout traumatisme, 234; sa gravité suivant les épidémies, 238; contagion de l'—, 239; marche de la température dans l'—, 236; généralement l'— de la face n'est pas une maladie sérieuse, 242; — ambulante, 237; — des nouveau-nés, manifestation de la fièvre puerpérale, maladie presque fatalement mortelle, 244 (*Voy.* FIÈVRE PUERPÉRALE); traitement de l'— des nouveau-nés par les lotions à la solution de camphre et de tannin dans l'éther, 251; — compliquant la dothiéntérie, survenant consécutivement aux eschares, 377; dans le

typhus, 395; *érysipélateuse* (rougeur) dans la diphthérie maligne, 458.

ÉRYTHÈME des fesses et des talons dans le muguet, 570.

ÉRYTHÈME noueux, 219; douleurs articulaires, 222; — papuleux, 224; accidents thoraciques, 226.

ESTOMAC (Cancer de l'), III, 102; perforation de l'— dans l'ulcère simple, III, 93; ulcère chronique simple de l'—, III, 80, 84; ulcère simple et cancer de l'—, III, 97.

ÉTAT de mal dans l'épilepsie, II, 106.

ÉTAT MENTAL des épileptiques dans l'intervalle des accès, II, 124; pendant les attaques, II, 125; après les attaques, II, 127; — des rachitiques, III, 495.

ÉTONNEMENT cérébral, II, 61, 80. *Voy.* APOPLECTIFORME (STUPEUR).

ÉTRANGLEMENT interne. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.

EXANTHÈMES sudoraux, 271; multiplicité de formes; exanthèmes cutanés, muqueux, 272; médicamenteux, 276; chez les individus qui font du pus, chez les femmes en couche, 279, 280; analogie des exanthèmes, des virus et des maladies diathésiques avec les exanthèmes sudoraux, 281.

EXOPHTHALMIQUE (Goître et cachexie), II, 551; *Voy.* GRAVES (Maladie de).

EXPECTATION en médecine, 11; fondée sur la connaissance de la marche naturelle des maladies (exemples, entre autres, variole, 76; scarlatine, 177; érysipèle, 242; dothiéntérie, 347); — dans la pneumonie franche, 874; c'est elle qui a fait le succès de l'homœopathie, 874.

EXPECTORATION, dans la pneumonie franche, 872; dans les abcès pulmonaires, 865; dans la rougeole, où elle a le caractère de celle de la phthisie, 498; dans les hydatides des poumons, 842 et 853.

FACE (Érysipèle de la), 230.

FACIALE (Paralysie) dépendant d'une hémorrhagie cérébrale, II, 51; — ou paralysie de Ch. Bell (*Voy.* PARALYSIE FACIALE); paralysie double de la face, II, 345.

FACULTÉS INTELLECTUELLES (Trouble des) consécutifs à la dothiéntérie, 357; dans l'épilepsie, II, 122; dans la danse de Saint-Guy, II, 239 et 240; dans la dyspepsie, III, 41.

FARADISATION dans la névralgie épilep-