

tiforme, II, 167; dans l'angine de poitrine, II, 548.

**FER**, son inconvénient dans les fausses chloroses, III, 534; dans la maladie de Graves, II, 597; ses avantages dans la chlorose vraie, III, 540

**FESSES** (Érythème des) et des talons dans le muguet, 569.

**FIÈVRE**, d'invasion dans la variole, 45; tombe au moment où l'éruption s'est faite dans la variole discrète, 48; pour revenir au moment de la maturation des pustules, 55; elle persiste dans la variole confluente en raison de la vive inflammation de la peau couverte de pustules, 60; — initiale dans l'encéphalo-méningite, II, 307.

**FIÈVRE** (Influence de la) sur la danse de Saint-Guy, II, 247; sur la coqueluche, II, 513.

**FIÈVRE CÉRÉBRALE**, la paralysie dans la — n'est mobile qu'en apparence, II, 314.

**FIÈVRE INTERMITTENTE** (Stades dans la) de froid, III, 456; de chaud, III, 456; de sueur, III, 457; — (types des), III, 458; quotidiennes, tierces, quarts (plus grande ténacité de la fièvre quarte); fièvres doublées et redoublées, III, 458; — retardante et anticipante, III, 460.

**FIÈVRE MÉNORRHAGIQUE**, III, 636.

**FIÈVRES PALUSTRES**, III, 448; leurs causes, III, 451; *fièvres intermittentes*, III, 450; *fièvres palustres continues*, III, 453; une — peut simuler à son début une fièvre typhoïde et réciproquement, 336, et III, 460; *fièvres palustres pernicieuses*, III, 462; algide, ardente, sudorale ou diaphorétique, III, 463; les *comitæ*: comateuse, délirante, convulsive, III, 464; syncopale, cardiaque, III, 465; hémorragique, III, 465; hématomésique, III, 466; péri-pneumonique ou catarrhale, III, 465; pleurétique, III, 465; cholériforme, dysentérique, III, 466; fièvres intermittentes *subintrantes*, anticipantes, III, 467.

**FIÈVRE TYPHOÏDE**; sa non-identité avec le typhus, 339 (Voy. *DOTHIÉNENTÉRIE*); *fièvre putride hémorragique*, 297.

**FIÈVRE URTICAIRE**, 258.

**FISSURE** à l'anus, III, 201.

**FISTULES** biliaires, III, 244; — internes, III, 246.

**FOIE** (Atrophie jaune aiguë du) dans l'ictère grave, III, 299; état du — dans le diabète sucré, II, 781; hydatides du — III, 262, 268; maladies du — et dia-

bète, II, 776; coliques hépatiques, III, 228.

**FOLIE** épileptique, II, 128; petit mal intellectuel, II, 128; grand mal intellectuel, II, 131.

**FONTE** de la cornée dans la fièvre putride, 363.

**FRISSON** (Le) n'est qu'une convulsion, 200.

**FROID** (Influence fâcheuse du) dans la scarlatine, 191.

**FRONTAL** (Lobe), ses délimitations, II, 697; rapports des lésions du lobe — avec l'aphasie, II, 693.

**FRÔTTEMENTS** (Bruits de) pleuraux, 734.

**FURONCULAIRE** (Diatèse) dans la variole confluente, 66.

**GANGLIONNAIRES** (Engorgements), III, 609. Voy. *ADÉNIE* et *BUBONS*.

**GANGRÈNE PULMONAIRE**, 725; difficulté du diagnostic, 728; deux espèces, l'une d'elles, bronchite gangréneuse, curable, 729; gangrène consécutive à la pneumonie franche, 726; gangrène pulmonaire chez les diabétiques, 726; suite d'embolie, 726; gangrène des poumons chez les individus affectés de kystes hydatiques du foie, III, 274.

**GANGRÈNES** spontanées à la suite de la dothiésentérie, 379; conséquence d'une oblitération artérielle, 380; gangrène humide, conséquence d'une oblitération veineuse, 383; dans le typhus, 395; gangrène de la bouche, de la vulve, dans la rougeole, 213; gangrène spontanée chez les diabétiques, II, 785.

**GANGRÈNEUSE** (Angine) par excès d'inflammation, 413.

**GANGRÈNEUSE** (Bronchite) curable, 729.

**GASTRALGIE**, III, 237; — et coliques hépatiques, II, 396.

**GASTRIQUE** (Hémorragie) dans la maladie de Graves, II, 581; troubles — dans la maladie de Graves, II, 581.

**GASTRITE** chronique, 37, 74.

**GASTRORRHAGIE** dans l'ulcère simple et dans le cancer de l'estomac, III, 96.

**GASTRONOMIE**, III, 209 et 220.

**GÉNITALES** (Diphthérie des parties), 470; eczéma des parties génitales chez les diabétiques, II, 782.

**GLOSSO-LARYNGÉE** (Paralysie), II, 350.

**GLOTTE** (Oedème de la). Voy. *ANGINE LARYNGÉE OEDÉMATÉUSE*.

**GLYCOSE** (Réactions chimiques pour découvrir la), II, 779.

**GLYCOGÈNE** (Matière), II, 800.

**GLYCOGÈNE**, II, 790 et 802; est bien un phénomène physiologique et non point pathologique ou *post mortem*, II, 802.

**GLYCOSURIE**, II, 771; passagère, II, 774; symptomatique d'affections cérébrales, II, 774; dans l'épilepsie, dans l'hystérie, II, 774; alternante chez les gouteux, II, 777; dans les maladies du foie, II, 776; chez les femmes enceintes, II, 800; cause prochaine de la —, II, 799; c'est une maladie (Voy. *DIABÈTE SUCRÉ*); c'est un symptôme, II, 799.

**GOÏTRE EXOPHTHALMIQUE**, II, 551. Voy. *GRAVES* (Maladie de).

**GOUTTE**, III, 342; valeur de ce mot, III, 346; aiguë régulière, III, 347, attaque, III, 349-350; attaque par série de petits paroxysmes, III, 353; chronique régulière, III, 356; ses conséquences, III, 358; chronique d'emblée, III, 362; — *larvée*, III, 363; anormale et viscérale, III, 366; remontée, III, 367; — viscérale et angine de poitrine, II, 535; — viscérale et aphasie, II, 672, 682; — et gravelle (Voy. ce mot), III, 363; — et asthme (Voy. ce mot), II, 484; — et migraine (Voy. ce mot), II, 484; — et affections cutanées, III, 366; parallèle entre la — et le rhumatisme articulaire aigu, III, 372; le rhumatisme chronique, III, 376; le rhumatisme nouveau, III, 377; nature de la goutte, III, 378; traitement, dangers des remèdes prétendus spécifiques, III, 382; troubles sensoriaux dans la —, III, 365; urines dans la —, III, 348; vertiges dans la —, III, 365.

**GOUTTEUSE** (Métastase), III, 375; ophthalmie —, III, 349.

**GRANULEUSE** (Dégénérescence) et cireuse des muscles striés dans la dothiésentérie, 309.

**GRAVELLE** urinaire, III, 366; — de la peau dans la goutte, III, 362; — biliaire et goutte, III, 233.

**GRAVES** (Maladie de), synonymes: goitre exophtalmique; cachexie exophtalmique; exophtalmos cachectique; maladie de Basedow, II, 551; ses trois principaux symptômes (triade symptomatique): 1° hypertrophie du corps thyroïde, II, 554; augmentation des vaisseaux, II, 557; accès de suffocation, II, 574; anatomie pathologique du goitre, II, 579; 2° l'exophtalmos, II, 552; état des yeux, II, 553; anatomie pathologique, II, 553; 3° palpitations du cœur, II, 555; hypertrophie, II, 555; 574, 577; anatomie pathologique, II,

577; symptômes secondaires, II, 558; phénomènes nerveux habituels, II, 567; troubles gastriques et intestinaux, II, 567; relations avec les fonctions utérines, II, 573; forme aiguë, II, 568; forme lente et chronique, II, 570; exacerbations, II, 573; la maladie peut être *fruste*, II, 562, 565; fréquence habituelle du pouls et élévation de la température périphérique, II, 566; tache cérébrale, II, 566; nature de la maladie, II, 583; c'est probablement une névrose du grand sympathique, II, 583; faits et arguments à l'appui, II, 586; traitement, II, 594.

**GROSSESSE** (Glycosurie dans la), II, 800.

**GYMNASTIQUE** dans la danse de Saint-Guy, II, 251.

**HABITUDE** (Effet de l'), dans le traitement de la constipation, III, 195.

**HALLUCINATIONS** dans la chorée, II, 240.

**HAUT MAL**, II, 98.

**HAY FEVER**, II, 473.

**HÉMATÉMÈSE**. Voy. *GASTRORRHAGIE*.

**HÉMATÉMÉSIQUE** (Fièvre), III, 466.

**HÉMATOCÈLE PELVIENNE**, III, 646; ovarienne et cataméniale, III, 648; cachectique, III, 649; par atrésie des organes génitaux externes, III, 654.

**HÉMATURIE** dans la variole, 70; dans la fièvre putride hémorragique. Voy. ce mot.

**HÉMIPLÉGIE ALTERNE**, II, 326; le plus souvent sous la dépendance d'une lésion de la protubérance annulaire, elle n'en est pas le signe absolu, II, 327 et 329.

**HÉMOPTYSIE**, 696; supplémentaire, 697; le diagnostic entre l'— symptomatique de la phthisie pulmonaire et l'— symptomatique de l'apoplexie pulmonaire loin d'être simple, 701; diagnostic avec les hématoméses, 708; — par les hydatides du poumon, 851.

**HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE** ne doit pas être confondue avec l'apoplexie, II, 52; la forme apoplectique proprement dite est rare, II, 54; observation montrant l'apoplexie arrivant graduellement, II, 55; observation d'apoplexie subite, II, 57; ramollissement cérébral, conséquence et non cause de l'hémorragie, II, 59 et 65; traitement, II, 61; hémorragie cérébrale dans l'épilepsie, suite et non cause, II, 102.

**HÉMORRHAGIES** intestinales dans la dothiésentérie, 297; leur peu de gravité, 299; elles sont indépendantes des ulcérations, 304; — méningées, cérébrales



dans le goître exophtalmique, II, 574; dans l'alcoolisme, II, 388; — intestinales, gastriques, pulmonaires, dans la maladie de Graves, II, 581; — intestinales essentielles, III, 94 (*Voy. MELÉNA*); les — par le fait de la trachéotomie dans la maladie de Graves peuvent être mortelles, II, 600; — traumatiques dans l'épilepsie, II, 97; ecchymoses sous-cutanées, II, 100; — dans la coqueluche, par la bouche, par les yeux, II, 515; — par les membranes muqueuses sous-cutanées, par l'oreille, II, 516; — dans la variole (*Voy. VARIOLES NOIRES*); dans la scarlatine, 163, 169; dans la rougeole, 197; épistaxis, 206; *purpura*, 214; dans la diphthérie, 462; dans la dyspepsie (*purpura*), III, 43; — cutanées dans la dothiéntérie (*Voy. PÉTÉCHIES*), 305.

**HÉMORRHAGIQUES** (Pleurésies), 800.

**HÉMORRHOÏDES** et goutte, III, 366.

**HÉPATALGIE** à propos des coliques biliaires, III, 237, 238.

**HÉPATIQUES** (Coliques), III, 228, 234; les vers intestinaux, cause de —, III, 238; — causées par des hydatides du foie, III, 238, 282; — à propos des névralgies, II, 396.

**HÉPATITE AIGÜE** à propos des coliques biliaires, III, 238, 240; à propos des kystes hydatiques du foie, III, 275; dans la goutte, III, 348; hépatite chronique dans la goutte, III, 367.

**HÉRÉDITÉ**, cause prédisposante de l'épilepsie, II, 135; des convulsions de l'enfance, II, 174; de la danse de Saint-Guy, II, 229; de l'asthme, II, 488; de l'ataxie locomotrice progressive, II, 610; de l'atrophie musculaire progressive, II, 666; du rachitisme et de l'ostéomalacie, III, 521; des calculs biliaires, III, 233.

**HERPÈS** des lèvres, des narines, du visage dans la pneumonie, 872.

**HERPÈS** du pharynx. *Voy. ANGINES COUENNEUSES COMMUNES*.

**HERPES** zoster, 263. *Voy. ZONA*.

**HERPÉTIQUE** (Ozène), 627.

**HYDATIDES** du foie, cause de colique hépatique, III, 238, 282; — leur histoire, III, 262; — du poumon, 841.

**HYDATIQUE** (Frémissement), III, 273.

**HYDROCÉPHALE** chronique, II, 321.

**HYDROPHOBIE**, II, 432; n'existe pas dans la rage du chien, II, 444; — morale, II, 441.

**HYDROPIESIS** dans la convalescence de la dothiéntérie, dans la scarlatine (*Voy. ANASARQUE*); hydropiésis de poitrine, 732.

**HYDROTHERAPIE** dans la maladie de

Graves, II, 598, dans la spermatorrhée, II, 752; dans le diabète, II, 806; dans la dyspepsie, III, 60.

**HYPERESTHÉSIE CUTANÉE** au niveau des points d'expansion terminale des nerfs, dans les névralgies, II, 397.

**HYSTERICA** (*Aura*), II, 119 et 147.

**HYSTÉRIE** (Diagnostic différentiel de l') avec l'épilepsie, II, 147.

**HYSTÉRIQUE** (Chorée), II, 272; — (toux), II, 275; influence du changement de lieu, II, 279.

**ICTÈRE** dans la colique hépatique, III, 229, 234 et suiv.; dans les kystes hydatiques du foie, III, 274; — grave, III, 294; — hémorragique, malin ou typhoïde, III, 295; l'atrophie jaune aiguë du foie n'en est pas la lésion indispensable, III, 296, 303; destruction de la cellule hépatique, III, 306; hémorragies multiples, III, 295, 302; — grave des nouveau-nés, III, 310; leucine et tyrosine dans l'urine par le fait de l' — grave, III, 302; état du foie dans l' — grave, III, 303; nature de l' — grave, III, 313.

**ILÉUS**, *Voy. OCCLUSIONS INTESTINALES*.

**IMPUISSANCE**, ses rapports avec la spermatorrhée, II, 735, 749.

**IMPULSIONS SOUDAINES ET IRRÉSISTIBLES** chez les épileptiques principalement, et ses conséquences à en tirer au point de vue médico-légal, II, 74, 74 et 127.

**INCITABILITÉ MUSCULAIRE** (Perte de l'), II, 284; III, 32.

**INCONTINENCE NOCTURNE** de l'urine, II, 757; dans la spermatorrhée, II, 741; rapports de l'incontinence de l'urine avec la spermatorrhée et d'autres névroses, II, 741; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 606; dans l'épilepsie, II, 99.

**INCUBATION** de la variole; sa durée, démontrée par l'inoculation, en général de 8 à 11 jours, 45; dans la varicelle, de 15 à 17 jours, 147; dans la scarlatine ne peut être rigoureusement fixée, 150, 151; semble pouvoir ne durer que vingt-quatre heures, 152.

**INDUCTION** (La méthode d') d'une bien autre valeur que la méthode numérique, 29.

**INFECTION PURULENTE**, III, 682; puerpérale, III, 664; infection purulente dans la variole confluente, 68; dans la dothiéntérie, 377; parotite suppurée dans la rougeole, 212; dans le typhus,

395; dans l'affection hydatique du foie, III, 275.

**INJECTIONS SOUS-CUTANÉES** d'atropine et de morphine dans le traitement des névralgies, II, 417; procédé de M. Lafargue (de Saint-Émilien), 420.

**INOCULATION VARIOLIQUE**, 87.

**INTELLECTUELLE** (*Aura*), II, 126.

**INTERMITTENCE**, III, 454; — des névralgies, II, 403; liées même à des lésions constantes, II, 404.

**INTERMITTENTES** (Fièvres). *Voy. FIÈVRES PALUSTRES*, III, 448.

**INTERMITTENTES** (Névroses), toux, migraine, hoquets, insomnies, flux périodiques, muqueux, façons d'être des fièvres intermittentes palustres, III, 473.

**INTESTINAL** (Catarrhe); cause de diarrhée, III, 108; de la dothiéntérie, 322.

**INTESTINALES** (Hémorragies) dans la dothiéntérie, 297; occlusions —, III, 209; perforations — dans la dothiéntérie, 292.

**INTESTINAUX** (Troubles) dans la maladie de Graves, II, 581; vers — causes de convulsions, II, 175; de toux spasmodique, II, 278; de coliques hépatiques, III, 238.

**INVAGINATION**. *Voy. OCCLUSIONS INTESTINALES*, III, 209.

**INVASION** (Période d') dans la variole, 45; sa durée ordinaire dans la variole discrète et dans la variole confluente, 47; d'autant plus prolongée que la maladie moins sérieuse, 47; sa durée dans la rougeole, 195; sans limites régulières dans la scarlatine, bien qu'ordinairement très-courte, 152.

**IODE**, ses mauvais effets dans la maladie de Graves, II, 596; son utilité dans le rhumatisme noueux, III, 412.

**IPÉCACUANHA** à doses vomitives dans l'hémoptisie, 709; dans la dysenterie, III, 187.

**IRRIGATION** dans l'angine diphthérique, 535.

**ISCHIAGRE**. *Voy. GOUTTE*.

**IVROGNES** (Pneumonie des), 889.

**KÉLOTOMIE** dans le traitement chirurgical des calculs biliaires, III, 245.

**KERMÈS** dans la pneumonie, 879; manière de l'administrer, 883.

**KYSTES** hydatiques du foie, cause de coliques hépatiques, III, 238; leur histoire, III, 268; — de la surface convexe du foie, III, 280; traitement chirurgical, III, 289; ponction simple, III, 289; ponction avec le trocart capillaire

III, 289; incision par couches (procédé Bégin), III, 291; incision après l'application préalable de caustiques (procédé Récamier), III, 291; incision après acupuncture, III, 292; injections iodées, III, 292.

**LACTATION**, causes qui l'influencent, III, 159.

**LARVÉE** (Goutte), III, 363.

**LARVÉES** (Fièvres), III, 472.

**LARYNGÉE** (Angine) couenneuse dans la variole, 68.

**LARYNGÉE** (Angine) œdémateuse, 646.

**LARYNGÉE** (Convulsion), asthme thymique, II, 184.

**LARYNGÉE** (Phthisie), 652.

**LARYNGITE STRIDULEUSE** (faux croup), 635; a quelquefois entraîné la mort, 639; diagnostic différentiel du vrai et du faux croup, 642; survient généralement la nuit, 644; la toux a un caractère spécial, 644.

**LARYNGITE ULCÉREUSE** syphilitique et tuberculeuse et diagnostic différentiel, 665.

**LARYNGOSCOPE** (Emploi du) dans l'aphonie, 672.

**LARYNGO-TRACHÉAL** (Sifflement), dans la coqueluche, II, 506, 508.

**LARYNX** (Cathétérisme du) dans le croup, 539.

**LEUCINE** dans l'urine, dans le cas d'ictère grave, III, 302.

**LEUCOCYTHÉMIE**, III, 594; splénique, III, 597; lymphatique, III, 598; anatomie pathologique, III, 599; hyperplasie du tissu propre de l'organe nécessaire dans la leucocytémie, III, 599; symptômes, III, 606.

**LEUCOCYTOSE**, dans la fièvre typhoïde, 289; théorie de Virchow, 289.

**LÈVRES** (Herpès des) dans la pneumonie, 872.

**LOCOMOTRICE** (Ataxie) progressive, II, 601. *Voy. ATAXIE LOCOMOTRICE*.

**LYSSES**, leur valeur possible dans la rage, II, 450.

**MAL** (Haut). *Voy. ÉPILEPSIE*.

**MALIGNITÉ**, 334, 887; III, 180; III, 480.

**MARIAGES** consanguins, leur influence fâcheuse sur la propagation de l'espèce, II, 140; influence d'un premier mari sur les enfants du second, II, 138; influence des — sur la surdi-mutité, II, 141.

**MÉDECINE** (La), un art bien plus qu'une science, 37 à 41.



**MELANA**, III, 94.  
**MÉNINGÉES** (Hémorragies), dans le goitre exophthalmique, II, 574; dans l'alcoolisme, II, 388.  
**MÉNORRHAGIQUE** (Chlorose), III, 543; fièvre —, III, 636.  
**MERCURIAUX** (Les) utiles dans le traitement de la diphthérie à titre de modificateurs topiques, 523.  
**MÉSÉNTÉRIQUES** (Ganglions), leur altération dans l'adénie, III, 629.  
**MÉTASTASES** goutteuses, III, 371. (*Voy.* ASTHME et MIGRAINE.) — des oreillons sur l'appareil génital, 254; — de certaines affections des organes génitaux sur la parotide, 256.  
**MÉTHODES** en médecine; méthode numérique et méthode d'induction, 29.  
**MICROSCOPE**. Son utilité, souvent exagérée, III, 594.  
**MIGRAINE**, II, 484; III, 363; III, 474.  
**MILIAIRE** dans la scarlatine, 157; dans la dothiéntérie, 321. *Voy.* aussi EXANTHÈMES SUDORAUX.  
**MILIAIRES** (Tubercules), 712.  
**MORT** à la suite de convulsions: 1<sup>o</sup> par asphyxie, II, 188; 2<sup>o</sup> par syncope, II, 190.  
**MORT SUBITE** dans l'angine de poitrine, II, 542.  
**MUGUET**, 563: chez l'adulte, 565; chez l'enfant, 566; causes, affection locale, 567; muguet mixte, 568.  
**MUQUEUSES** (Affections des membranes) dans la syphilis des enfants nouveaux-nés, III, 323.  
**MUQUEUSES** (Membranes), hémorragies par les — dans la coqueluche, II, 515.  
**MUSC** dans le traitement de la pneumonie avec délire, 886, 889.  
**MUSCLES**, leur altération spéciale dans la dothiéntérie, 309.  
**MUSCULAIRE** (Atrophie) progressive, II, 648; — (contractilité) électrique conservée dans la paralysie faciale de cause cérébrale, éteinte dans la paralysie de Bell, II, 336; — (perte de l'excitabilité), II, 284; III, 32; — (sens) de Ch. Bell, II, 621; sentiment d'activité — de Gerdy, II, 621.  
**MYOCARDITE** dans la variole, 171; symptômes et gravité, 72; dans la dothiéntérie, 307.  
**NARINES** (Herpès des) dans la pneumonie, 872.  
**NASALE** (Diphthérie), 460.  
**NATURE MÉDICATRICE**, son rôle dans les maladies, 11.  
**NÉCROSE DES CARTILAGES** du larynx

dans la dothiéntérie, 367; accidents d'œdème de la glotte consécutif, 368; — de la cloison du nez, 372.

**NÉPHRÉTIQUES** (Coliques), III, 359, 366.

**NERVEUSE** (Apoplexie), II, 53.

**NERVEUSE** (Diarrhée), III, 114.

**NERVEUSES** (Affections); leurs transformations les unes dans les autres, II, 137; II, 610; expression de diathèses très-différentes, telles que la diathèse tuberculeuse (exemples, l'asthme, II, 484; la dyspepsie, III, 60).

**NÉVRALGIE** épileptiforme, II, 121; II, 156; l'angine de poitrine en est une forme, II, 120; II, 537; son traitement: impuissance des moyens chirurgicaux, II, 162; bons effets de l'opium, II, 164; de la faradisation superficielle, II, 167.

**NÉVRALGIE** solaire, III, 475.

**NÉVRALGIES**, II, 393; ordinairement symptomatiques, II, 396; hyperesthésie cutanée au niveau des points d'expansion terminale des nerfs, II, 397; points douloureux dans les névralgies, II, 400; point apophysaire, II, 401; point d'expansion terminale, II, 402, 403; névralgies multiples dans la chlorose, II, 403; — ophthalmique dans la cachexie palustre, II, 403; — occipitale et sciatique dans le rhumatisme, II, 403; — dans la sphère d'irritation et de douleur autour de l'accident local des diathèses syphilitique et cancéreuse, II, 403; traitement des —, II, 411; — rebelles à la suite du zona, 269; — palustres (*Voy.* FIÈVRES LARVÉES), III, 472; — rhumatismales, leurs manifestations multiples, II, 486; alternent souvent avec les douleurs articulaires, II, 407; avantageusement traitées par les médications irritantes locales, II, 425; par le sulfate de quinine, II, 423; l'iode de potassium, II, 423; — solaire, III, 475; — syphilitiques différent des douleurs produites par les exostoses, II, 408; — thoracique et cervico-brachiale, II, 543.

**NÉVROPATHIE CÉRÉBRO-CARDIAQUE**, III, 19; nature, III, 21; traitement, III, 22.

**NÉVROSES** périodiques, peuvent être des formes de fièvres palustres larvées (toux spasmodiques, migraine, hoquet, insomnies), III, 474.

**NITRATE D'ARGENT**, dans l'épilepsie, II, 153; dans la diarrhée, III, 127; dans la dysenterie, III, 188.

**NOMÉNCLEATURE** et **NOSOLOGIE**, 21: inutilité en clinique, 24; nécessité de conserver aux maladies leurs noms

anciens, sans signification nosologique, et pourquoi, 22.

**NOUEUX** (Érythème), 219; — (rhumatisme), III, 377, 392.

**NOURRICE** (Choix d'une), III, 157.

**OCCCLUSIONS INTESTINALES**, III, 209; causes, III, 213; symptômes, III, 216; traitement, III, 218; ponction abdominale, III, 219; gastrotonie, III, 220.

**OCULO-PUPILLAIRES** (Phénomènes) dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 608 et 646. *Voy.* VISION (Troubles de la) et YEUX (États des).

**ŒDÈME DE LA GLOTTE** *Voy.* ANGINE LARYNGÉE ŒDÉMATÉUSE.

**OIDIUM ALBICANS**. *Voy.* MUGUET.

**OMBILICATION** (L') des pustules varioliques n'a pas la valeur qu'on lui attribue, 50.

**OPHTHALMIE** exanthémateuse dans la rougeole, 210; ophthalmie diphthérique, 465; ophthalmie goutteuse, III, 349.

**OPHTHALMOSCOPIE**, son utilité dans quelques maladies cérébrales, II, 315-317.

**OPIUM** dans la névralgie épileptiforme, II, 164; dans la danse de Saint-Guy, II, 259; peut être donné à doses énormes, II, 261; cas où il est indiqué dans la coqueluche, II, 525; dans la dyspepsie, III, 52; dans la diarrhée, III, 126, 129; dans la dysenterie, III, 188.

**OREILLE** (Hémorragies par l'), II, 517.

**OREILLONS**, 252.

**OSTÉOMALACIE** (rachitis des adultes), III, 521.

**OTITE** dans la rougeole, 208; peut entraîner l'infection purulente, 211; — grave entraînant la paralysie faciale, II, 337.

**OURLES**. *Voy.* OREILLONS.

**OVARITE** varioleuse, 56.

**OXYÈNE** (Inhalations d') dans la dyspepsie liée à l'anémie, III, 72.

**OZÈNE**, 623; constitutionnel, 624; herpétique, 627; syphilitique, 627; traitement, 629.

**PALPÉBRALE** (Diphthérie), 465.

**PALUSTRES** (Fièvres), III, 448. *Voy.* FIÈVRES INTERMITTENTES et FIÈVRES PALUSTRES; — (névralgies). *Voy.* FIÈVRES LARVÉES, III, 472.

**PAPULEUX** (Érythème), 224.

**PARACENTÈSE DU PÉRICARDE**. *Voy.* PÉRICARDE.

**PARACENTÈSE DE LA POITRINE**. *Voy.* POITRINE.

**PARALYSIE** dans la dothiéntérie, 358; dans la dysenterie, III, 183; dans l'apoplexie, II, 52, 54; — du membre inférieur généralement moins persistante que celle du membre supérieur, valeur pronostique du contraire, II, 67; — dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 607, 608, 609, 613; — de la sensibilité, II, 614; — dans la danse de Saint-Guy, II, 238; — à la suite de l'attaque d'épilepsie, II, 101; — dans la fièvre cérébrale n'est mobile qu'en apparence, II, 314.

**PARALYSIE DIPHTHÉRIQUE**, 494; paralysie du voile du palais consécutive à une diphthérie cutanée, 507; forme bénigne, 505; mort possible par asphyxie, 512; forme grave, 512; sa nature, 518; traitement, 521.

**PARALYSIE DOUBLE** de la face, II, 345.

**PARALYSIE FACIALE**, symptomatique d'une hémorragie cérébrale, moins complète que par affection de la septième paire, II, 51; le muscle orbiculaire n'est jamais complètement paralysé dans l'hémorragie cérébrale, II, 336; la contractilité musculaire électrique est conservée dans cette affection et ne l'est pas dans la lésion de la septième paire, II, 333; — de Ch. Bell, II, 337; ses causes, II, 334; ses symptômes, II, 338; perversion du goût, II, 341; conservation de la sensibilité tactile et même douleurs dans les parties affectées, II, 341; la paralysie exclusivement faciale peut être la conséquence d'une hémorragie cérébrale, II, 335; peut dépendre d'une otite, II, 337; traitement de la paralysie faciale, II, 345.

**PARALYSIE LABIO-GLOSSO-LARYNGÉE**, II, 350; ses symptômes, II, 353; ses lésions, II, 358, 359.

**PARALYSIS AGITANS**, II, 280; n'est pas une paralysie au moins à son début, II, 284; diagnostic différentiel d'avec la sclérose en plaques, II, 291; la lésion anatomique de la — est encore inconnue, II, 292.

**PARAPLÉGIE**, au début de la variole, passagère, quelquefois persiste ou revient dans la convalescence, 47; dans la convalescence de la dothiéntérie, 358; au début, 360; dans le typhus; 335; — réflexe à la suite de coliques hépatiques graves, III, 252.

**PAROTIDES** comme signes pronostiques dans la dothiéntérie, 335; dans le typhus, 395; dans la dysenterie, III, 181.

**PEMPHIGUS** dans la syphilis du fœtus et de l'enfant nouveau-né, III, 320.



- PERCHLORURE DE FER** dans l'angine diphthérique, 541.
- PERCUSSION**, III, 819; découverte par Avenbrugger, III, 821; son procédé, III, 823; procédé de Corvisart, moins parfait, III, 823; plessigraphe, III, 825; plessimètre, 824.
- PERFORATIONS** intestinales dans la dothiéntérie, 292; possibilité de leur guérison, 297.
- PÉRICARDE** (Paracentèse du), II, 1; observations, II, 1-21; aperçu historique, II, 10; innocuité de la ponction et des injections iodées, II, 21; l'opération doit être faite de préférence avec le bistouri, son lieu d'élection, II, 24; paracentèse par aspiration pneumatique, II, 26; sa facilité et son innocuité, II, 27.
- PÉRICARDITE** varioleuse, 71; scarlatineuse, 171.
- PÉRIHYSTÉRIQUES** (Absès), III, 769.
- PERINÉPHRIQUES** (Absès), III, 740; considérations anatomiques, III, 743; causes, 744; migration possible du pus, III, 750; symptômes, III, 758; traitement, III, 766.
- PÉRIPNEUMONIQUE** (Catarrhe), dans la rougeole, 208.
- PÉRIPNEUMONIQUE** (Fièvre pernicieuse) ou catarrhale, III, 465.
- PÉRIPNEUMONIQUES** (Absès), 856. *Voy.* VOMIQUES PÉRIPNEUMONIQUES.
- PÉRITONITES** sans perforations dans la dothiéntérie, 292; leur pathogénie, 296.
- PERNICIEUSES** (Fièvres), III, 462.
- PERTES SÉMINALES**. *Voy.* SPERMATORRÉE.
- PÉTÉCHIES** dans la dothiéntérie, 321; dans le typhus (éruption mûricolore) (*mulberry rash*), 391.
- PEYER** (Glandes de), dans l'adénie, III, 628; leur lésion caractéristique dans la dothiéntérie, 287; parallélisme entre leur lésion et la marche de la température dans la dothiéntérie, 317.
- PHARYNX** (Herpès du), 404.
- PHLEGMATIA ALBA DOLENS** dans la dothiéntérie, 363; dans le typhus, 395; — et phlébite oblitérante, III, 695.
- PHLEGMONEUSE** (Angine), 423.
- PHLEGMONS** périhyستériques, III, 769; considérations anatomiques, III, 769; causes, III, 772; pelvi-péritonite, III, 778; sa différence d'avec le phlegmon périhyستérique, III, 781; traitement, III, 786.
- PHTHISIE** consécutive à la rougeole, 214; à la coqueluche, III, 514; au diabète sucré, II, 787.
- PHTHISIE DYSPEPTIQUE**, III, 44.
- PHTHISIE LARYNGÉE**, 653.
- PHTHISIE PULMONAIRE**, 712; phthisie rapide (c'est la phthisie ordinaire marchant rapidement), 713; phthisie aiguë ou galopante, 714; deux formes : 1<sup>o</sup> catarrhale, 718; 2<sup>o</sup> typhoïde, 719.
- PHTHISURIE**, II, 771, 780.
- PIGMENTATION** (Théorie de Frerichs sur la) dans les fièvres intermittentes pernicieuses, III, 467; sa réfutation, III, 469.
- PILULES** (Formule de) antidiarrhéiques, III, 124, 144.
- PITUIE** (Vomissements de) dans la dyspepsie, III, 37, 79.
- PLAQUES DE PEYER**. *Voy.* PEYER (Glandes de).
- PLESSIGRAPHE**, III, 825. *Voy.* PERCUSSION.
- PLESSIMÈTRE**, III, 824. *Voy.* PERCUSSION.
- PLEURAUX** (Bruits de frottements), 734, 735.
- PLEURÉSIE**, 732; bruit skodique, 733; interprétation des bruits de frottement (râles crépitants de la pleurésie), 734, 735; persistance du souffle dans les épanchements excessifs, 736; souffle et voix amphoriques, 736; leur explication, 739; fluctuation intercostale, 745; difficulté du diagnostic entre certains cas de pleurésie chronique et la tuberculisation pulmonaire, 742; pleurésie purulente dans la scarlatine, 171, 175; pleurésie dans la coqueluche, II, 512; pleurésies suppuratives, 776, et vomiques pleurales, 869; pleurésies traumatiques, 787; la pleurésie latente manifestation fréquente de la diathèse tuberculeuse, 790; pleurésies hémorragiques généralement cancéreuses, 800; température dans la pleurésie, 775; sert au diagnostic différentiel d'avec la pleurodynie, 775; d'avec la pneumonie, 876; s'abaisse brusquement après la paracentèse de la poitrine, 774.
- PLEURÉTIQUE** (Fièvre pernicieuse), III, 465.
- PLEURODYNIE** (Diagnostic différentiel de la) d'avec l'angine de poitrine, II, 543; d'avec la pleurésie, 775.
- PLÈVRE** (Épanchements traumatiques de sang dans la), 833.
- PNEUMO-HÉMORRHAGIE** (Apoplexie pulmonaire), 703, 704.
- PNEUMONIE** chronique, 719; — érysipé-

- lato-phlegmoneuse, 884; — franche, 872; catarrhe péripneumonique, 871, — bilieuse; ataxique; adynamique; arthritique; rhumatismale, 871; traitement de la — franche, 876; — avec délire par excès de fièvre, 886; par suppuration du parenchyme pulmonaire, 887; par des complications phlegmasiques siégeant ailleurs que dans la poitrine, 887; par la malignité de la cause qui a produit la pneumonie, 887; — ataxique, 887 (ici le musc trouve son indication) (*Voy.* Musc), 889; — des ivrognes, 889; — du sommet, 892; n'est pas nécessairement accompagnée de délire, 892; ni nécessairement grave, 893; sinon en cas de diathèse tuberculeuse, 893; — suppurative dans la variole confluyente, 69; — dans le typhus, 395; — dans la diphthérie, 451; — consécutive à la trachéotomie, 552; marche de la température dans la —, 875; éclaire le diagnostic différentiel d'avec la pleurésie, 876.
- PODAGRE**. *Voy.* GOUTTE.
- POIS MÉDICAMENTEUX** (Formule de) dans le traitement de la névralgie sciatique, II, 419.
- POITRINE** (Angine de), II, 527; — essentielle, 527; — liée à une diathèse rhumatismale ou goutteuse, II, 535.
- POITRINE** (Paracentèse de la), observation, 746; historique, 736; circonstances qui nécessitent la paracentèse de la poitrine, 765; dans la pleurésie suppurative, 776; dans la pleurésie traumatique, 787; dans la pleurésie latente, 790; dans l'hydropneumothorax, 792; indications de l'opportunité de la paracentèse de la poitrine, 806; les signes fournis par la percussion et par l'auscultation peuvent seuls servir de guides, 808; procédé opératoire, 810; instruments, lieu d'élection, 812; nécessité de ponctionner hardiment, 815; phénomènes survenant pendant l'écoulement du liquide, 816; quintes de toux, 816; écoulement de sang par la plaie, 817; couleur rosée de la sérosité, 817; complication de l'opération dans la pleurésie aréolaire, 815; objections contre la paracentèse, 818; craintes imaginaires de syncope, de rupture de vésicules pulmonaires et de l'introduction de l'air dans les veines, 818; de blesser l'artère intercostale, 821; possibilité de reproduction du liquide, 821; la paracentèse ne prolonge pas la durée de la pleurésie, 823; elle ne convertit pas les épanchements séreux en épanchements
- purulents, 824; — par aspiration pneumatique, 827; drainage de la plèvre par le siphon, 829; — dans les cas d'épanchements traumatiques du sang dans les plèvres, 833; son inutilité, ses dangers et pourquoi (*Voy.* ÉPANCHEMENTS DE SANG), 838; la température s'abaisse brusquement après la ponction de la poitrine, 774.
- POLYDIPSIE**, II, 808; sa gravité, II, 814.
- PORTE** (Veine), constriction de ses rameaux capillaires dans la cirrhose et ce qui en résulte, III, 562, 564, 566.
- PORTES** (Veines) accessoires, ce que c'est, III, 563.
- POULS**, dans les maladies du cœur, différents tracés par le sphygmographe, II, 31; servent au diagnostic, II, 31; — veineux, II, 32; (lenteur du) — dans la seconde période de la fièvre cérébrale, II, 308; sa fréquence extraordinaire dans la troisième période, II, 312.
- POUMON** (Absès du), *Voy.* ABSÈS PULMONAIRES. (Gangrène du), *Voy.* GANGRÈNE PULMONAIRE; hydatides du —, 841; beaucoup plus fréquentes que celles de la plèvre, 844; conséquences de leur ouverture spontanée dans la cavité pleurale, 845; difficulté du diagnostic, 847; 850; valeur de la voussure thoracique, 850; symptômes, 851; passage des hydatides du foie dans la cavité pleurale, 847; III, 284; caractères de l'expectoration, 853; pronostic, 854; conséquences possibles : hémorragies mortelles; hydropneumothorax, 854; nécessité de l'expectation, 854.
- PRONOSTIC**, son importance en médecine, 155.
- PROSTATE** (Compresseur de la), son emploi dans l'incontinence nocturne de l'urine, II, 769; dans la spermatorrhée, II, 753.
- PUERPÉRALE** (Infection), III, 664.
- PULMONAIRES** (Absès) dans la pneumonie lobulaire des enfants, 857; absès — non métastatiques, 857; vomiques —, 859; catarrhe — dans l'asthme, II, 463; dans la goutte, III, 367; dans la dothiéntérie, 324; emphysème —. *Voy.* EMPHYSÈME; gangrène —, 725; chez les diabétiques, 726; par embolie, 726; perforation —, diagnostic différentiel d'avec la dilatation des bronches, 683; phthisie —, 710; tuberculisation — chez l'enfant, 719.
- PURGATIFS** dans la diarrhée, III, 122;



dans la dothiéntérie, 229; dans la dysenterie, III, 186.

**PURULENTE** (Infection), III, 664.

**PUS** (Empyème de) (Paracentèse de l'), 822; laisser une canule à demeure et faire des injections iodées, 823.

**PUSTULES VARIOLIQUES**, leur histologie, 50; leur cicatrisation, 57; dans la variole confluyente, 66; dans la variole modifiée, 88.

**PUTRIDITÉ** dans la dothiéntérie, 329; dans la dysenterie, III, 180.

**QUININE** (Sulfate de); cinchonine, III, 480, 486; et succédanés des préparations quinquiques, III, 486. *Voy.* ARSENIC.

**QUINQUINA** (son mode d'administration dans les fièvres intermittentes palustres), III, 476; méthode romaine (de Torti), III, 476; méthode anglaise (de Sydenham), III, 476; méthode française (de Bretonneau), III, 480; méthode française modifiée, III, 480; mode d'administration du quinquina dans les fièvres perniciosus et dans les fièvres larvées, III, 484.

**RACHIALGIE** dans la variole, 46.

**RACHITIS**, III, 490; historique, III, 491; déformations rachitiques, III, 496; ordre de succession des déformations, III, 501; ne sont pas exclusivement dues à l'action des muscles ou de la pesanteur, III, 504; fractures rachitiques, III, 504, 509; anatomie pathologique, III, 505; physiologie pathologique, 1<sup>o</sup> période de fluxion et d'épanchement, III, 506; 2<sup>o</sup> période de ramollissement et de transformation, III, 507; 3<sup>o</sup> période de reconstitution et de consolidation, III, 510; cette période peut manquer et être remplacée par la consommation, III, 512; symptômes généraux, III, 512; marche de la maladie, III, 516; étiologie, III, 517; — intra-utérin, III, 504; action possible de l'acide lactique dans le —, III, 514; — et scrofule, leurs différences, III, 517; influence du rachitisme sur la dentition, III, 166; III, 495; traitement (huile de foie de morue), III, 529.

**RAGE**, II, 432; chez le chien, II, 442; chez l'homme, II, 445; lysses, et leur valeur, II, 450; priapisme, II, 436; température terminale, II, 448; traitement, II, 458.

**RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL**, 1453; conséquence de l'hémorrhagie, II, 59; diagnostic différentiel avec l'hémorrhagie, II, 64; l'aphasie est un indice très-probant de —, II, 706.

**RATHANIA** dans les fissures à l'anus, III, 206.

**RATE** (Adénie de la), III, 629.

**RÉGIME** des malades, 77, 242, 350, 352, 542; II, 803; III, 46; III, 189; III, 547.

**REIN**, ses altérations possibles dans la dothiéntérie, 305.

**REINS MOBILES**, III, 797; fréquence méconnue de cette lésion, III, 800; causes anatomiques, III, 803; physiologiques, III, 801; erreurs de diagnostic nombreuses, III, 803, 804; traitement, III, 808.

**RELÂCHEMENT DES SYMPHYSES** du bassin, III, 810; ordinairement méconnu, III, 810; traitement, III, 815.

**RESPIRATION** (L'irrégularité de la), phénomène de grande valeur dans la fièvre cérébrale, II, 311.

**RÉTENTION D'URINE** au début de la variole, *Voy.* DYSURIE; — cause d'anasarque, III, 729.

**REVACCINATIONS** (leur utilité), 131.

**RÉVULSIVE** (Médication), ses inconvénients dans la coqueluche, II, 523.

**RHUMATISMALE** (Dysenterie), III, 179; pneumonie —, 872.

**RHUMATISME** dans la scarlatine, 166; dans l'érythème noueux, 223; dans l'érythème papuleux, 228; — et danse de Saint-Guy, II, 230; — et asthme, II, 487; — et angine de poitrine, II, 535; — articulaire aigu, III, 414; — cérébral, II, 816; — noueux, III, 392; névralgies occipitale, sciatique dans le —, II, 403.

**ROSÉOLE**, 217; ce qui la distingue de la rougeole, 217.

**ROUGEOLE**, 194; longueur de la période d'invasion, 195; éruption, 196; marche de la température, 199; altération du sang, 199; complications. 200 et suiv.

**SAIGNÉE** (De la) dans la diphthérie et le croup (son inutilité et ses inconvénients), 522; dans la pneumonie franche (son inutilité le plus souvent), 876; dans la maladie de Graves, II, 598; dans l'aménorrhée, III, 642; dans l'apoplexie et l'hémorrhagie cérébrale (son inutilité et pourquoi), II, 59; inconvénients des saignées locales par les sangsues dans les convulsions.

**SALIVATION** (La) dans la variole confluyente, 61, 62.

**SANG** (Altération du), dans la variole, 51; dans la scarlatine, 156; dans la rougeole, 199; dans la diphthérie, 490; dans la dothiéntérie, 308; dans la leucocytémie, III, 595.

**SCARLATINE**, 148; sa gravité suivant les épidémies; maladie très-simple ou singulièrement grave, 148; la durée de l'incubation ne peut être rigoureusement fixée, 150; semble ne pouvoir durer que vingt-quatre heures, 152; période d'invasion, 152; phénomènes qui la caractérisent, 154; fièvre vive, accidents nerveux, 154; albuminurie, 169; suppurations consécutives, 173; température dans la scarlatine, 156, 160; tuméfaction des mains et des pieds, 158; — fruste, 174; emploi et utilité des affusions froides dans la scarlatine, 180; gravité de la scarlatine compliquant la fièvre puerpérale, 184.

**SCARLATINEUSE** (Péricardite), 171.

**SCARLATINIFORMES** (Éruptions) dans la variole, 81, 82; dans la diphthérie maligne, 458.

**SCLÉROSE EN PLAQUES** disséminées, II, 290; formes, II, 290; nature du tremblement, II, 290; lésions spéciales, II, 291.

**SCROFULE** et rachitisme (leurs différences), III, 517.

**SÉMINALES** (Pertes). *Voy.* SPERMATORRHÉE.

**SÉNILE** (Tremblement), II, 280.

**SENSIBILITÉ** (Paralysie de la), dans l'ataxie locomotrice progressive où elle peut manquer, II, 616; troubles de la — dans la tétanie, II, 211; dans la danse de Saint-Guy, II, 239.

**SEVRAGE**, III, 171; accidents du —, III, 144, 520.

**SINAPISÉS** (Bains), III, 146.

**SOLAIRE** (Névràlgie), III, 475.

**SOUFFLE** et voix amphoriques dans la pleurésie, 736; — dans l'oreille et — voilé, valeur très-peu pratique de ces signes, 865.

**SOUFFLES** vasculaires, III, 537; leur valeur, III, 538; discussion à ce sujet, III, 539.

**SPASME** de la portion dure de Ch. Bell, II, 343; — fonctionnels idiopathiques, II, 268.

**SPASMODIQUE** (Toux) causée par des vers intestinaux, II, 278.

**SPÉCIFICITÉ**, son importance en médecine, 574; spécificité de la cause, 576 et 578; spécificité des symptômes, 579, 582; des médicaments, 589.

**SPERMATORRHÉE**, II, 730; troubles des sens dans la —, II, 738; — par suite d'une trop grande longueur du prépuce, II, 740; relation de la — avec d'autres affections nerveuses, II, 741; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 607.

**SPHYGMOGRAPHE**, son utilité diagnosti-

que dans les maladies du cœur, II, 31; son application dans le vertige épileptique, II, 114.

**SPINALE** (Forme) de la dothiéntérie, 332.

**STATISTIQUE ET MÉDECINE**, ses prétentions étrangement exagérées, 33; III, 163.

**STÉATOSE** des organes dans l'alcoolisme chronique, II, 383; sa pathogénie, II, 389, 390.

**STOMACHO LESO** (Vertiges *a*), III, 1.

**STRIDULEUSE** (Laryngite) (faux croup), 635; a quelquefois entraîné la mort, 639; diagnostic différentiel du vrai et du faux croup, 644; quelquefois embarrassant. 641; la — survient généralement la nuit; la toux a un caractère spécial, 642, 643; pathogénie de l'attaque, 637.

**STRYCHNINE** dans la danse de Saint-Guy, II, 255; dans l'incontinence nocturne d'urine, II, 768; en applications locales dans la paralysie faciale, II, 345.

**SUCRÉ** (Diabète), II, 771. *Voy.* DIABÈTE.

**SUDORALE** (Diarrhée), III, 112; — (Fièvre perniciosus), 463.

**SUFFOCATION** (Accès de) dans le goître exophthalmique, II, 574.

**SURDI-MUTITÉ** (Influence des mariages consanguins sur la), II, 141.

**SURDITÉ** comme signe pronostique dans la dothiéntérie, 335; dans le typhus, 395.

**SYMPATHIQUE** (la maladie de Graves est une névrose du), II, 583.

**SYCCOPOLE** (Fièvre perniciosus), III, 464.

**SYPHILIS DES ENFANTS NOUVEAU-NÉS**, III, 317; *chez le fœtus*, III, 318; ses conséquences: avortement, III, 319; pemphigus, III, 320; suppuration du thymus, des poumons, III, 322; *chez l'enfant nouveau-né*, elle se développe rarement avant la deuxième semaine et après le huitième mois, III, 322; incubation, évolution essentiellement chronique chez les uns, essentiellement aiguë chez les autres, III, 322; affection des membranes muqueuses dans la syphilis des enfants nouveau-nés, III, 323; aspect particulier du visage, III, 328; lésions viscérales, III, 330; conditions pathogéniques, III, 330; syphilis héréditaire de par la mère, III, 331; de par le père, III, 333; syphilis inoculée III, 334; transmission de la syphilis à la nourrice par son nourrisson, III, 335; syphilis transmise par la vaccination,