

**Application.** — Appliquer horizontalement le plein de la cravate à la région lombaire, ramener les chefs en avant de chaque côté du bassin, conduire isolément chacun des chefs, en passant sur le pli de l'aîne, vers la face interne de la cuisse correspondante, contourner cette dernière en arrière, et venir fixer chaque chef sur la partie de la cravate qui a croisé le pli inguinal de ce côté.

**Usages.** — Mêmes usages que le spica double, auquel elle est inférieure.

### C. TRIANGLE-BONNET DES MOIGNONS (Mayor).

Les dimensions du triangle varieront avec le volume du membre.

**Application.** — La base est placée sur la face postérieure du membre à une distance convenable au-dessus de l'ex-




Fig. 101. — Cravate inguinale.




Fig. 102. — Triangle-bonnet des moignons.

trémité du moignon ; le sommet est ramené d'arrière en avant en recouvrant le moignon ; les deux chefs de la base sont conduits horizontalement en avant, se croisent sur le sommet qu'ils maintiennent, et sont ensuite noués, ou fixés avec des épingles (fig. 102).

**Usages.** — Ce bandage est plus simple que le récurrent et doit lui être préféré ; cependant l'emploi des bandes de gaze a bien simplifié la contention des pansements sur les moignons.

On peut employer un triangle disposé de la même manière pour envelopper *la main ou le pied* (triangles de la main ou du pied).

### II. — Bandages pleins de la tête.

#### 1° Triangle-bonnet fronto-occipital (Mayor).

**Pièces du bandage.** — Linge ou mouchoir de 80 centim., carré, plié en triangle.

**Application.** — La base du triangle est placée sur le



Fig. 103. — Triangle occipito-frontal.



Fig. 104. — Triangle occipito-mentonnier.

front, le sommet est replié en arrière vers la nuque, où vont le fixer, en s'entre-croisant, les chefs conduits horizontalement à droite et à gauche, puis ramenés latéralement en avant pour être noués ensemble ou mieux fixés



avec des épingles. Appliqué en sens inverse, c'est-à-dire la base à la nuque et le sommet rejeté vers le front, il constitue le triangle *occipito-frontal* (fig. 103).

**Usages.** — Ce bandage maintient assez bien les pansements sur le crâne et peut remplacer avantageusement la capeline, etc.

### 2° Triangle occipito-mentonnier (Mayor).

**Pièce du bandage.** — Triangle long de 1 mèt., haut de 50 centim.

**Application.** — Mettre la base du triangle sur la partie postéro-supérieure du crâne, le sommet tourné en arrière, conduire les deux extrémités en bas et les croiser au-devant et au-dessous du menton pour les assujettir ensuite, chacune d'un côté, sur les régions temporales ou auriculaires; le sommet est alors replié latéralement, soit en avant, soit en arrière, et fixé par une épingle (fig. 104).

**Usages.** — Mayor considère ce triangle comme devant remplacer la fronde du menton et les chevestres, ce qui est une exagération.

Nous ne ferons que mentionner le triangle *occipito-auriculaire* assez semblable au précédent et destiné à maintenir des topiques sur les régions temporale, parotidienne, sous-maxillaire.

### 3° Bandeau mono et binoculaire.

Le *bandeau monoculaire*, qui se fait avec un mouchoir plié en cravate, est connu de tout le monde et ne mérite pas description.

Le *bandeau monoculaire*, décrit par Guillemin, nous paraît préférable à tous ceux proposés: Prendre une bande de 7 centim. de largeur et assez longue pour faire une fois et demi le tour de la tête; pratiquer sur son bord inférieur et à égale distance des deux extrémités une fente verticale de 2 centim. On place alors le bandeau au-devant des yeux de manière que la fente corresponde à la racine du nez, puis les deux extrémités sont conduites vers l'occiput, où on

les entre-croise pour les fixer ensuite avec des épingles (fig. 105).

### 4° Couvre-chef (Guillemin).

**Pièce du bandage.** — Mouchoir carré de 60 centim. de côté.

**Application.** — Poser le mouchoir sur la tête de manière que le bord antérieur, placé horizontalement, tombe jusqu'à l'extrémité du nez; relever et replier ce bord de telle sorte que le repli corresponde à la base du front, puis en conduire les deux angles à la partie postérieure de la tête,




Fig. 105. — Bandeau binoculaire.

Fig. 106. — Couvre-chef arabe.

où ils sont fixés l'un à l'autre avec une épingle. Prendre ensuite les deux angles postérieurs et les ramener en avant sous le menton, où on les réunit l'un à l'autre par un nœud (fig. 106).

**Usages.** — Ce bandage est à préférer au grand plein quadrilatère de la tête ou grand couvre-chef, lourd, difficile à bien appliquer et à supporter, et dont nous ne parlerons pas.



## III. — Bandages pleins du tronc.

## a. THORAX

1<sup>o</sup> Cravate dorso-bis-axillaire (Mayor).

Pièce du bandage. — Cravate de 1 mètre.

**Application.** — Placer obliquement le plein entre les deux épaules et diriger le chef le plus élevé sur l'épaule correspondante qu'il va contourner pour revenir en arrière par l'aisselle du même côté, tandis que le chef inférieur




Fig. 107. — Cravate dorso-bis-axillaire.

passe sous l'aisselle de son côté, embrasse l'épaule en la contournant de bas en haut, et revient en arrière ; les deux chefs sont ensuite, soit noués ensemble, soit fixés isolément l'un près de l'autre sur le plein de la cravate.

Lorsqu'on n'a pas à sa disposition une cravate assez longue, on se sert de deux cravates ; une d'elles, la plus courte, entoure une des aisselles, en anneau et est nouée en arrière ; le plein de la seconde est placé verticalement sur la face antérieure de l'autre aisselle et ses deux chefs sont conduits en arrière en passant l'un sur l'épaule, l'autre sous l'aisselle, pour venir se fixer à l'anneau précédent comme l'indique la figure 107.

**Usages.** — Ce bandage est destiné à attirer les épaules en arrière, spécialement dans les fractures de la clavicule ; il est difficile à supporter lorsqu'il est fortement tendu à cause de la pression qu'il exerce sur les épaules et dans le creux axillaire.

2<sup>o</sup> Triangle thoraco-scapulaire (Mayor).

Pièce du bandage. — Triangle de 90 centim. à 1 mèt. de long. et de 60 centim. de hauteur.

**Application.** — Placer la base du triangle au bas du thorax et conduire les deux chefs horizontalement autour




Fig. 108. — Triangle thoraco-scapulaire.

de la poitrine en arrière de laquelle on les fixe un peu sur le côté ; diriger le sommet sur l'une ou l'autre épaule, puis, au moyen de l'adjonction d'un ruban, aller le fixer en arrière à la portion horizontale (fig. 108).

Ce triangle s'applique de même sur la face postérieure de la poitrine qu'il recouvre ; c'est alors le *triangle thoraco-scapulaire postérieur*.

On peut aussi se servir d'un linge carré replié en triangle qu'on dispose comme le triangle thoraco-scapulaire antérieur, seulement le sommet relevé au-devant du sternum est dédoublé et chacun des angles est porté sur un des



côtés du cou en arrière duquel on les noue : c'est le *triangle sternal* de Rigal (de Gaillac).

**Usages.** — Ces triangles servent à maintenir des topiques sur la région antérieure ou postérieure de la poitrine.

3° *Triangle-bonnet du sein* (Mayor).

**Pièce du bandage.** — Triangle de 1 mèt. de long et de 50 centim. de hauteur.

**Application.** — Placer obliquement la base du triangle sous le sein malade, diriger l'extrémité inférieure sous l'ais-



Fig. 109. — Triangle-bonnet du sein.

selle correspondante, l'extrémité supérieure sur l'épaule opposée et les réunir derrière le cou ou l'omoplate ; relever ensuite au-devant de la mamelle affectée le sommet du triangle, le porter sur l'épaule et aller le fixer en arrière près de la jonction des deux chefs (fig. 109).

**Usages.** — Sert à soutenir les mamelles et à y maintenir des pansements.

4° *Bandage thoracique latéral* (Rigal, de Gaillac).

**Pièce du bandage.** — Mouchoir ou linge carré plié en triangle.

**Application.** — Appliquer la base horizontalement sur un des côtés de la partie inférieure du thorax et porter les extrémités autour de la poitrine sur un des côtés de laquelle




Fig. 110. — Bandage thoracique latéral.

on les noue ; séparer, c'est-à-dire dédoubler les deux sommets du triangle et les faire passer l'un en avant l'autre en arrière de la poitrine pour aller les nouer ou les réunir à l'aide d'un lacet sur l'épaule opposée (fig. 110).

**Usages.** — Destiné à maintenir des pansements sur les parois latérales du thorax.

5° *Bandage de corps ou plein de la poitrine et de l'abdomen.*

Le bandage de corps est un des bandages les plus fréquemment employés, et, malgré les critiques qui lui ont été adressées, c'est un des plus utiles pour maintenir des



pansements autour de la poitrine ou de l'abdomen, ou y exercer une constriction.

**Pièces du bandage.** — Il est formé d'une pièce de linge représentant un rectangle assez long pour entourer le thorax et proportionnellement large; une serviette ordinaire pliée dans le sens de sa longueur peut aussi être employée. On fixe sur le milieu du bord supérieur la partie moyenne d'une bande de 1 mèt. de long, repliée en deux sur elle-même; on a ainsi deux *bretelles ou scapulaires*; si le bandage est destiné à l'abdomen, la bande double devra être fixée sur le milieu du bord inférieur et constituée alors les *sous-cuisses*; au lieu d'une bande on peut employer la cravate cervico-thoracique de Mayor qui se dispose comme un fichu ou foulard une fois le bandage appliqué.

**Application.** — On entoure la poitrine avec le linge rectangulaire dont les extrémités sont croisées en avant et




Fig. 111. — Bandage de corps

maintenues l'une sur l'autre par deux ou trois épingles. On conduit alors d'arrière en avant chaque chef de la bande par-dessus l'épaule correspondante et on les fixe sur la partie antérieure du bandage (fig. 111).

Lorsque le bandage enveloppe l'abdomen, les chefs de la bande sont dirigés d'arrière en avant sous le périnée et

viennent se fixer sur la partie antérieure du bandage. On peut encore dans ce cas, pour empêcher celui-ci de glisser, le maintenir aussi par un scapulaire.

#### b. ABDOMEN

##### *Triangle de l'abdomen.*

**Pièce du bandage.** — Triangle d'environ 90 centim. à 1 mèt. de long, et 30 centim. de haut.

**Application.** — Placer le plein du triangle horizontalement à hauteur de l'ombilic, le sommet pendant en bas, diriger les chefs autour du corps pour aller les nouer sur un des côtés, conduire ensuite le sommet d'avant en arrière sous le périnée; mais il est préférable de tronquer




Fig. 112. — Triangle de l'abdomen.

Fig. 113. — Bonnet d'une fesse.

le sommet et d'y fixer un ou mieux deux lacs qui contourneront plus facilement le scrotum et pourront être ramenés sur la face externe de chaque cuisse pour venir s'arrêter sur la partie antérieure du triangle (fig. 112).



## c. BASSIN

## 1° Triangle coxo-pelvien ou bonnet d'une fesse (Mayor).

**Pièces du bandage.** — 1° Cravate longue de 1 m. 50 ; 2° triangle de 1 mèt. de long et 0 m. de hauteur. Ce bandage, très commode, peut facilement se faire avec une ceinture quelconque et un mouchoir.

**Application.** — Placer la cravate en ceinture (ou encore une bande longue de 1<sup>m</sup>,20) et la nouer ; appliquer ensuite la base du triangle au-dessous du grand trochanter et conduire les deux extrémités l'une en dehors, l'autre en dedans de la partie supérieure de la cuisse autour de laquelle on les fixe après les avoir entre-croisées si c'est nécessaire ; la pointe du triangle est alors dirigée en haut, engagée sous la ceinture, repliée sur elle et fixée (fig. 113).

## 2° Triangle pelvien postérieur ou bonnet des deux fesses (Mayor).

**Pièce du bandage.** — Triangle long de 1 m. 20 à 1 m. 50 à la base, et haut de 0 m. 50.

**Application.** — Placer le plein de la base du triangle horizontalement à la région sacrée et conduire les chefs de chaque côté autour de l'abdomen, sur la partie antérieure duquel on les noue ; le sommet, dirigé en bas, est conduit entre les fesses, sous le périnée, relevé sur le pubis et fixé sur la partie antérieure du bandage avec un bout de bande ou de ruban de fil s'il n'est pas assez long (fig. 114).

**Usages.** — Ces deux bandages sont extrêmement utiles pour maintenir des pansements sur les régions fessières.

## 3° Triangle scroto-lombaire ou bonnet du scrotum ; suspensoir (Mayor).

**Pièces du bandage.** — 1° Ceinture ou cravate de 1 m. 20 à 1 m. 50 de long ; 2° petit triangle de 0 m. 70 de long et de 0 m. 40 à 0 m. 50 de haut.

**Application.** — Placer la ceinture ou cravate autour du bassin et la nouer ; appliquer la base du triangle, tournée en arrière, sous le scrotum, et conduire les chefs chacun d'un côté en haut vers la ceinture qu'ils contour-




Fig. 114. — Bonnet des deux fesses.

Fig. 115. — Bonnet du scrotum.

nent en passant d'abord en avant, puis au-dessus, et enfin en arrière entre elle et les téguments ; ceci fait, on attire les extrémités libres de ces chefs en dehors de leur partie ascendante, puis on les ramène l'un vers l'autre en croisant la face antérieure de celle-ci et on les noue sur la ligne médiane (fig. 115).

**Usages.** — Suspensoir pratique seulement pour la contention des pansements.