

progressive par les bougies ou les mèches qu'il faut recourir. — Toutefois cette méthode n'est pas sans dangers; bien des perforations ont eu lieu de cette manière; la dilatation, autant que possible, doit donc être pratiquée par le chirurgien avec une prudence extrême. — On fera bien chaque jour de reprendre un ou deux numéros au-dessous de celui qu'on aura employé la veille; cette recommandation sera surtout rigoureusement suivie, lorsqu'on voudra passer à un numéro supérieur.

La lenteur, les ennuis de ce long traitement, ses succès momentanés, ont conduit quelques auteurs à la dilatation forcée, à la divulsion; cette méthode ne nous paraît applicable que dans les rétrécissements voisins de l'anus et remontant peu dans le rectum; elle sera surtout efficace contre l'élément spasmodique qui s'ajoute parfois à des lésions peu importantes; on pourra employer soit la dilatation avec les pouces, suivant la méthode de Récamier, soit les instruments spéciaux inventés pour la divulsion.

Mais cette pratique a été suivie d'accidents graves, rupture de l'intestin, phlegmons pariétaux, cellulite pelvienne (Verneuil, Trélat). On préférera, dans la majorité des cas, à toutes les autres méthodes de traitement, la rectotomie, c'est-à-dire l'incision du rétrécissement. Or ici, il faut bien distinguer: La rectotomie peut ne s'adresser qu'au rétrécissement lui-même: *rectotomie interne*. Faite avec le bistouri boutonné, avec toutes les précautions possibles, celle-ci expose toujours aux hémorrhagies, aux suppurations diffuses, à la perforation du péritoine ou des organes voisins. — Elle ne convient qu'aux rétrécissements très limités, valvulaires. La *rectotomie externe* est tout autre. Elle comporte la section du rectum et de toutes les parties molles avec la peau en arrière dans toute la hauteur du rétrécissement; on peut la faire au bistouri, au thermocautère, ou bien (rectotomie linéaire) avec l'écraseur de Chassaignac ou l'anse galvanique; après la section, la réparation se fait lentement. On a le temps d'appliquer des pansements sur les ulcérations qui avoisinent le rétrécissement. La cicatrisation une fois obtenue, on devra souvent employer et continuer longtemps l'usage de corps dilatants. Cependant la guérison s'obtient parfois sans que l'on ait recours à ce moyen complémentaire. On aura parfois à ouvrir des abcès et des fistules en même temps que l'on pratiquera la rectotomie.

La création d'un anus artificiel temporaire permettrait, au dire des chirurgiens anglais, d'appliquer aux rétrécissements un traitement plus efficace; cette opinion, défendue par Kahn en Allemagne, n'a pas trouvé chez nous de partisans.

## CHAPITRE IX

### TUMEURS DIVERSES DE L'ANUS ET DU RECTUM.

Les tumeurs sacro-coccygiennes, dont nous nous sommes longuement occupés plus haut, doivent être soigneusement séparées des tumeurs de l'anus et du rectum, bien qu'elles se développent souvent dans la région ano-rectale.

Les tumeurs proprement dites de l'anus et du rectum sont:

- 1° Les condylomes et les végétations;
- 2° Quelques tumeurs rares du rectum, de l'anus et du voisinage;
- 3° Les polypes et les cancers du rectum; mais ces deux affections ont des caractères propres qui les font décrire à part.

1° *Végétation et condylomés*. — *Toutes les causes d'irritation* de la peau de la région anale, surtout les *causes vénériennes*, peuvent, chez certains sujets qui paraissent prédisposés, donner naissance aux végétations et aux condylomes de l'anus. Ces lésions ne diffèrent d'ailleurs nullement des productions analogues observées sur les organes génitaux externes. La malpropreté, l'eczéma, l'écoulement de liquides irritants vulvaires ou vaginaux, en sont la cause fréquente; les rapports contre nature, les excoriations qui en résultent, agissent de même; mais il faut bien savoir que ces productions, pour être quelquefois, souvent même d'origine vénérienne, ne sont jamais de *nature syphilitique*. Les expériences minutieuses de Melchior Robert ne laissent aucun doute à cet égard. L'écoulement vaginal simple de la *grossesse* leur donne souvent naissance.

Nous avons dit que le terrain n'est pas sans influence; on a accusé le tempérament lymphatique, le diabète (Aimé Martin), enfin une

certaine idiosyncrasie (Diday) caractérisée par la prédisposition aux verrues dans la jeunesse, aux végétations dans l'adolescence.

La *végétation* est constituée par l'*hypertrophie papillaire*; cependant le derme sous-jacent est souvent épaissi et induré. Dans le *condylome*, le derme tout entier est hypertrophié: il s'agit de l'hypertrophie d'un des plis de la marge de l'anus.

La *végétation* est une masse arborescente, ordinairement étalée *en éventail* par la pression des fesses, et formée par la réunion de masses plus petites aplaties transversalement, *crêtes de coq*, ou bourgeonnantes, *choux-fleurs*.

Les *condylomes* sont de petites tumeurs arrondies ou ovalaires, débutant par la saillie d'un ou de plusieurs plis radiés, puis s'hypertrophiant davantage à la surface. — Ces tumeurs ne sont pas douloureuses tant qu'elles ne sont pas ulcérées; elles le deviennent par le fait des excoriations et donnent lieu alors une suppuration fétide.

La durée des condylomes est indéterminée; on les voit parfois disparaître spontanément; l'excision est ordinairement nécessaire, mais, fait important, ils n'ont aucune tendance à la récurrence.

Reproduction, récurrence presque désespérante, sont au contraire le caractère des végétations.

Ces productions morbides sont tantôt discrètes, tantôt confluentes; elles vont augmentant sans cesse lorsqu'elles ne sont pas traitées; en face d'une végétation, on voit très souvent apparaître une *végétation symétrique*. Celle-ci ne semble pas jusqu'à présent être le résultat d'une contagion, mais bien d'une simple irritation locale.

Les papilles hypertrophiées qui la constituent donnent à la végétation une surface mamelonnée, irrégulière, sèche quand la végétation est isolée, plus souvent humide, excoriée, quand il existe des végétations multiples.

Quelques démangeaisons, la sensation d'une petite tumeur interfessière, sont les premiers signes observés; si l'affection n'est pas soignée, elle se développe, se multiplie, sa surface s'ulcère, et donne naissance parfois à des hémorrhagies, plus souvent à une suppuration infecte qui remplit les sillons et irrite toute la peau du voisinage.

La saillie papuleuse de la plaque muqueuse, la tumeur ou l'ulcère-

ration d'un épithélioma, ne seront guère confondues avec les végétations, même ulcérées.

Les végétations sont ordinairement cutanées, très rarement muqueuses. On peut en rapprocher par certains côtés quelques végétations molles et vasculaires observées parfois à la surface de la muqueuse qui recouvre les polypes du rectum chez les enfants; on a désigné cet aspect sous le nom de *fungus bénin*.

Le *pronostic* est tout entier dans la reproduction désespérante de ces tumeurs, qui exige de la part du chirurgien une poursuite incessante, dans laquelle le thermocautère nous semble l'instrument le plus utile, le plus commode et le plus sûr, car il permet d'enlever sans hémorrhagie sérieuse des masses considérables.

2° *Tumeurs rares*. — Dans cette catégorie se placent les *kystes dermoïdes du rectum*, dont on trouve deux exemples dans l'article RECTUM du *Dictionnaire encyclopédique*. — L'un de ces kystes, pédiculé, renfermait des poils et des masses osseuses (Barker, *Revue des sciences médicales*, t. II). L'autre fait publié par Danzel d'Hambourg dans les *Archives de Langenbeck*, t. XXII, présentait le phénomène fort curieux de cheveux sortant par l'anus, et repoussant, lorsque le malade les avait arrachés. L'extirpation fut suivie de mort.

A côté se range une observation unique d'*enchondrome du rectum* présentée par Dolbeau à la Société anatomique.

Il ne reste plus dès lors que les lipomes et les sarcomes. — Les derniers, en raison de la marche maligne qu'ils offrent habituellement, seront étudiés plus justement à propos du cancer du rectum.

Quant aux lipomes, il faut distinguer: 1° les lipomes du rectum; 2° les lipomes de la marge de l'anus; 3° les lipomes de la région ano-coccygienne, pour lesquels nous renvoyons le lecteur aux tumeurs sacro-coccygiennes.

Les *lipomes du rectum* sont très rares; leurs symptômes diffèrent peu de ceux des polypes; on les a vus se pédiculiser et même être expulsés spontanément (Castelain; Avezou). — Leur surface extérieure est souvent dure, fibreuse, tandis que leur contenu est parfois dans un état de ramollissement remarquable.

Les *lipomes de la marge de l'anus* ne sont le plus ordinairement que des émanations de lipomes profonds partis des fosses ischio-rectales; un certain nombre de faits de ce genre, recueillis dans le ser-

vice du professeur Verneuil, ont servi de base à la thèse d'un de ses élèves.

Un malade, que nous avons observé dans le service de Duplay à Lariboisière, offrait un beau type de cette affection; la tumeur aplatie transversalement, allongée dans le sens antéro-postérieur, mesurait environ 10 centimètres de long sur 5 à 4 de large; elle était supportée par un pédicule aplati également et un peu moins large, qui semblait s'enfoncer dans l'intérieur de la fosse ischio-rectale.

## CHAPITRE X

### CANCER DU RECTUM.

Le cancer du rectum, longtemps confondu avec toutes les indurations rectales sous la vague dénomination de squirrrosités, n'a commencé à être nettement délimité que depuis Lisfranc.

**Étiologie.** — Nous ne savons rien de précis des conditions étiologiques qui règlent son apparition; toutes les données que nous possédons sur ce point sont relatives à sa *fréquence*. — C'est ainsi que les statistiques d'Allingham nous donnent environ 1 cancer du rectum pour 40 affections de ce viscère; que celles de Curling indiquent pour le sexe masculin une fréquence plus grande (2 hommes pour 1 femme), du moins pour ce qui concerne le cancer primitif; enfin que tous les auteurs sont d'accord pour constater que le cancer du rectum s'observe surtout après 40 ans.

A côté de ces règles générales se placent des exceptions. Le cancer rectal consécutif à un cancer du col de l'utérus est beaucoup plus fréquent que le cancer primitif chez la femme; la proportion totale n'est pas loin d'égaliser celle du cancer rectal chez l'homme: 15 contre 17 (Hecker).

On a observé des cancers du rectum chez des sujets extrêmement jeunes, un enfant de 12 ans, un autre de 15, un adulte de 17 ans, et aussi chez des gens très âgés.

**Anatomie pathologique.** — 1° *Siège.* — La dégénérescence

cancéreuse peut occuper tous les points du rectum; toutefois on la rencontre surtout à l'*extrémité inférieure*, 9 fois sur 15 (Hecker), et, par extrémité inférieure, il faut entendre l'anus et les six ou huit centimètres du rectum qui lui font suite immédiatement. — Le cancer du rectum peut aussi siéger à la partie moyenne; le cas de Broussais en est devenu l'exemple historique; enfin, relativement aux cancers de l'extrémité supérieure, il faut tenir compte des difficultés du diagnostic et penser avec Nélaton que bon nombre de ces dégénérescences sont absolument méconnues.

Lorsque le rectum est envahi secondairement après un cancer du col de l'utérus, l'invasion débute par la région antérieure et dans la portion correspondante au col, c'est-à-dire à 10 centimètres environ de l'orifice anal.

Par rapport à la paroi rectale on distingue :

1° Le cancer *latéral* ou *partiel*; 2° le cancer *circulaire* ou en virole, types habituels du *cancer circonscrit*, et 3° le *cancer diffus* ou en *plaques disséminées*, beaucoup plus rare que le précédent.

Le cancer du rectum ne siège peut-être pas aussi souvent qu'on l'a prétendu à la partie postérieure; Allingham prétend l'avoir vu souvent débiter dans la paroi rectale au niveau de la région prostatique, et offrir alors une marche très lente.

Sans rien préjuger de la nature du cancer et sans empiéter non plus sur le terrain clinique, les *types anatomiques* auxquels il faut rapporter la dégénérescence cancéreuse du rectum nous paraissent être au nombre de quatre: 1° *végétation*; 2° *tumeur*; 3° *ulcération*; 4° *rétrécissement*.

La *végétation* néoplasique de mauvaise nature est plus ou moins nettement pédiculée, bourgeonnante, fongueuse, de consistance molle, saignant facilement.

La *tumeur* maligne n'est pas un type fréquent du cancer rectal; tantôt elle est constituée par une masse énorme de végétations, tantôt il s'agit de véritables tumeurs malignes plus rares, encéphaloïde, sarcome.

L'*ulcération* se présente plus souvent, particulièrement dans le cancer anal; comme bon nombre d'ulcérations de l'anus et du rectum, elle repose sur une base indurée, mal circonscrite, se perdant dans les tissus voisins; il n'est pas rare de la voir limitée, surtout dans le cas de cancer anal, par une de ces productions végé-

tantes ou condylomateuses qui accompagnent souvent les ulcérations de l'anus, et dont la nature maligne ne diffère pas d'ailleurs, au cas particulier, de celle du cancer, qu'elle limite plus ou moins complètement.

Quant au *rétrécissement*, il constitue le type le plus complet du cancer rectal, l'aboutissant de la végétation ou de l'ulcération qui n'ont cessé de s'accroître et de marcher. — On a beaucoup discuté sur le degré de ce rétrécissement néoplasique : il semble à peu près démontré que ce rétrécissement peut aller jusqu'à l'occlusion complète, ou peu s'en faut, du calibre de l'intestin. Les lésions de voisinage dans ce rétrécissement néoplasique ne diffèrent guère de celles qui sont observées dans les autres rétrécissements du rectum ; l'ulcération au-dessus du rétrécissement, les abcès de voisinage, les trajets fistuleux qui en sont la conséquence, n'offrent rien de spécial ; il en est de même de la *rétro-dilatation* résultant de cet obstacle.

L'évolution anatomique du cancer du rectum se résume dans les deux termes suivants : 1° *propagation* ; 2° *généralisation*.

Le plus souvent, l'affection débute par la muqueuse, peut-être, dans quelques circonstances rares, par le tissu cellulaire sous-muqueux ; mais c'est tout ce que nous savons de cette origine. Au bout de quelque temps on voit les éléments cancéreux infiltrer toutes les tuniques de l'intestin, cheminer en progressant circulairement bien plus qu'en hauteur. — Cette propagation de proche en proche peut rester longtemps limitée aux parois rectales ; elle a peu de tendance à envahir le péritoine, au moins au début ; il est rare également de la voir s'étendre, chez l'homme, à la vessie, à la prostate, aux vésicules séminales ; mais il est plus fréquent de la voir, chez la femme, gagner le périnée, les grandes lèvres, détruire la cloison recto-vaginale, créant ainsi des fistules extrêmement pénibles.

L'extension du cancer aux ganglions lymphatiques est toujours tardive dans le cancer rectal ; elle s'observe dans les ganglions pelviens, sacrés, et jusque dans les ganglions lombaires ; peut-être est-elle plus précoce et plus rapide dans les ganglions inguinaux externes en cas de cancer anal. J'ai observé un cas de ce genre où l'adénopathie inguinale était tout à fait remarquable par sa précocité, sa longue durée (2 ans), et enfin son volume.

Les lois de la généralisation à distance du cancer du rectum sont

moins bien connues ; on a observé dans ces conditions l'invasion secondaire du foie, du mésentère, des épiploons, des ovaires, des poumons.

Une dernière question nous reste à résoudre : quelle est la *nature* du cancer du rectum ?

La réponse est aujourd'hui fort nette : le cancer épithélial est la forme le plus fréquemment observée : *épithélioma cylindrique* au rectum ; *épithélioma stratifié, lobulé* à l'anus.

Le carcinome encéphaloïde est rare, et la dénomination de squirrhe, encore employée par les Anglais, n'est pas appuyée sur des examens histologiques suffisants.

La dégénérescence gélatiniforme est fréquente dans l'épithélioma ; c'est ce qui explique sans doute comment Cruveilhier avait cru que le cancer colloïde était la forme la plus fréquente de cancer du rectum.

Il nous semble bien difficile, jusqu'à ce que des études plus précises aient été faites, de séparer cliniquement de ce que nous venons de décrire, certains *sarcomes*, rares, à marche rapide, constitués par d'énormes masses dures envahissant bientôt tout le petit bassin (Esmarch), ou bien encore ces végétations noirâtres, multiples, décrites par Gross et Maier sous la dénomination de sarcomes mélaniques du rectum.

**Symptômes et diagnostic.** — Il y a, dans le tableau clinique du cancer du rectum, bien des nuances.

Le malade, avons-nous dit, a déjà dépassé l'âge mûr ; depuis quelques mois, il souffre de troubles digestifs vagues et mal définis : digestions pénibles, répugnance pour certains aliments, alternatives de constipation et de diarrhée ; sous cette influence se produit un amaigrissement lent, mais persistant et continu. C'est la *forme dyspeptique*.

Ailleurs ce sont des hémorrhagies intestinales qui se seront produites à plusieurs reprises, caractérisées surtout par des selles noirâtres comme de la suie, du marc de café, des matières épaisses comme de la poix, du goudron : c'est la *forme hémorrhagique*.

D'autres fois l'attention est appelée d'une manière plus nette vers le rectum par des troubles fonctionnels peu marqués au début, mais qui vont s'accroissant davantage. C'est d'abord une sensation de pesanteur dans le petit bassin, de gêne au fondement ; puis la défécation devient douloureuse, il y a du ténesme, des épreintes rectales

très pénibles, parfois quelques troubles de miction; enfin les selles s'accompagnent bientôt d'écoulements glaireux, sanguinolents. Chez quelques malades, elles se répètent toutes les deux heures, toutes les heures et plus souvent encore, la tumeur entretenant une excitation constante au niveau du rectum. Chez d'autres, le canal de l'anus ayant perdu toute souplesse tout en conservant sa perméabilité, on observe l'*incontinence* des matières fécales. Le plus grand nombre est atteint d'une *constipation* opiniâtre, persistante, terminée par des *débâcles* de plus en plus éloignées.

Les *symptômes* deviennent bientôt dans ce cas ceux du *rétrécissement du rectum*, et cela (fait remarquable déjà soigneusement signalé par Nélaton) bien avant que les productions néoplasiques aient déterminé une diminution bien appréciable du calibre de l'intestin.

On a devant les yeux le tableau déjà tracé de l'obstruction intestinale lente : le ventre se ballonne; les anses intestinales se dessinent sous la paroi abdominale distendue. Il y a des vomissements, du hoquet; et cette rétention, que viennent à peine interrompre momentanément de rares débâcles provoquées par des lavements et des purgatifs répétés, devient bientôt une indication opératoire urgente. On a pensé que l'obstruction pouvait produire un véritable empoisonnement stercoral, une *stercorémie* dont la preuve incontestable reste encore à faire.

Mais la défécation n'est plus seule douloureuse à ce moment; la *douleur* est continue, atroce, comparée à celle que produirait l'introduction d'un fer rouge, parfois limitée au rectum, mais souvent aussi irradiée dans la vessie, le petit bassin, les membres inférieurs. Elle rend impossible la position assise, oblige parfois les malades à rester des journées entières dans les positions les plus bizarres, et en a conduit beaucoup à en finir brusquement avec une existence horriblement pénible.

C'est dans ces conditions surtout que le médecin est appelé pour apporter remède à des souffrances si cruelles; et la localisation des phénomènes ne lui laisse guère de doutes sur la nature et sur le siège de l'affection.

S'il en restait encore quelques-uns, l'exploration physique les aurait bien vite levés. Jamais, en présence de l'un quelconque des tableaux que nous venons d'esquisser, le chirurgien ne doit hésiter à

recourir au *toucher*, qui lui permettra seul de reconnaître la nature, le siège de l'affection, et en même temps de décider l'intervention opératoire.

Tantôt ce sera à l'orifice même de l'anus que le doigt percevra un tubercule, une induration, dont l'*inspection directe* permettra encore mieux d'apprécier les caractères.

L'étude attentive de l'âge, des commémoratifs, l'exploration des ganglions inguinaux externes, complètent par de précieuses données les résultats de l'exploration physique et serviront à distinguer facilement, en général, le *cancer de l'anus* des ulcérations tuberculeuses et syphilitiques qui ont avec lui bien des points communs; cette distinction est cependant parfois assez délicate, certains *épithéliomas mous* de l'anus ressemblant à s'y méprendre aux ulcérations dont nous venons de parler.

Lorsque le cancer occupe le rectum, le *toucher rectal* fait constater au début une végétation assez mal pédiculée, généralement molle, fongueuse, reposant sur une base indurée, ou bien une érosion cupuliforme dont la portion centrale, plus ou moins déprimée, est environnée d'une couronne irrégulière de végétations plus dures se continuant avec la muqueuse elle-même envahie.

Plus tard, les lésions affectent la forme demi-annulaire ou annulaire; le doigt introduit dans le rectum sent le calibre de l'intestin diminuer rapidement, les parois perdre leur souplesse, tous les tissus s'indurer, se bosseler; presque toujours le doigt peut pénétrer, avec de grandes précautions bien entendu, dans l'intérieur du rétrécissement. On arrive ainsi, en cas de rétrécissement inférieur, à apprécier les limites du mal, à juger du moins si elles permettront de tenter l'extirpation. Il est admis que l'ablation du rectum peut porter jusqu'à 8 à 10 centimètres au-dessus de l'anus sans atteindre le cul-de-sac péritonéal; mais il est de règle de s'attaquer seulement aux lésions dont le doigt peut bien reconnaître la limite supérieure.

Par le *toucher* on ramène presque toujours des débris sanieux, des végétations détachées de la tumeur ramollie; parfois l'exploration provoque un véritable écoulement sanguin, alors même qu'on ne s'est pas départi de l'extrême douceur qui est de règle en pareille circonstance, et sans laquelle on est exposé à produire des perforations ou des ruptures du rectum.

La *palpation abdominale*, lorsque la lésion siège très haut, le *toucher vaginal* chez la femme, quelquefois le *cathétérisme prudent* du rétrécissement néoplasique, compléteront les données que nous venons d'énumérer rapidement.

Le diagnostic du cancer du rectum, à la période que nous venons de décrire, ne présente pas de difficultés; il est plus facile encore lorsque la dernière période est arrivée; tous les signes de la cachexie cancéreuse s'ajoutent alors à la *douleur* et aux phénomènes d'obstruction lente que nous avons passés en revue. Émaciation croissante et rapide, perte des forces, décoloration des téguments, teinte jaunâtre, thrombose douloureuse cachectique des membres inférieurs, tels sont les traits généraux de la maladie; le tableau peut encore se compliquer des signes, à évolution rapide, d'un cancer secondaire du foie, de l'estomac de la colonne vertébrale, ou de l'extension à la vessie, à la cloison recto-vaginale, au périnée; nous ne pouvons entrer dans tous ces détails, qui modifient quelquefois très notablement la physionomie ultime du cancer du rectum.

Telle est, esquissée dans ses principaux traits, l'histoire clinique du cancer du rectum; mais que de variétés résultant de groupements divers, que de types anormaux! Nous ne pouvons pas ne pas rappeler le cas si curieux de cet homme solide et bien bâti, qui vient trouver Allingham pour un certificat d'assurance sur la vie, et auquel ce chirurgien est tout étonné de trouver un cancer très accentué du rectum que n'avait trahi jusque-là aucun signe fonctionnel.

Que de fois ne verrez-vous pas encore à l'hôpital ou dans la clientèle des malades affaiblis, émaciés, souffrants, dont personne ne peut préciser l'affection et dont la déchéance organique reste inexplicable jusqu'au jour où quelqu'un, pratiquant le toucher rectal, vient, c'est bien le cas de le dire, en toucher du doigt la cause ignorée jusqu'alors!

**Marche. — Pronostic.** — Le cancer du rectum est loin d'accomplir régulièrement les diverses phases de son évolution: certaines formes, surtout les formes molles et végétantes: encéphaloïdes, épithéliomas mous, ont une marche beaucoup plus rapide et se terminent par la mort au bout de quelques mois, tandis que les formes dures se développent beaucoup plus lentement et se prolongent deux ans et quelquefois davantage. Le siège du cancer a aussi une influence

très grande et l'évolution du cancer de l'anus même avec adénopathie considérable est toujours beaucoup modérée que celle du cancer du rectum proprement dit.

La durée des périodes de dyspepsie, de rétention intestinale, de cachexie est très variable, suivant les formes de cancer et les sujets atteints; il s'établit, dans certains cas d'ailleurs rares, une tolérance étonnante. Mais, à un moment donné, il semble qu'une barrière se rompe; la marche devient alors extrêmement rapide. Le traitement n'est point sans influence sur ces arrêts, ces ralentissements de la maladie.

**Traitement.** — On le divise en chirurgical et médical.

1° **Traitement chirurgical.** — Il est palliatif ou curatif.

*Curatif*, il a pour objet l'extirpation de la partie malade, et il laisse l'espoir sinon d'une guérison définitive sur laquelle on ne peut guère compter, du moins d'une rémission plus ou moins considérable et par conséquent d'une prolongation de la vie.

L'*extirpation du rectum* peut porter sur la totalité du calibre de l'intestin, ou seulement sur un segment de ce cylindre. Elle ne doit pas atteindre en hauteur le niveau du cul-de-sac péritonéal, et un point important du diagnostic est précisément d'apprécier à ce point de vue la limite supérieure du mal. Les ablations qui remontent au delà de ce point, et dans lesquelles on ouvre franchement le péritoine (Bardenheuer), doivent être considérées comme des opérations spéciales, comme de véritables résections de l'intestin.

Partielle ou totale, l'extirpation de la partie inférieure du rectum ne se fait plus guère au bistouri (méthode de Lisfranc). La crainte des hémorrhagies, si diminuée pourtant par l'emploi des pinces à force-pression laissées au besoin à demeure, détourne aujourd'hui la plupart des opérateurs de l'usage de l'instrument tranchant. L'opération se pratique avec le thermo-cautère, l'écraseur linéaire ou le galvanocautère, et le chirurgien éclectique se trouvera souvent bien de l'emploi simultané de ces divers moyens, qu'il variera suivant les temps de l'opération.

Ceux-ci se résument ainsi pour l'extirpation totale: 1<sup>er</sup> temps. Section, au thermocautère, ou au moyen de l'écraseur, ou par l'anse galvanique de toutes les parties molles, depuis le coccyx jusqu'à l'anus, intestin compris, et au besoin résection du coccyx; — 2<sup>e</sup> temps. Division de la partie antérieure de l'intestin par l'anse galvanique ou

l'écraseur mis en place au moyen d'un trocart passant entre l'intestin et la prostate, ou l'intestin et la paroi vaginale; — 5<sup>e</sup> temps. L'intestin étant ainsi morcelé en deux moitiés latérales, on isole chacune des deux moitiés, en commençant au niveau de l'anus par deux incisions latérales demi-circulaires et en remontant de proche en proche jusqu'au-dessus des parties malades. On emploie ici le thermo ou le galvano-cautère; — 4<sup>e</sup> temps. Section de chaque lambeau ainsi détaché au moyen des instruments qui assurent l'hémostase. On peut simplifier ce temps en laissant à demeure des pinces hémostatiques en T.

Lorsqu'il s'agit d'une extirpation partielle, on applique la même méthode : double section longitudinale de l'intestin, isolant latéralement la tumeur, puis dissection de cette espèce de lanière; enfin section à sa partie supérieure. Cette opération devient facile lorsque le néoplasme siège en arrière, ce qui est commun. Nous conseillons de pratiquer, dans ce cas, la section de toutes les parties molles et de l'intestin, néoplasme compris, par le procédé indiqué plus haut, puis de disséquer et de détacher au thermo-cautère, à droite et à gauche, les parties malades.

Ces opérations exposaient jadis à de graves hémorrhagies; on peut dire que cet accident est actuellement supprimé. Les inflammations de voisinage, cellulite pelvienne, phlébites, etc., et consécutivement l'infection purulente, étaient communes. Les pansements employés aujourd'hui, et ils sont infiniment simples (ce sont des pansements iodoformés), ont aussi écarté presque complètement ces complications. Reste la blessure des organes voisins : celle du vagin est quelquefois faite, de propos délibéré, pour compléter une extirpation; celle de la vessie ou de l'urèthre, plus grave, est rarement mortelle; celle du péritoine est infiniment plus sérieuse. Dans sa thèse d'agrégation (1880), Piéchaud relève, sur 149 faits, 105 guérisons opératoires, et parmi les morts, 18 cas de péritonite. On a le droit, avec la méthode opératoire et les pansements actuels, de compter sur une proportion de guérisons plus forte.

Les résultats éloignés de l'opération sont difficiles à apprécier. Sur les 105 guéris de Piéchaud, 27 auraient survécu de 2 à 5 ans. Mais dans quelle situation? à vrai dire l'anus, après une semblable opération, est devenu un anus artificiel. Quelques malades particulièrement favorisés retiennent leurs matières assez bien. Le plus grand nombre

les perd, dès qu'elles sont un peu fluides, ou même est atteint d'incontinence absolue.

*Le traitement palliatif* est généralement employé, en France, lorsque l'extirpation ne semble pas possible. Il comporte deux opérations : la rectotomie, et l'établissement d'un anus artificiel.

*La rectotomie* a pour but de faire cesser les douleurs et les épreintes dont l'anus est le siège dans le cancer rectal, de faciliter la sortie des matières alvines, de mettre le malade à l'abri de l'obstruction. Elle consiste dans la simple section médiane que nous avons décrite comme le premier temps de toutes les ablations. Verneuil, pour mieux assurer son effet, la fait quelquefois double, portant de chaque côté un peu en dehors de la ligne médiane. Cette opération convient aux rétrécissements inopérables, par le fait de leur extension en largeur, mais dont on peut atteindre les limites supérieures.

En Angleterre, on préfère à la rectotomie, et même à l'extirpation, l'établissement de l'*anus artificiel*. Cette opération est moins dangereuse que l'extirpation; elle a l'avantage de ne pas toucher à la tumeur comme le fait la rectotomie; elle soustrait le néoplasme au contact des matières fécales, et, de ce fait, l'évolution de ce dernier se trouve sérieusement retardée. Elle met d'une manière définitive le malade à l'abri de l'obstruction intestinale. Enfin, à tout prendre, l'anus artificiel n'est pas inférieur à l'anus que laisse l'extirpation du rectum, et il est supérieur à celui de la rectotomie. On pratique l'anus artificiel sur le gros intestin. Les uns préfèrent la colotomie lombaire, les autres, la colotomie au niveau de l'S iliaque. Cette dernière est d'une exécution plus facile. Faite soigneusement, à l'aide des précautions antiseptiques convenables, la colotomie n'est pas une opération grave. Les chiffres fournis par les statistiques ne répondent pas à la réalité des faits.

Pour nous, nous sommes absolument disposé à préférer l'établissement de l'anus artificiel à toute autre opération dans le cas de cancer déjà étendu du rectum; et nous formulerons ainsi avec le professeur Trélat le traitement chirurgical du cancer du rectum :

- 1<sup>o</sup> Respectez les cancers qui ne causent pas d'accidents;
- 2<sup>o</sup> Extirpez les cancers très limités de la marge de l'anus et de l'extrémité inférieure du rectum;
- 3<sup>o</sup> En face d'un cancer étendu, traitez surtout les accidents et tenez-

vous aux opérations palliatives. — Nous ajouterions volontiers : tenez-vous surtout à la colotomie.

2° *Traitement médical.* — On ne peut songer à pratiquer une opération même palliative, dans certains cancers du rectum. Les raisons ordinaires de l'abstention sont que l'évolution est trop rapide, que ces cancers sont secondaires, qu'ils s'accompagnent d'engorgements ganglionnaires, qu'il y a déjà des signes non douteux de généralisation cancéreuse. Calmer la douleur, faciliter les garde-robes, maintenir aussi longtemps que possible l'état général, voilà dans ce cas les indications à remplir.

Contre la douleur : suppositoires, mèches opiacées, cataplasmes laudanisés et surtout injections de morphine.

Contre la constipation, au début, lavements dont la canule devra toujours être introduite avec précaution; plus tard, médicaments laxatifs, et, dans quelques cas, dilatation lente, extrêmement prudente et réservée, à l'aide de bougies rectales graduées.

La médication tonique et une bonne nourriture rempliront la troisième indication.

FIN DU TOME TROISIÈME.

## TABLE DES MATIÈRES

### MALADIES DES RÉGIONS

#### COU.

Considérations anatomiques. . . . . 1

#### PREMIÈRE PARTIE

##### LÉSIONS TRAUMATIQUES DU COU.

CHAPITRE PREMIER. — Contusions et fractures. . . . .	2
I. Contusions du cou. . . . .	3
II. Fractures de l'os hyoïde. . . . .	4
III. Fractures du larynx. . . . .	7
IV. Fracture de la trachée. . . . .	12
CHAPITRE II. — Brûlures du cou. . . . .	15
I. Brûlures des parties externes. . . . .	15
II. Brûlures du pharynx et de l'œsophage. . . . .	16
III. Brûlures du larynx, de la trachée et des bronches. . . . .	18
CHAPITRE III. — Plaies du cou. . . . .	21
I. Généralités. . . . .	21
II. Plaies du cou non pénétrantes. . . . .	25
III. Plaies pénétrantes des voies respiratoires et digestives. . . . .	24
1° Plaies pénétrantes de la région hyoïdienne. . . . .	25
a. Plaies par instruments tranchants. . . . .	25
b. Blessures par balles et par instruments piquants. . . . .	29
2° Plaies du larynx et de la trachée. . . . .	30
3° Plaies du pharynx et de l'œsophage. . . . .	56
a. Plaies du pharynx et de l'œsophage à l'état d'isolement. . . . .	56
b. Plaies du pharynx et de l'œsophage accompagnant une lésion du larynx ou de la trachée. . . . .	57
IV. Plaies des artères du cou. . . . .	59
Anévrysmes diffus des artères du cou. . . . .	47
V. Plaies des veines du cou. . . . .	51
VI. Plaies des nerfs du cou. . . . .	56
1. Plexus brachial. . . . .	56
a. Plaies et traumatismes divers des portions radiculaires du plexus brachial. . . . .	56
b. Plaies et traumatismes divers, portant sur le plexus proprement dit. . . . .	59
2. Autres nerfs du cou. . . . .	61
CHAPITRE IV. — Corps étrangers. . . . .	65
I. Corps étrangers des voies aériennes. . . . .	65
A. Corps étrangers liquides. . . . .	65
B. Corps étrangers solides. . . . .	65
II. Corps étrangers de l'œsophage. . . . .	76