Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et progrès de la maladie.	Etat à l'entrée à l'hôpital.
147. E. L.	23	Blenn., la dernière il y a six mois ; intempérance. — Ecoulement purulent qui persiste encore.	Depuis peu, le jet a semblé décroître.	Rétention à la suite de débauches ; rétrécissement peu étroit.
148. M. M.	60	Blenn., la dernière il y a vingt ans ; durée de plusieurs mois.	Le jet a toujours décru depuis, à divers degrés, suivant les périodes.	Rétrécissement étroit, infranchissable. Rétention.
149. J. T.	49	Blenn. il y a vingt-cinq ans. Chronique.	La rétention fut le premier signe noté, elle s'est montrée après le passage d'une température très-chaude à un milieu très-froid ; plusieurs récidives.	Rétrécissement fort étroit, infranchissable.
150. H. H.	37	Il y a neuf ans, il fut serré contre un mur par des chevaux; malade pendant les trois mois suivants.	Depuis lors, l'urine est venue plus ou moins difficilement ; rétention occasionnelle ; dernièrement incontinence.	Rétrécissement fort étroit; lésions avancées des organes urinaires ; mort.
151. J. B.	27	Cinq ou six blennorrhagies entre 18 et 24 ans, aux Indes orientales. Ecoulement chronique.	Le jet devint un peu plus fin que d'habitude environ deux ans plus tard.	Rétrécissement peu étroit.
152. C. H.	49	Blenn. à 16 ans, plusieurs fois depuis ; léger écoulement uréthral, fréquent mais non aigu. Grandes habitudes d'intempérance. Ecoulement négligé.	Il nota pour la première fois la diminution de son jet d'urine il y a six ans ; plusieurs rétentions après avoir bu d'une façon immodérée.	Rétrécissement étroit, opiniâtre.
153. R. E.	44	Dernière blennorrhagie à l'âge de 40 ans; écoulement purulent consécutif.	Premiers signes de rétrécissement il y a trois ans.	Rétrécissement peu étroit.
154. G. W.	54	Blenn. étant jeune, puis à l'âge de 41 ans; l'écoulement n'a jamais entièrement cessé après la dernière.	Premiers signes de rétrécissement il y a environ dix ans.	Rétrécissement peu étroit ; fistule périnéale.
155. C. T. B.	26	Exposition au froid après un exercice violent ; blenn. récente paraissant presque guérie.		Rètrécissement inflammatoire brusque ; rétention consécutive.
156. A. J.	53	Jamais de blennorrhagie ; urine acide ; diathèse goutteuse.		Amoindrissement considérable du jet d'urine depuis quelque temps.
157. C. W.	29	Quatre ou cinq blennorrhagies ; écoulement chronique négligé.	Il pense que son jet a diminué peu de temps après sa dernière gonorrhée.	Rétrécissement à deux endroits peu prononcé.
158. W. M.	37	Trois blennorrhagies, dont une avec chancres; la dernière, il y a huit ans, laissa après elle un écoulement purulent.	Environ douze mois après, le jet se mit à diminuer ; alternatives sous ce rapport.	Rétrécissement assez étroit ; irritabilité et sensibilité de l'urèthre.
159. T. B.	26	Plusieurs blennorrhagies ; écoulement permanent.	Diminution du jet il y a environ trois ans ; rétention depuis douze mois.	Rétrécissement.
160. P. O.	48	Jamais de blennorrhagie ; urine acide, goutte, rhumatisme. Ecoulement uréthral de temps à autre.	Après l'exposition au froid, le jet est devenu plus mince.	Rétréciss. siégeant à environ 15 centimètres du méat, irritabilité de l'urèthre.
161. G. M. K.	24	Une blennorrhagie ; autant qu'il peut se rappeler, son jet a toujours été plus mince que d'habitude ; irritabilité de la vessie.	Immédiatement après la gonorrhée, diminution du jet, et les signes se prononcèrent.	Rétrécissement étroit.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et progrès de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
162. C. Y.	36	Blenn. à 20 ans, puis il y a deux années; il monte souvent à cheval : la dernière gonorrhée était chronique.	Exacerbation des symptômes après l'exercice du cheval ; le jet a diminué pendant les deux ou trois derniers mois.	Rétrécissement.
163. B. J.	40	Trois ou quatre blennorrhagies, la dernière il y a dix ans. Chronique. Il boit beaucoup.	Rétrécissement depuis sept ans ; plusieurs fois en traitement ; deux fois rétention.	Rétrécissement étroit, très-irritable.
164. D. J.	32	Deux blennorrhagies six ans auparavant. Il y a quatre ans, « étant monté sur un cheval sans selle », il ressentit une douleur brusque et perdit du sang par le canal.	Le jet d'urine devint plus petit peu de temps après cette époque, on a passé des instruments ; mais avec difficulté.	Rétrécissement étroit.
165. J. J. T.	36	Deux ou trois blennorrhagies; l'écoulement a persisté longtemps.	Jet plus fin et difficulté considérable à uriner depuis les deux ou trois dernières années.	Rétrécissement peu étroit.
166. G. F.	29	Une seule blennorrhagie il y a trois ans. Négligée et chronique.	Le jet d'urine est divisé en deux; depuis quelque temps vives douleurs à l'hypogastre et dans les reins.	Resserrement de l'urèthre peu considérable, à environ 2 centimètres et demi du méat.
167. T. P.	23	Chute sur les barreaux d'une échelle en travaillant ; légère hémorrhagie uréthrale consécutive.	Depuis deux mois le jet d'urine est très-mince.	Rétrécissement peu étroit.
168. T. G.	30	Trois blennorrhagies, la dernière il y a trois ans. Ecoulement continuel depuis.	Le jet d'urine a commencé à diminuer peu de temps après la dernière blennorrhagie ; depuis, la difficulté à uriner a toujours été en augmentant.	Rétrécissement étroit.
169. H. K.	58	Une seule blennorrhagie étant jeune ; plusieurs fois, dernièrement, il a été pris d'un léger écoulement uréthral, sans savoir à quoi en attribuer la cause.	Urine alcaline ; état général fort compromis depuis peu ; parfois l'urine ne vient qu'après les plus grands efforts.	Léger rétrécissement au niveau du bulbe ; irritabilité de l'urèthre; dérangement de toutes les fonctions digestives.
170. W. J.	26	Trois blennorrhagies, la dernière il y a deux ans de cela ; léger écoulement ayant duré six mois, sans jamais disparaître entièrement.	Depuis douze mois, certaine difficulté à uriner ; en même temps douleurs dans les reins et le long de l'urèthre.	Rétrécissement peu étroit, mais excessivement sensible.
171. C. B.	41	Plusieurs blennorrhagies ; habitudes fort irrégulières ; fréquence de l'écoulement, qui a toujours été négligé.	A son rétrécissement depuis sept ans, plus ou moins; rétention il y a trois ans.	Rétrécissement assez étroit ; gonflement au périnée.

OBSERVATIONS TIRÉES DES JOURNAUX DE MÉDECINE.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et progrès de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
172. W. K.	43	Violence extérieure sur le périnée, il y a treize ans.	Depuis lors rétrécissement; depuis douze ans, l'urine s'écoule entièrement par des orifices fistuleux siégeant sur le scrotum.	Rétrécissement étroit; fistules.
173. W. B.	60	Jamais de blennorrhagie, sujet aux hémorrhoides depuis vingt ans.	La difficulté à uriner existe depuis douze ans; première rétention il y a un an.	Rétrécissement et rétention.
174. W. D.	?		Ne peut se rappeler avoir eu un jet de grosseur ordinaire.	Rétrécissement étroit au méat externe, probablement d'origine congénitale.
175. G. B.	28	Blenn. il y a six ans.	Bientôt après, difficulté à uriner.	Rétrécissement.
176. ?.	61	Blenn. il y a seize ans; l'écoulement n'a jamais cessé.	Difficulté à uriner depuis les deux dernières années.	Rétrécissement et rétention.
177. S. S.	42	Blenn. suraiguë il y a quinze ans; écoulement purulent consécutif, d'une durée de plusieurs années.	Difficulté à uriner depuis de longues années.	Rétrécissement et rétention.
178. ?. C.	49	Dix ou onze blennorrhagies; la dernière suivie d'un abondant écoulement chronique.	Le rétrecissement existe depuis plusieurs années.	Rétrécissement et rétention.
179. W. L.	55	Blenn. il y a bien des années.	La difficulté à uriner ne s'est montrée qu'il y a quatre ans.	Rétrécissement, abcès, rétention.
180. ?.	36	Blennorrhagie à 19 ans; écoulement plus ou moins abondant pendant dix ans.	Les signes de rétrécissement apparurent quand il vint à cesser.	Rétrécissement et rétention.
181. W. R.	38	Coup sur le périnée il y a dix ans; hémorrhagie.	Peu après, miction difficile; incontinence depuis cinq ou six ans.	Rétrécissement et fistules.
182. H. J.	34	Coup violent sur le périnée six mois auparavant; hémorrhagie.	Bientôt après, miction difficile.	Rétrécissement étroit.
183. A. B.	50	Blenn. il y a vingt ans.	Diminution du jet au bout de peu de mois; depuis, emploi plus ou moins fréquent de la sonde.	Rétrécissement; l'urine ne vient que goutte à goutte.
184. S. N.	31	Il y a deux ans, chancres, dont un au méat externe.	Cicatrice au niveau du méat; la rétraction graduelle a amené de la difficulté à uriner.	Rétrécissement; abcès périnéal.
185. B. M.	32	Blenn. il y a cinq ans. Guérison rapide.	Très peu de temps après, apparition des signes de rétrécissement.	D'abord rétrécissement et rétention; mort par rupture de la vessie.
186. M. D.	33	Blenn. il y a 4 mois; injections concentrées de sulfate de cuivre; vives douleurs.	Peu après miction difficile; cette difficulté s'accroît toujours.	Rétrécissement.
187. J. W.	42	Deux blennorrhagies: il y a quatre ans, il est tombé d'omnibus; urines sanglantes.	Bientôt après, difficulté de la miction; fréquentes rétentions, surtout après avoir bu.	Rétrécissement.
188. R. P.	46	Blenn. il y a quatorze ans.	Bientôt après, le jet devint plus fin.	Rétréciss., fistules; incision au périnée; mort; reins malades.
189. S. E.	42	Blennorrhagies répétées.	Il y a douze ans que l'urine passe difficilement.	Rétrécissement, rétention; nombreux abcès périnéaux.
190. J. M.	48	Blenn. il y a trente ans; pas depuis.	Il vit son jet diminuer il y a environ dix ans, sans cause appréciable.	Rétrécissement, rétention et insuffisance.
191. E. G.	59	Trois blennorrhagies, la dernière fort longue.	Il vit son jet diminuer quinze mois après la dernière; rétention après des excès de toute sorte.	Rétrécissement étroit, infranchissable.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et progrès de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
192. ?.	52	Trois blennorrhagies.	L'urine ne s'écoule qu'avec difficulté environ douze mois après la dernière gonorrhée; irritabilité de la vessie; rétention et infiltration.	Rétrécissement fort étroit, fistule périnéale.
193. ?.	36	Etant enfant, le jet était déjà plus fin que d'habitude; incontinence à cette époque; légère blenn. il y a dix ans.	La difficulté à uriner a beaucoup augmenté depuis la blennorrhagie; rétention un an auparavant; depuis, incontinence.	Impossible d'introduire une sonde; incision au périnée: mort.
194. J. S.	43	Ponction par le périnée à l'âge de 13 ans; l'urine s'écoule par là.	La plaie guérit en trois mois; peu après, le jet devint plus fin; la plaie se rouvrit, et la fistule persista.	Rétrécissement étroit; calcul vésical.
195. G. M.	26	Blenn. chronique.		Rétrécissement datant de trois ans.
196. T. S.	30	Blenn. grande intempérance. Ecoulement chronique, aggravé par l'exercice du cheval.		Rétrécissement étroit; l'état général en a beaucoup souffert.
197. J. W.	?	Blenn. il y a vingt-cinq ans.	Peu de temps après, il s'exposa au froid et à l'humidité; trois semaines après, difficulté à uriner, ayant toujours été depuis en augmentant.	Rétrécissement, infiltration d'urine.
198. W. P.	44	Blenn. à 13 ans; écoulement purulent pendant un an.	Signes de rétrécissement six ans plus tard.	Rétrécissement étroit.
199. G. B.	24	Blenn. il y a neuf mois.	Le jet est devenu plus fin depuis que l'écoulement a cessé.	Rétrécissement étroit; l'urine vient goutte à goutte.
200. J. W.	moyen	Blenn. il y a seize ans; le jet d'urine a toujours été plus fin que l'état normal depuis l'enfance. Blenn. aiguë et longue.	Les signes de rétrécissement ont suivi de près la blennorrhagie.	Rétrécissement fort étroit; infiltration d'urine.
201. R. B.	30	Blenn. il y a deux ans; à cette époque, difficulté à uriner, bientôt disparue; nouvelle blenn. il y a trois semaines.		Rétention complète par suite d'obstacle inflammatoire, siégeant à 7 centimètres et demi environ du méat.
202. J. M.	25	Plusieurs blennorrhagies, la dernière il y a un an et demi. Durée quatre mois.	Après cela, on observa pour la première fois de la difficulté à uriner.	Rétrécissement étroit, infiltration d'urine.
203. L. S.	40	Blenn. suraiguë il y a trois ans.	Depuis, le jet a diminué par degrés.	Rétrécissement étroit; l'urine ne s'écoule que goutte par goutte.
204. ?. W.	47	Blenn. il y a vingt ans; usage d'injections concentrées.	Deux ans plus tard, apparition des signes de rétrécissement; beaucoup de traitements.	Rétrécissement étroit; l'urine ne s'écoule que goutte par goutte.
205. ?. C.	53	Blennorrh. à 21 ans; chronique, suivie d'un écoulement purulent.	Peu après, le jet diminua.	Trois rétrécissements sur le canal.
206. T. H.	50	Coup sur le périnée, lorsqu'il apprenait à monter à cheval au régiment, à l'âge de 19 ans.	Subséquemment, quelque difficulté dans la miction; depuis, des blennorrhagies répétées ont aggravé les signes; beaucoup de traitements.	Deux ou trois rétrécissements étroits; l'urine vient goutte à goutte.
207. T. C.	32	Chute sur le périnée dans les agrès d'un navire, deux ans auparavant.	Depuis lors le jet est fin, et il y a parfois de la rétention.	Rétrécissement très-étroit; incontinence; état général mauvais.
208. ?. R.	47	Blenn. fort mal traitée étant jeune, chronique.	Les signes de rétrécissement se montrèrent il y a dix-neuf ans; rétention deux ans après.	Deux rétrécissements; altération générale de la santé.
209. M. D.	29	Plusieurs blennorrhagies entre 18 et 25 ans.	Le jet diminua très-peu après la dernière blennorrhagie; et très-vite, l'urine ne vint plus que goutte à goutte.	Deux rétrécissements étroits.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et progrès de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
210. ?.	37	Ténia dans l'intestin.		Produisait un rétrécissement spasmodique dont tous les signes ont disparu après son expulsion. Noté à la page 142.
211. ?.	?	Uréthrite à la suite de l'administration d'une trop forte dose de nitrate de potasse. Chronique.		Rétrécissement infranchissable.
212. J. W.	45	Quatre blennorrhagies il y a un grand nombre d'années : après la dernière, écoulement qui a duré douze mois.	Il y a environ quinze ans qu'ont apparu les signes de rétrécissement.	Rétrécissement fort étroit, invincible.
213. J. H.	52	Il y a quatre ans, coup de pied sur le périnée; rétention consécutive.	A déjà été traité de son rétrécissement.	Rétrécissement infranchissable.
214. J. L.	43	Blenn. il y a vingt-cinq ans.	Les premiers signes de rétrécissement ont été notés environ cinq ans après; plusieurs rétentions dans les sept dernières années.	Rétrécissement infranchissable ; fistule.
215. A. B.	25	Coup sur le périnée, il y a deux ans ; vive douleur.	Rétention un mois après.	Rétrécissement infranchissable ; fistules abdominales et périnéales ; calcul vésical.
216. P. L.	24	A l'âge de 7 ans, il fut pris sous un sac de farine, qui lui replia le tronc sur les cuisses; rétention immédiate.	Depuis l'urine n'a jamais coulé librement ; environ huit ans après, rétention par un froid très-violent ; il y a cinq mois un coup de pied vint aggraver la situation.	Rétrécissement et rétention.
217. A. C.	26	Gros fragment angulaire de calcul arrêté dans la portion membraneuse de l'urèthre après la taille ; il y séjourna quelques jours, puis il rentra dans la vessie.	Six semaines après, on découvrit un rétrécissement, qui ne laissait pas passer la sonde.	La semaine suivante, on pratiqua une incision sur le périnée, vu que le rétrécissement était inaccessible à la plus petite sonde.
218. M. N.	?	Chancres du prépuce et du méat externe.		Trois mois après, le méat était réduit au tiers de son calibre normal ; division de la cicatrice.
219. F. C.	27	Ecoulement uréthral abondant il y a cinq ans, produit par la masturbation; jamais de rapport sexuel jusque-là. Plusieurs autres blennorrhagies à la suite de coït.	Diminution graduelle du jet.	Rétrécissement étroit, découvert après la mort, à la limite antérieure de la portion prostatique. [Lallemand.]
220. A. B.	27	Blenn. suraiguë il y a douze ans ; corde ; coup violent sur le pénis, hémorrhagie consécutive.	Trois mois après, un abcès au devant du scrotum.	Rétrécissement à l'endroit où siégeait l'abcès.

[CAS RECUEILLIS A L'HÔPITAL NECKER A PARIS.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
1. R. J.	45	Première blennorrhagie il y a dix-sept ans; durée, quatre ans. Quatre autre blenn.	Il y a sept ans (dix ans après la première blennorrhagie) difficulté d'uriner ; rétention d'urine il y a cinq ans.	Rétréc. étroits laissant passer le n° 8 (1).
2. ?.	?	Blenn. avec rupture de corde datant de ?.		Rétrécissement étroit, le n° 6 passe. Portion pénienne.
3. T. R.	64	Première blennorrhagie il y a trente ans; dure deux ou trois mois.	Il y a cinq mois, difficultés pour uriner (vingt-neuf ans après blenn.).	Rétrécissement très-étroit laissant passer le n° 6.
4. A. L.	21	Première blennorrhagie il y a deux ans ; dure six mois. Deuxième blennorrhagie; dure quinze mois.	Hématurie ; difficulté pour uriner depuis un mois, (deux ans après).	Deux rétrécissements étroits à 4 et 6 centimètres du méat.
5. A. J.	27	Première blennorrhagie il y a onze ans ; dure très-longtemps.	Il y a sept ans (quatre ans après la première blenn.), diminution du jet; orchite double, écoulement persistant.	Rétrécissement très-étroit, le n° 2 passe difficilement.
6. F. J.-B.	45	Première blennorrhagie il y a vingt-cinq ans; dure trois mois. Deuxième blennorrhagie il y a vingt ans ; dure sept mois. Troisième blennorrhagie il y a quinze ans ; dure six mois.	Difficulté d'uriner il y a quinze ans (dix ans après la première blenn.); dilatation ; récidive quatre ans après.	Rétrécissement.
7. C. L.	33	Première blenn. il y a dix ans ; dure huit mois ; non traitée. Deuxième blenn. il y a sept ans. Troisième blenn. il y a quatre ans.	Rétention d'urine il y a quatre ans ; difficulté pour uriner depuis ce temps-là.	Deux rétrécissements; un à 6 cent., l'autre au bulbe. Le n° 4 passe.
8. M. V.	27	Blennorrhagie.	Depuis trois ans difficulté pour uriner.	Le n° 4 passe facilement.
9. W. A.	52	Blenn. niée par le malade ; chancre induré il y a vingt-trois ans.	Difficulté pour uriner il y a sept ans ; rétention complète ; infiltration urineuse ; fistule.	Rétrécissement infranchissable pendant trois mois. Uréthrotomie externe.
10. B. P.	37	Première blenn. il y a seize ans ; dure trois ans.	Urine mal depuis douze ans (quatre ans après la blenn.); dilatation il y a dix ans ; récidive.	Le n° 6 passe ; rétrécissements multiples.
11. B. J.	42	Première blenn. il y a vingt-trois ans; dure deux ou trois ans.	Il y a onze ans (douze ans après), urine goutte à goutte ; dilatation ; abcès urineux, fistules urinaires.	Rétrécissements infranchissables. Uréthrotomie externe ; mort.
12. M. E.	30	Première blenn. il y a dix ans ; dure plusieurs mois. Deuxième blenn. il y a cinq ans ; mal soignée.	Urine mal depuis dix-huit mois.	Le n° 6 passe ; rétrécissements multiples.
13. L. A.	49	Première blenn. il y a vingt et un ans ; injections caustiques.	Difficulté d'uriner huit mois après ; rétention complète il y a trente mois ; infiltration d'urine.	Le n° 4 passe ; rétrécissements multiples.
14. B. C.	53	Il y a trente-neuf ans première blenn.; dure six mois. Deuxième blenn. il y a trente-cinq ans ; dure dix mois.	Difficulté d'uriner il y a dix ans ; fistules urinaires. Dilatation, récidive ; uréthrotomies multiples.	Rétrécissements multiples.
15. G. P.	55	Première blenn. il y a trente-sept ans; dure deux mois.	Difficulté d'uriner quatorze ans après ; dilatation ; récidive.	Rétrécissement très-étroit.
16. B. J.-B.	53	Première blenn. à 35 ans ; dure trois mois.	Rétention d'urine depuis quatre ans (trente ans après blenn.).	Le n° 9 passe ; rétrécissements multiples.
17. D. A.	46	Première blenn. à 20 ans (il y a vingt-six ans).	Urine mal depuis vingt ans (six ans après la blenn.).	Rétrécissem. étroits ; le n° 4 passe.

(1) Tous les chiffres de ces tableaux se rapportent à la filière française.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
18. D. F.	40	Six blenn. : première il y a vingt ans; dernière il y a sept ans.	Urine difficilement depuis quinze mois (dix-neuf ans après blenn.).	Le n° 8 passe ; rétrécissements multiples.
19. D. A.	43	Première blenn. il y a vingt ans ; dure trois semaines.	Il y a quinze ans difficulté d'uriner : dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 2 passe.
20. B. C.	32	Première blenn. il y a deux ans ; rupture de corde.	Difficulté d'uriner depuis vingt mois (quatre mois après l'accident).	N° 6.
21. B. N.	47	Première blenn. il y a quinze ans ; dure six mois.	Infiltration urineuse il y a deux ans ; uréthrotomie interne. Récidive ; urine difficilement depuis quatre ans.	Rétrécissement très-étroit ; bougie filiforme passe.
22. P. A.	41	Première blenn. il y a quinze ans.	Depuis dix ans difficulté pour uriner ; dilatation.	Le n° 6 passe ; rétrécissements multiples.
23. B. C.	59	Blennorrhagie.	Depuis quinze ans le jet diminue.	Rétrécissement au bulbe.
24. C.etC.H.	37	Blenn. il y a dix-neuf ans.	Difficulté pour uriner depuis quatre ans (quinze ans après blenn.); dilatation.	Rétrécissement au niveau des bourses, laisse passer le n° 14.
25. Q. P. I.	59	Première blenn. il y a trente-quatre ans ; deuxième blenn. il y a trente ans.	Difficulté pour uriner depuis un an (trente-trois ans après blenn.); rétention d'urine, infiltration.	Rétréciss. à 6 centim. du méat et au bulbe. Uréthrotomie d'avant en arrière ; mort.
26. H. P.	30	Blenn. il y a huit ans; dure six à sept mois.	Il y a cinq ans (trois ans après blenn.), rétention d'urine ; difficulté pour uriner depuis ce temps-là ; dilatation, récidive.	Rétrécissements; le n° 3 seulement passe.
27. D. Q.	43	Blenn. multiples.	Uréthrotomisé huit fois.	Rétrécissements multiples très-étroits.
28. B. B.	51	Trois blenn. de 18 à 21 ans (première blenn. il y a trente-trois ans).	Difficulté à uriner depuis seize ans (dix-sept ans après blenn.); dilatation, récidive ; uréthrotomie il y a six ans ; abcès urineux.	Rétrécissem. étroits; le n° 16 arrêté au scrotum; le n° 8 au bulbe ; le n° 3 passe.
29. G. H.	34	Première blenn. il y a dix-neuf ans, dure deux ans; deuxième blenn. il y a douze ans; troisième blenn. il y a onze ans.	Rétention d'urine il y a cinq ans ; dilatation, depuis lors diminution du jet ; récidive, uréthrotomie.	Rétrécissement unique, le n° 4 passe.
30. L. Q. E.	54	Première blenn. il y a trente-quatre ans (à l'âge de 20 ans). Ecoulement, persiste jusqu'en 1860 avec exacerbations.	Difficulté pour uriner depuis plus de quatorze ans (vingt ans après la première blenn.); uréthrotomie, cystite, incontinence d'urine.	Rétrécissements multiples : le premier à la racine de la verge, laisse passer le n° 13; le deuxième au scrotum, laisse passer le n° 8; le troisième au bulbe ; une bougie n° 5 franchit tous les rétrécissements.
31. K.L.F.A.	51	Première blenn. il y a vingt-trois ans, dure deux mois; deuxième blenn. il y a quinze ans, dure trois mois.	Urine moins bien depuis deux ans seulement (vingt et un ans après la première blenn.); urine goutte à goutte.	Rétrécissements multiples : le premier à la racine de la verge, laisse passer le n° 8; le deuxième au bulbe, laisse passer le n° 4.
32. P. C.	20	Chute sur une barre de fer il y a dix mois.	Eschares au périnée ; rétrécissement quatre mois après l'accident, dilatation.	Rétrécissement en avant du bulbe, laisse passer le n° 8.
33. R. E.	60	Première blenn. il y a quarante ans ; plusieurs autres pendant cinq ans.	Il y a vingt-quatre ans (seize ans après la premiere blenn.), difficulté pour uriner; dilatation. Uréthrotomie il y a vingt-cinq ans.	Rétrécissements multiples : le n° 15 arrêté à la racine de la verge ; le n° 12, au bulbe; le n° 10 passe.
34. B. F.	20	Chute sur une barrière il y a un mois.	Hématurie; sonde à demeure, rétention d'urine.	Rétrécissement unique au bulbe, le n° 6 le franchit.
35. M. H.	67	Première blenn. il y a quarante-cinq ans ; depuis lors quatre ou cinq ; la dernière blenn. il y a vingt-huit ans.	Urine difficilement depuis cinq ans (quarante ans après la première blenn.); pas de traitement antérieur.	Rétrécissements multiples ; le plus étroit, au niveau du bulbe, franchi au bout de dix jours.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
36. R. A.	29	Chute sur une poutre, il y a sept mois.	Hématurie, rétention d'urine quinze jours après l'accident ; accès de fièvre.	Rétréciss. à 12 cent. du méat; bougie n° 4 passe après huit jours d'essais infructueux.
37. D. F.	32	Première blenn. à 14 ans (il y a dix-huit ans), dure plus de deux ans. Plusieurs autres depuis, la dernière il y a six mois.	Urine difficilement depuis trois ans (onze ans après blenn.); jet bifide et petit ; dilatation.	Rétrécissement en arrière des bourses, laissant passer le n° 8.
38. D. C.	27	Une seule blenn. il y a sept ans; dure dix-huit mois.	Le jet commence à diminuer il y a deux ans (cinq ans après blenn.) ; incontinence d'urine.	Rétrécissements multiples ; le n° 9 passe.
39. L. H.	35	Blenn. il y a dix-neuf ans; dure un mois.	Urine difficilement (sept ans après blenn.). Un an plus tard, rétention d'urine sans cause appréciable ; dilatation, uréthrotomie ; récidive.	Rétrécissements multiples, le plus étroit au bulbe ; le n° 5 passe.
40. C. P.	30	Première blenn. en 1850 (il y a dix-neuf ans); dure longtemps. Deuxième blenn. il y a quinze ans. Troisième blenn. il y a huit ans, mal soignée.	Urine mal depuis huit ans (onze ans après la première blenn.) ; divulsion, récidive.	Rétrécissement bulbaire, laisse passer le n° 4.
41. H. E.	45	Blenn. il y a vingt-cinq ans ; dure longtemps, mal soignée.	Dix ans après la première blenn. première gêne de la miction ; dilatation ; récidive.	Rétrécissements multiples ; le plus étroit au bulbe, infranchissable pendant huit jours.
42. M. F.	37	Blenn. il y a dix-neuf ans; dure deux ans. Ecoulement ; dure douze ans; injections douloureuses.	Rétention d'urine il y a dix-huit ans (un an après la première blen.) ; dilatation récidive après sept ans sans traitement.	Rétrécissements multiples ; le n° 6 passe au bulbe.
43. S. P.	39	Blenn. il y a dix-sept ans, cordée; dure six mois.	Rétention d'urine il y a quinze ans (deux ans après la première blenn.) ; urine mal depuis treize ans (quatre ans après blenn.); dilatation ; abcès urineux, récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 8 passe au bulbe.
44. Q. D.	37	Blenn. il y a quatorze ans; dure six mois. Deuxième blenn. il y a douze ans, puis quatre autres jusqu'en 1865.	Difficulté à uriner depuis cinq ans (neuf ans après la première blenn.) ; rétention d'urine il y a quatre ans ; dilatation.	Rétrécissements multiples ; le n° 8 franchit.
45. D. M.	51	Blenn. il y a vingt-trois ans; dure trois semaines.	La gêne de la miction débute six ans après la première blenn.; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 8 passe.
46. D. C.	31	Blenn. il y a trois ans.	Urine mal depuis un an, deux ans après la première blenn.	Rétrécissement infranchissable à la racine de la verge.
47. D. I.	35	Première blenn. il y a dix ans.	Commence à uriner difficilement quatre ans après. Uréthrotomie du méat, dilatation récidive.	Rétrécissements multiples.
48. Q. Q.	43	Blenn. il y a vingt-six ans.	Urine mal depuis..... Uréthrotomie ; récidive.	Rétrécissements multiples très-étroits.
49. E. Q.	44	Chute sur une pièce de fonte il y a vingt-quatre ans.	Rétention d'urine huit jours après. Dilatation ; récidive.	Rétrécissement unique; laisse passer le n° 6.
50. B. R.	45	Coups sur le périnée il y a vingt-deux ans.	Le jet diminue depuis dix ans (douze ans après) ; rétention d'urine.	Rétrécissement unique ; laisse passer le n° 3.
51. D. M.	48	Blenn. il y a vingt-huit ans ; dure huit mois.	Difficulté pour uriner depuis vingt-deux ans (six ans après la première blenn.); diminution du jet depuis.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
52. P. L.	55	Blenn. il y a trente-deux ans.	Urine difficilement depuis quinze ans (six ans après la blenn.); rétention d'urine.	Rétrécissements multiples très-étroits.
53. M. A.	32	Blenn. il y a onze ans.	Urine mal depuis huit ans (trois ans après blenn.).	Rétrécissements multiples étroits.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
54. B. T.	48	Première blenn. il y a vingt-cinq ans; deuxième blenn. il y a quinze ans; troisième blenn. il y a cinq ans; quatrième blenn. il y a quelques mois.	Le jet d'urine diminue depuis quinze ans (dix ans après la première blenn.); rétention complète il y a dix ans.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe dans la vessie.
55. G. C.	54	Première blenn. il y a vingt-sept ans; depuis lors neuf autres, la dernière il y a vingt ans.	Le jet diminue depuis quatorze ans (treize ans après la première blenn.).	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
56. L. C.	49	Chute sur une barre de fer (traumatisme).	Hématurie; rupture complète de l'urèthre. Uréthrotomie externe.	Rupture du bulbe et de la partie spongieuse de l'urèthre; guérison.
57. A. E.	31	Rétrécissement traumatique, chute datant de ?.		Rétrécissement traumatique très-étroit.
58. B. C.	39	Blenn. il y a douze ans.	Difficulté pour uriner depuis trois ans (neuf ans après).	Rétrécissements multiples.
59. D. E.	37	Blenn. datant de?.	Urine avec difficulté depuis trois ans.	Rétrécissements multiples.
60. B. L.	54	Blenn. il y a huit ans.	Le jet d'urine diminue depuis un an (sept ans après blenn.); infiltration urineuse depuis huit jours.	Rétrécissement unique peu étroit.
61 M. F.	42	Blenn. il y a vingt-sept ans; dure longtemps.	Difficulté pour uriner depuis vingt ans (sept ans après blenn.); rétention d'urine il y a un mois.	Rétrécissements multiples très-étroits.
62. L. C.	36	Première blenn. il y a seize ans; deux autres, la dernière il y a six ans.	Le jet diminue depuis quatre ans (douze ans après la première blenn.); rétention d'urine; infiltration datant de quinze jours.	Rétrécissements multiples très-étroits.
63. N. A.		Blenn. il y a vingt-six ans.	Jet d'urine diminue depuis deux ans (vingt-quatre ans après blenn.).	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
64. B. J.	55	Blennorrhagie.	Urine mal depuis longtemps. Deux uréthrotomies par Civiale.	Rétrécissements multiples; le n° 7 passe.
65. F. A.	36	Blenn. il y a onze ans; jamais bien guérie.	Rétention d'urine, premier symptôme du rétrécissement.	Rétrécissements multiples et uréthrotomie.
66. F.	46	Blenn. très-ancienne.	Rétrécissement débute il y a huit ans.	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe difficilement.
67. C. J.	28	Blenn. il y a sept ans; dure longtemps. Deuxième blenn. il y a un an.	Difficulté pour uriner depuis dix-huit mois (cinq ans et demi après la première blenn.).	Rétrécissements multiples.
68. L. C.	34	Blenn. il y a huit ans.	Difficulté pour uriner; rétention d'urine	Rétrécissements multiples; le n° 7 passe.
69. P. E.	45	Blenn. cordée il y a vingt-cinq ans.	Urine mal depuis très-longtemps. Dilatation, récidives.	Rétrécissements multiples, le n° 6 passe.
70. L. F.	32	Chute sur le périnée (traumatisme).	Hématurie, douleur en urinant et fréquence de la miction depuis l'accident.	Rétrécissement unique très-étroit.
71. O. P.	67	Première blenn. il y a quarante-sept ans, suivie de plusieurs autres, la dernière il y a trente-sept ans.	Urine difficilement depuis vingt ans (vingt-sept ans après la première blenn.); rétention d'urine.	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe.
72. A.	60	Blenn. il y a trente ans, dure longtemps; habitudes alcooliques.	Difficulté pour uriner depuis huit ans (vingt-deux ans après la première blennorrhagie); incontinence d'urine. Dilatation et récidives.	Rétrécissement étroit, le n° 4 passe difficilement.
73. D. G.	51	Blenn. il y a trente-cinq ans, dure un an.	Rétention d'urine il y a un an; urine moins facilement depuis plusieurs années.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
74. Q. G.	42	Blenn. cordée; hypospadias.	Urine difficilement depuis six mois.	Rétrécissement très-étroit.
75. C.	30	Première blenn. il y a quinze ans, dure huit mois. Deuxième il y a quatre ans.	Difficulté et douleur en urinant depuis quatre ans (onze ans après la première blennorrhagie); incontinence d'urine.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
76. D. J.	25	Jamais de blennorrhagie. Il y a un an, exercices forcés à cheval; léger écoulement pendant trois jours; hématurie peu abondante il y a trois ans.	Difficulté pour uriner depuis treize mois.	Rétrécissement très-étroit au bulbe; le n° 3 passe.
77. A. A.	53	Rétention d'urine, suite de chute sur les pieds, il y a vingt-cinq ans. Il y a vingt-trois ans, blennorrhagie peu intense.	Difficulté pour uriner et fistule urinaire depuis quatre ans; dilatation, récidive.	Rétrécissement peu étroit; fistules périnéales et scrotales.
78. B. E.	19	Rétrécissement traumatique?, spasme de l'urèthre?; pas de blennorrhagie antérieure.	Rétention d'urine, difficulté pour uriner.	Rétréciss. en avant du bulbe; fausse route.
79. Th.	58	Blenn. il y a vingt-huit ans.	Difficulté pour uriner six mois après blennorrhagie, puis vingt et un ans presque sans traitement; plus tard trois uréthrotomies.	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe.
80. R.	62	Blennorrh. ancienne.	Rétention d'urine, tumeurs urineuses.	Rétrécissement peu étroit; fistules périnéales.
81. M. E.	38	Blenn. antérieure.	Infiltration d'urine.	Rétrécissement peu étroit.
82. H.	42	Blenn. antérieure et chancre au niveau du méat.	Urine difficilement depuis trois ans.	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe.
83. S. J.	25	Coup sur le périnée il y a deux mois et demi.	Petite plaie périnéale; difficulté pour uriner un mois à peine après l'accident.	Rétrécissement très-difficile à franchir.
84. C. A.	34	Rupture incomplète de l'urèthre pendant le coït, il y a six jours.	Hématurie.	Rétrécissement peu étroit.
85. R. A.	51	Rétrécissement traumatique de l'urèthre.		Rétrécissement très-étroit sous le pubis; le n° 4 passe difficilement.
86. V. P.	66	Blenn. ancienne; dure longtemps.	Difficulté pour uriner depuis trente-deux ans; dilatation, récidive.	Rétrécissement bulbaire infranchissable depuis deux ans; fistule périnéale.
87. G.	42	Blenn. il y a sept ans.	Urine avec difficulté un an après la blennorrhagie. Il y a huit ans, uréthrotomie; récidive.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
88. L.	65	Coup sur le périnée il y a plusieurs années.	Fistules urinaires.	Rétrécissement étroit.
89. D. A.	66	Blenn. antérieure.	Rétention d'urine, diminution du jet.	Rétrécissements multiples.
90. D. L.	70	Plusieurs blennorrhagies mal soignées; la dernière date de quinze ans.	Urine difficilement depuis longtemps; première rétention d'urine il y a huit mois (neuf ans après blennorrhagie).	Rétrécissements multiples; infiltration urineuse.
91. C. H.	30	Première blennorrhagie il y a trois ans, mal soignée; dure longtemps.	Difficulté pour uriner depuis quatre ans; rétention d'urine.	Abcès urineux, fistule, rétrécissements multiples.
92. R.	34	Blenn. cordée, il y a treize ans.	Urine difficilement depuis sept ans (six ans après blennorrhagie); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples laissant passer le n° 3; rétention d'urine.
93. G. F.	44	Blenn. il y a dix-sept ans; dure quatre ans.	Rétention d'urine (trois ans après blennorrhagie); dilatation, récidive au bout de huit ans. Nouvelle rétention; quatre uréthrotomies internes.	Rétrécissements multiples; abcès urineux.
94. G.	31	Plusieurs blennorrhagies.	Urine difficilement depuis plusieurs années.	Rétrécissements multiples.
95. L. J.	54	Blenn. il y a trente-six ans.	Rétention d'urine il y a vingt-deux ans; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples laissant passer le n° 5.
96. G.	36	Chute à cheval sur une planche.	Hématurie; rétention d'urine.	Déchirure complète de l'urèthre; uréthrotomie externe, guérison.

Initiales des malades.	Age.	Antécédent et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
97. M.	70	Blenn. antérieure.	Urine mal depuis six ans ; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples laissant passer le n° 5.
98. B. P.	26	Blenn. il y a quatre ans.	Difficulté pour uriner depuis plus d'un an.	Rétrécissement unique; le n° 4 passe.
99. D.	35	Blenn. il y a douze ans, mal soignée ; dure six mois.	Miction difficile six ans après ; divulsion, récidive (cinq ans après blenn.).	Rétrécissements très-étroits ; le n° 3 passe difficilement.
100. S.	33	Première blennorrhagie il y a seize ans; trois ou quatre depuis lors.	Rétention d'urine il y a onze ans; urine difficilement depuis un an.	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe.
101. M.	38	Première blennorrhagie il y a vingt ans.	Difficulté pour uriner il y a sept ans (treize ans après blennorrhagie).	Rétrécissements multiples ; le n° 6 passe.
102. B.	22	Écoulement et difficulté dans la miction à l'âge de douze ans ; pas de blennorrhagie, masturbation ?.	Jet petit, miction fréquente il y a cinq ans ; dilatation, récidive.	Rétrécissement très-sensible au niveau du bulbe ; laisse passer le n° 6.
103. A.	36	Passage d'une roue de voiture.	Hématurie, rétrécissement quelque mois après (cinq ans après blennorrhagie).	Rétrécissement très-étroit ; le n° 5 passe difficilement.
104. M.	51	Première blennorrhagie il y a dix-sept ans.	Difficulté pour uriner depuis douze ans ; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples ; fistules urinaires.
105. C.	47	Plusieurs blennorrhagies, la première il y a vingt ans, la dernière il y a quinze ans.	Urine difficilement depuis plusieurs années ; dilatation, récidive (neuf ans après blennorrhagie).	Rétrécissements peu étroits.
106. H. P.	38	Première blennorrhagie il y a seize ans; la deuxième dure trois mois ; troisième et quatrième, la dernière il y a onze ans.	Rétention d'urine il y a sept ans ; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 4 passe.
107. M.	31	Blenn. il y a onze ans; dure deux mois. Un an après, coup sur la région périnéale.	Rétention d'urine quinze jours après l'accident ; pas d'hématurie ; difficulté pour uriner et nouvelle rétention depuis deux ans.	Rétrécissement difficile à franchir au bout de deux mois; le n° 3 passe.
108. C. L.	66	Blenn. il y a trente ans ; dure longtemps.	Difficulté pour uriner depuis bien des années.	Rétrécissements multiples ; le n° 6 passe.
109. L.	63	Blenn. multiples et mal soignées.	Difficulté pour uriner depuis vingt-cinq ans.	Rétrécissements multiples.
110. B.	44	Blenn. il y a vingt et un an ; dure neuf mois.	Rétention d'urine depuis trois ans (dix-huit ans après la première blennorrhagie) ; le jet diminue depuis cinq ou six ans.	Rétrécissements multiples laissant passer le n° 3.
111. G. J.	40	Blenn. il y a vingt-cinq ans; dure trois ans. Un an après, chute sur le périnée, hématurie ; deuxième chute il y a quinze ans.	Urine moins bien depuis sa première chute; abcès urineux, fistules depuis deux ans et demi ; depuis trois mois urine goutte à goutte.	Rétrécissements multiples, infranchissables pendant six mois.
112. P.	50	Blenn. il y a trente ans; dure huit mois; pas de traumatisme.	Difficulté pour uriner depuis deux ans (vingt-huit ans après); infiltration d'urine il y a quatre mois.	Rétrécissements multiples ; le n° 4 passe; fistules urinaires.
113. L.	50	Blenn. il y a trente ans ; dure longtemps.	Gêne dans la miction depuis huit mois (vingt-neuf ans après blenn.); rétention d'urine il y a quinze jours.	Rétrécissements multiples peu étroits.
114. V.	24	Première blenn. il y a neuf ans ; deuxième blenn. il y a deux ans.	Difficulté pour uriner depuis un an et demi (sept ans après blenn.); pas de rétention.	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe.
115. H. L.	45	Il y a quatorze ans, fatigues d'équitation excessive. Première blenn. il y a dix ans; dure deux mois. Deuxième blenn. il y a trois ans.	Abcès urineux il y a quatorze ans ; incision, sonde à demeure, guérison. Le jet diminue depuis cinq ans ; urine goutte à goutte depuis trois ans.	Rétrécissement unique très-étroit ; le n° 3 passe.
116. L.	36	Première blenn. il y a vingt-deux ans ; deuxième blenn. il y a seize ans.	Difficulté pour uriner depuis onze ans; fistules urinaires. Uréthrotomie ; récidive.	Rétrécissements multiples, le n° 5 passe.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents. et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
117. B. E.	33	Jamais de blennorrhagie?, ni de traumatisme ; chancres, syphilis.	Urine difficilement depuis deux ans.	Rétrécissement bulbaire; le n° 6 passe.
118. Y.	56	Première blenn. il y a trente ans ; deuxième blenn. il y a vingt-cinq ans.	Le jet diminue depuis douze ans; fausse route il y a onze ans. Dilatation, divulsion ; récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 3 passe.
119. M.	44	Première blennorrh. il y a quatorze ans.	Difficulté pour uriner il y a deux ans, divulsion ; récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 5 passe.
120. G.	56	Blenn. il y a trente-six ans.	Urine difficilement depuis vingt-cinq ans, a subi plusieurs traitements antérieurs; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 5 passe.
121. C.	28	Première blenn. il y a neuf ans; dure neuf mois. Deuxième blen. il y a deux ans; dure sept mois	Urine moins bien depuis un an (huit ans après blenn.).	Rétrécissements multiples; le n° 3 franchit difficilement.
122. S.	45	Première blenn. il y a trente ans ; dure longtemps.	Difficulté pour uriner depuis quatorze ans (seize ans après blenn.); dilatation, récidive.	Rétrécissement multiples; le n° 7 passe.
123. P. Q.	41	Blenn. il y a dix-huit ans;dure quatre mois; orchite double.	Le jet diminue depuis dix ans (huit ans après blenn.).	Rétrécissements multiples ; le n° 8 passe.
124. C. A.	52	Blenn. il y a vingt ans, dure très-longtemps, mal soignée.	Urine difficilement depuis deux ans (dix-huit ans après blenn.).	Rétrécissements multiples ; le plus étroit au bulbe, infranchissable pendant trois mois.
125. J. M.	33	Blenn. il y a dix ans; dure cinq mois.	Le jet d'urine diminue depuis quatre ans (six ans après blenn.).	Rétrécissements multiples, infranchissables pendant deux mois.
126. L.	39	Rupture du canal pendant le coït; hématurie il y a quatre ans.	Six mois après, rétention d'urine; le jet commence à diminuer; divulsion il y a deux ans ; récidive.	Rétrécissement infranchissable pendant un mois; le n° 4 finit par passer.
127. M. C.	60	Dit n'avoir jamais eu de blenn.; cause inconnue.	Difficulté pour uriner depuis quinze ans, dilatation récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 5 passe.
128. J. C.	50	Blenn. il y a vingt-cinq ans.	Urine difficilement depuis cinq ans (vingt ans après blenn.); dilatation. récidive.	Rétrécissements multiples ; le n° 6 passe.
129. R. A.	64	Blenn. il y a bien des années.	Difficulté pour uriner depuis quatre ans.	Rétrécissements multiples, fistules périnéales et scrotales.
130. B. A.	53	Blenn. il y a vingt-cinq ans; dure un an, mal soignée.	Le jet commence à diminuer à 22 ans (trois ans après blenn.) ; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples, fistules urinaires.
131. R. A.	45	Blenn. il y a vingt-six ans.	Diminution du jet depuis dix ans (seize ans après blenn.).	Rétrécissements multiples peu étroits.
132. C. J.	45	Première blenn. il y a trente ans; plusieurs autres depuis ce temps-là.	Difficulté pour uriner (douze ans après blenn.).	Rétrécissements multiples très-étroits.
133. D. F.	30	Blenn. il y a cinq ans; dure deux mois.	Rétention d'urine il y a huit jours, infiltration urineuse ; jamais de difficulté pour uriner avant ce temps-là.	Rétrécissement périnéen peu étroit.
134. D. M.	64	Première blennorrh. il y a trente-sept ans ; deuxième blenn. il y a vingt-six ans.	Urine difficilement depuis onze ans (vingt-six ans après blenn.) ; dilatation récidive.	Rétrécissement difficile à franchir.
135. J. P.	52	Première blenn. il y a trente ans ; deuxième blenn. il y a vingt-huit ans.	Difficulté pour uriner depuis douze ans (dix-huit ans après blenn.).	Rétrécissements multiples ; le n° 9 passe.
136. R. A.	62	Blenn. il y a bien des années.	Urine difficilement depuis vingt-cinq ans ; dilatation forcée, récidive.	Rétrécissements multiples étroits.
137. T. A.	65	Blenn. il y a quarante-neuf ans ; chute sur le périnée il y a quatre ans.	Rétention d'urine il y a trente-trois ans; pas d'autres accidents pendant trente ans. Il y a trois ans et demi, fistules périnéales et nouvelle rétention d'urine.	Rétrécissement peu étroit au niveau du bulbe.
138. F. J.	33	Blenn. il y a cinq ans; dure deux mois.	Le jet diminue un an après ; urine difficilement depuis deux ans.	Rétrécissement bulbaire ; le n° 7 passe.