Initiales. des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
139. D. R.	48	Première blenn. il y a trente-deux ans; dure six mois. Plusieurs autres depuis.	Rétention d'urine deux ans après, urine moins bien depuis ce temps-là. Dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples.
140. C. J.	30	Première blenn. il y a quatre ans.	Urine difficilement presque immédiatement après blenn.	Rétrécissement bulbaire; le n° 7 passe.
141. B. J.	46	Blenn. ancienne.	Difficulté pour uriner depuis sept ans.	Rétrécissements multiples.
142. A. Q.	60	Première blenn. il y a quarante-deux ans.	Difficulté pour uriner depuis trente-quatre ans (huit ans après blenn.). Deux uréthrotomies internes; récidive.	Rétrécissement peu étroit.
143. D. H.	27	Première blenn. il y a trois ans et demi; deuxième blenn. il y a un an.	Difficulté pour uriner depuis six mois.	Rétrécissements multiples; le n° 8 passe.
144. B. R.	58	Blennorrh. il y a...?	Difficulté pour uriner depuis dix ans.	Rétrécissements multiples; le n° 9 passe.
145. R. C.	52	Blenn. il y a vingt ans, mal soignée.	Urine difficilement depuis seize ans (quatre ans après blenn.); abcès urineux, fistules urinaires depuis quatre ans.	Rétrécissements multiples laissant passer le n° 8.
146. Ch. H.	33	Blennorrh. il y a...?	Le jet diminue depuis six ans. Uréthrotomie interne; récidive.	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe.
147. L. A.	22	Blenn. il y a six ans; dure longtemps; non traitée.	Urine difficilement depuis six mois et avec un très-petit jet depuis deux mois (cinq ans et demi après blenn.).	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe.
148. C. A.	30	Blenn. il y a onze mois; écoulement persistant.	Fréquence dans la miction; difficulté pour uriner depuis six mois.	Rétrécissement peu étroit; uréthrite, cystite.
149. M. J.	40	Première blenn. il y a vingt ans; plusieurs depuis ce temps-là, la dernière il y a six ans.	Difficulté pour uriner depuis trois ans (dix-sept ans après blenn.).	Rétrécissements multiples très-étroits.
150. U. T.	72	Blenn. il y a bien des années.	La gêne de la miction date de douze ans.	Rétrécissement peu étroit; cystite, néphrite.
151. D. P.	46	Première blenn. il y a vingt-cinq ans? plusieurs autres depuis, la dernière il y a huit ans.	Difficulté pour uriner depuis un an.	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe.
152. L. C.	62	Plusieurs blenn., la dernière il y a vingt-deux ans.	Difficulté pour uriner depuis quinze ans. Dilatation, uréthrotomie interne; récidive.	Rétrécissements multiples.
153 H. J.	48	Première blenn. il y a vingt-cinq ans; plusieurs autres, la dernière il y a trois ans.	Difficulté pour uriner depuis trois ans: tumeur urineuse datant de quatre mois.	Rétrécissements multiples, très-étroits.
154. M. H.	54	Blenn. il y a vingt-cinq ans.	Difficulté pour uriner depuis quinze ans (dix ans après blenn.).	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe.
155. B. L.	57	Blenn. il y a trente-sept ans; dure trois semaines.	Diminution du jet et difficulté pour uriner depuis quatre ans (trente-trois ans après blenn.).	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe.
156. M. A.	25	Rupture de l'urèthre; chute d'un échafaudage.	Gêne dans la miction, trois semaines après l'accident.	Rétrécissement unique; le n° 9 passe.
157. M. V.	28	Première blenn. il y a dix ans.	Le jet est fin depuis trois ans, mais le malade urine moins facilement depuis six ans (quatre ans après blenn.).	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe.
158. C. J.	47	Blenn. il y a vingt-de ans; dure peu.	Difficulté pour uriner depuis deux mois.	Rétrécissement peu étroit, cystite du col.
159. B. L.	45	Blenn. il y a quatorze ans; dure cinq mois.	Difficulté pour uriner depuis deux ans (douze ans après blenn.); miction fréquente depuis deux mois.	Rétrécissement peu étroit.
160. B. H.	55	Blenn. il y a trente ans, dure six mois; mal soignée.	Le jet diminue depuis vingt ans, dix ans après blennorrhagie; difficulté pour uriner depuis six ans; jamais de rétention complète. Dilatation il y a seize ans; récidive.	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe.
161. F. L.	27	Première blennorrhagie il y a sept ans; deuxième il y a un an.	Difficulté pour uriner depuis trois mois, (sept ans après la première blennorrhagie).	Rétrécissements multiples, peu étroits.

Initiales des malades.	Age	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
162. R. E.	35	Blennorrh. il y a...?	Le jet diminue depuis sept mois.	Rétrécissements multiples; le n° 8 passe.
163. D. P.	41	Première blennorrhagie il y a vingt-cinq ans; deuxième, puis troisième il y a quinze ans.	Urine moins bien depuis quinze ans, dix ans après blennorrhagie; rétention d'urine il y a huit jours.	Rétrécissement unique, laisse passer le n° 4.
164. R. D.	57	Première blennorrhagie il y a vingt-neuf ans, deuxième il y a vingt ans.	Le jet diminue depuis sept ans (vingt-deux ans après blennorrhagie); rétention d'urine depuis un an.	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe difficilement.
165. A. L.	60	Première blennorrhagie il y a quarante ans; trois autres depuis; l'écoulement persiste longtemps.	Le jet diminue depuis trente-cinq ans, (cinq ans après blennorrhagie); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples laissant passer le n° 8.
166. L. E.	33	Blenn. il y a seize ans.	Rétention d'urine il y a six ans (dix ans après blennorrhagie); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples peu étroits.
167. P. C.	22	Blenn. il y a cinq ans; dure un mois.	Le jet diminue depuis cinq mois, quatre ans et demi après blennorrhagie; difficulté considérable pour uriner depuis cinq semaines.	Rétrécissements multiples peu étroits; le n° 15 passe.
168. P. G.	69	Blenn. il y a trente-cinq ans.	Difficulté pour uriner depuis dix ans (vingt-cinq ans après blennorrhagie).	Rétrécissements multiples.
169. D.	39	Première blennorrhagie il y a vingt ans; deuxième il y a quinze ans; troisième il y a dix ans; quatrième il y a un mois.	Le jet diminue depuis dix ans (dix ans après blennorrhagie); difficulté considérable pour uriner depuis un mois.	Rétrécissements multiples peu étroits; le n° 11 passe.
170. Q. A.	39	Première blennorrhagie il y a dix-sept ans; deuxième il y a quatre ans.	Difficulté pour uriner depuis trois ans (quatorze ans après blennorrhagie), rétentions d'urine; n'a jamais été sondé.	Rétrécissements multiples; le n° 7 passe.
171. R. H.	33	Première blennorrhagie il y a cinq ans; deuxième six mois après, dure encore.	Rétention d'urine il y a huit jours, urine moins bien depuis ce temps-là.	Rétrécissements multiples peu étroits.
172. C. F.	56	Blenn. il y a quarante ans, dure deux ans, mal soignée.	Difficulté pour uriner depuis trente ans (dix ans après blennorrhagie); rétention d'urine. Dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples; le n° 5 passe difficilement.
173. L. E.	55	Première blennorrhagie il y a quarante ans; quatre ou cinq depuis ce temps là, la dernière il y a vingt-cinq ans.	Difficulté pour uriner depuis dix ans; pas de traitement antérieur; rétention d'urine.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
174. C. J.	24	Blenn. il y a neuf ans, mal soignée; l'écoulement persiste.	Rétention d'urine il y a huit ans; nouvelles rétentions depuis lors; difficulté pour uriner depuis deux mois.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
175. S. J.	66	Jamais de blennorrhagie? Écoulement il y a quarante-cinq ans, après une ingestion considérable de bière.	Difficulté pour uriner depuis trente ans (quinze ans après blenn.). Dilatation, récidive; uréthrotomie, récidive.	Rétrécissements multiples; le n° 6 passe.
176. D. A.	46	Blenn. il y a trente ans.	Jet d'urine moins volumineux depuis vingt-neuf ans (un an après blenn.); grande difficulté pour uriner depuis quatre mois.	Rétrécissements multiples; le n° 8 passe.
177. P. L.	34	Première blenn. il y a dix ans. Deuxième blenn. deux ans après; l'écoulement persiste.	Difficulté pour uriner depuis cinq ans (cinq ans après blenn.); rétention d'urine il y a deux ans.	Rétrécissement peu étroit.
178. P. A.	29	Blenn. il y a treize ans; dure six mois. Ecoulement persistant.	Difficulté pour uriner depuis six ans (sept ans après blenn.); dilatation, rétention d'urine.	Rétrécissement bulbaire; le n° 10 passe.
179. Ch. L.	24	Première blenn. il y a cinq ans. Deuxième il y a un an; dure encore.	Rétention d'urine il y a deux mois (cinq ans après blenn.); difficulté pour uriner depuis ce temps-là.	Rétrécissements multiples; le n° 12 passe.
180. L. F.	45	Blenn. il y a quinze ans; dure trois semaines.	Difficulté pour uriner depuis dix ans (cinq ans après blenn.); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples; le n° 2 passe.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
181. L. O.	45	Blenn. il y a vingt-six ans.	Le jet diminue depuis dix-sept ans (neuf ans après blenn.); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples ; le nº 6 passe.
182. J.	36	Première blenn. il y a quinze ans. Troisième blenn. il y a un an.	Urine difficilement depuis quatre ans (onze ans après blenn.).	Rétrécissements multiples ; le nº 2 passe difficilement.
183. H. D.	40	Plusieurs blenn. mal soignées.	Difficulté pour uriner depuis six ans; abcès urineux, fistules. Uréthrotomie interne, récidive.	Rétrécissements multiples; le nº 5 passe.
184. Ch.	53	Blenn. il y a trente-neuf ans; mal soignée.	Difficulté pour uriner depuis vingt-quatre ans (seize ans après blenn.). Uréthrotomie interne, récidive; divulsion.	Rétrécissement unique; le nº 5 passe.
185. B.	39	Blenn. il y a dix-neuf ans; dure longtemps, mal soignée.	Difficulté pour uriner depuis onze ans (huit ans après blenn.).	Rétrécissement bulbaire; le nº 8 passe.
186. D.	26	Blenn. il y a six ans; dure un an. Deuxième blenn. il y a deux mois.	Rétention d'urine depuis huit jours ; urine mal depuis ce jour-là (six ans après blenn.).	Rétrécissement bulbaire peu étroit; le nº 15 passe.
187. P. A.	46	Blenn. il y a vingt-six ans; dure longtemps. Écoulement chronique.	Pisse mal depuis quatorze ans (douze ans après blenn); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples; le nº 5 passe.
188. J. J.	45	Choc contre le périnée il y a vingt-six ans; blenn. il y a dix-huit ans; dure longtemps.	Miction difficile tout de suite après le choc; dure six mois. Le jet diminue de nouveau il y a douze ans. Uréthrotomie, récidive.	Rétrécissement bulbaire très-étroit; fistule urinaire.
189. B. H.	64	Pas de blenn. Excès de table.	Rétention d'urine; difficulté dans la miction depuis quinze jours.	Rétrécissem. spasmodique; le nº 13 passe.
190. D.	41	Blenn. il y a quinze ans.	Douleurs en urinant; incontinence d'urine depuis trois mois; le jet diminue depuis plusieurs années.	Rétrécissement bulbaire; le nº 7 passe.
191. S. A.	47	Première blenn. il y a vingt ans ; trois autres depuis.	Difficulté pour uriner depuis un an (dix-neuf ans après blenn.); rétention d'urine il y a trois mois.	Rétrécissements multiples; le nº 7 passe.
192. C.	56	Blenn. il y a vingt-huit ans; dure longtemps.	Difficulté pour uriner depuis dix-sept ans (onze ans après blenn.).	Rétrécissements multiples ; le nº 6 passe,
193. G.	35	Blenn. il y a vingt ans; dure trois mois. Excès de boisson.	Rétention d'urine il y a six ans (quatorze ans après blenn.); depuis lors, gêne dans la miction et diminution du jet.	Rétrécissements multiples; le nº 5 passe.
194. F. L.	44	Pas de blenn. antérieure. Chancres sur le gland, mais pas au méat.	Difficulté pour uriner depuis huit ans ; miction douloureuse.	Rétrécissements multiples du méat et du milieu de la portion pénienne.
195. Th.	?	Pas de blenn. antérieure.	Difficulté pour uriner depuis sept ans.	Rétrécissement spasmodique (portion membraneuse).
196. B.	19	Première blenn. il y a cinq ans ; deuxième blenn. il y a deux ans ; mal soignées.	Rétention d'urine il y a un an (quatre ans après blenn.); depuis ce temps-là le jet diminue.	Rétrécissements multiples ; le nº 8 passe.
197. M. A.	28	Blenn. il y a cinq ans.	Diminution du jet il y a deux ans (trois ans après blenn.).	Rétrécissements multiples ; le nº 6 passe.
198. B.	41	Dit n'avoir jamais eu de blenn., ni chutes, ni coups sur le périnée ; alcoolisme.	Difficulté pour uriner; rétention d'urine il y a cinq ans. Uréthrotomie; récidive.	Rétrécissement infranchissable.
199. M. L.	24	Blenn. il y a deux mois; dure encore. Chute d'un troisième étage.	Rétention d'urine; dure huit jours de suite après chute, hématurie. Trois mois plus tard, nouvelle rétention.	Rétrécissement très-court, laisse passer le nº 12.
200. B.	50	Première blenn. il y a vingt-quatre ans.	Difficulté pour uriner depuis trois mois. Jet diminué depuis un an (vingt-trois ans après blennorrhagie); rétention d'urine.	Rétrécissements multiples; le nº 13 passe.
201. C. O.	38	Trois blennorrhagies. Première il y a vingt et un ans ; deuxième il y a dix-sept ans ; troisième il y a deux ans. Mal soignées.	Difficulté pour uriner depuis...?	Rétrécissements multiples ; le nº 6 passe.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
202. B. M.	53	Chute sur une pièce de bois, il y a quinze ans.	Hématurie; difficulté pour uriner depuis quatorze ans (un an après chute). Dilatation, récidive; uréthrotomie.	Rétrécissement bulbaire; le nº 5 passe.
203. J. C.	31	Première blenn. il y a neuf ans; deux autres depuis.	Le jet diminue depuis quatre ans (cinq ans après blenn.); première rétention d'urine il y a deux ans; nouvelle rétention il y a huit jours.	Rétrécissement bulbaire; le nº 8 passe.
204. L. A.	28	Blenn. il y a huit ans; dure deux ans. Mal soignée.	Difficulté pour uriner depuis deux ans (six ans après blenn.); rétention d'urine.	Rétrécissements multiples; le nº 8 passe.
205. G.	45	Première blenn. il y a trente ans; trois ou quatre depuis. Excès de boisson.	Difficulté pour uriner depuis sept ans (vingt-trois ans après blenn.).	Rétrécissements multiples ; le nº 6 passe.
206. B. A.	28	Blenn. il y a trois ans. Il y a six semaines, coup de pied au périnée; écoulement, pas d'hématurie.	Difficulté et douleur en urinant depuis six semaines.	Rétrécissement bulbaire, peu étroit; le nº 12 passe.
207. P. R.	44	Première blenn. il y a vingt-huit ans ; vite guérie. Deuxième blenn. trois ans plus tard.	Urine difficilement depuis quatorze ans (quatorze ans après blenn.); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples; le nº 5 passe.
208. S.	40	Dit n'avoir jamais eu de blenn.? Chancres il y a dix ans. On distingue encore les cicatrices sur la verge.	Difficulté pour uriner depuis six ans (quatre ans après blenn.); chancres.	Rétrécissement bulbaire; le nº 11 passe.
209. B.	30	Blenn. il y a quinze ans.	Diminution du jet depuis un an; difficulté pour uriner depuis cinq mois.	Rétrécissement bulbaire; le nº 13 passe.
210. B.	40	Blenn. il y a huit ans.	Diminution du jet depuis un an (sept ans après blenn.).	Rétrécissement bulbaire; le nº 11 passe.
211. M.	63	Blenn. il y a quarante ans.	Difficulté pour uriner depuis cinq mois (trente-neuf ans après blenn.).	Rétrécissements multiples peu étroits ; le nº 13 passe.
212. L.	59	Blenn. il y a sept ans; dure deux mois.	Difficulté pour uriner depuis un an (six ans après blenn.).	Rétrécissement bulbaire; le nº 13 passe.
213. D.	43	Blenn. il y a dix-sept ans.	Urine difficilement peu de temps après. Uréthrotomie, récidive.	Rétrécissement au niveau des bourses; le nº 9 passe.
214. H.	54	Dit n'avoir jamais eu de blenn.; pas de traumatisme.	Depuis un an, miction fréquente; difficulté pour uriner.	Rétrécissement bulbaire; le nº 14 passe.
215. L.	60	Première blenn. il y a treize ans; dure un an.	Difficulté pour uriner depuis dix ans (trois ans après blenn.).	Rétrécissements multiples; le nº 8 passe.
216. P. J.	44	Première blenn. il y a vingt ans; dure trois ans.	Urine difficilement depuis deux ans (dix-huit ans après blenn.); dilatation, récidive.	Rétrécissement ; le nº 15 passe.
217. G.	29	Première blenn. il y a quatorze ans ; trois ou quatre depuis.	Difficulté pour uriner depuis deux ans (douze ans après la première blenn.); dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples; le nº 8 passe.
218. K. J.	51	Première blennorrhagie il y a trente ans; deuxième blenn. il y a dix ans. Chancre du méat à la même époque.	Difficulté pour uriner et diminution du jet depuis neuf ans.	Rétrécissement du méat, le nº 5 passe; uréthrotomie du méat; pas de rétrécissement dans le reste du canal.
219. B.	51	Blenn. il y a trente ans; dure très-longtemps.	Urine difficilement depuis vingt-cinq ans (cinq ans après blennorrhagie); dilatation, récidive; rétention d'urine, fistules urinaires.	Rétrécissement infranchissable depuis deux ans.
220. M. F.	55	Coup de pied de cheval il y a huit mois; hématurie.	Difficulté pour uriner deux mois après l'accident; abcès urineux, infiltration d'urine.	Rétrécissements difficiles à franchir; infiltrations urineuses.
221 C. S.	45	Blenn. il y a trente ans.	Difficulté pour uriner depuis quinze ans ; dilatation, récidive.	Rétrécissements multiples; le nº 7 passe.
222. D.	26	Première blennorrhagie il y a six ans; plusieurs autres depuis.	Diminution du jet il y a deux ans, quatre ans après première blennorrhagie.	Rétrécissement unique; le nº 11 passe.
223. L.	28	Blenn. il y a six ans ; mal soignée.	Difficulté pour uriner depuis six mois; abcès urineux.	Rétrécissement bulbaire; fistules urinaires.

Initiales des malades.	Age.	Antécédents. et causes supposées.	Début et marche de la maladie.	État à l'entrée à l'hôpital.
224. C.	51	Première blennorrhagie il y a vingt ans; deuxième blenn. il y a dix ans.	Urine difficilement depuis dix ans (dix après première blennorrhagie).	Rétrécissements multiples; le n° 4 passe.
225. M.	37	Première blennorrhagie il y a dix ans; deuxième blenn. il y a sept mois.	Difficulté pour uriner depuis six mois (neuf ans après première blenn.); tumeur urineuse il y a six mois.	Rétrécissements multiples ; le n° 8 passe.
226. S. S.	35	Blenn. il y a trois ans.	Jet diminue depuis deux ans (un an après blennorrhagie).	Rétrécissement unique; le n° 8 passe.

CHAPITRE V

DU SPASME ET DE L'INFLAMMATION CONSIDÉRÉS COMME CAUSES DE RÉTRÉCISSEMENT DE L'URÈTHRE.

État des parois musculaires de l'urèthre, influant sur le calibre du canal. — Autorités citées.—Causes des rétrécissements musculaires. —Effets de l'inflammation sur l'urèthre.

Le lecteur aura observé qu'en détaillant les symptômes locaux des rétrécissements permanents, nous avons fait allusion à ce fait que de fréquentes variations dans le volume du jet de l'urine peuvent se présenter, et se présentent, indépendamment des attaques de rétention complète. Souvent un malade raconte de lui-même que, quoique son jet d'urine soit toujours beaucoup moins considérable qu'il ne l'était normalement, cependant *il est beaucoup plus libre certains jours que d'autres*. A quoi attribuer le fait ? D'abord c'est un fait certain et même assez fréquent; son explication se tire de la structure anatomique des organes, que nous avons, pour cette raison, décrite avec tant de détails dans une autre partie de l'ouvrage, et nous renvoyons le lecteur à quelques propositions que nous avons établies en peu de mots, mais d'une façon claire et facile à comprendre, afin de résumer les faits relatifs à ce sujet et de faciliter la mémoire et les recherches (voy. pages 42 et 43).

Ainsi, il est bien démontré actuellement (fait entrevu depuis longtemps par un grand nombre d'auteurs) qu'une portion de l'urèthre déjà rétrécie par un dépôt plastique peut avoir son calibre momentanément diminué par l'action des fibres musculaires qui l'entourent, dans n'importe quelle portion de son parcours. Cette circonstance ne dépend pas d'un effort volontaire, mais provient d'une irritation des nerfs sensitifs de l'organe, transmise aux centres nerveux, qui, par leurs rapports, soit avec la moelle épinière, soit avec quelque ganglion, réagissent sur les branches nerveuses motrices, lesquelles ont pour action de déterminer la contraction des fibres musculaires.

Cette irritation peut provenir parfois d'une exulcération de la muqueuse au niveau du point rétréci, ou simplement de la sensibilité exagérée ; de

telle sorte qu'une augmentation de l'acidité ou l'âcreté de l'urine suffit complétement, chez quelques malades, pour exciter l'action réflexe que nous venons de décrire. C'est ainsi que la présence d'un corps étranger, tel qu'un petit calcul, une sonde, une injection, etc., etc., combinée avec la sensibilité locale et générale, la constitution et l'idiosyncrasie du malade, pourra déterminer de ces contractions réflexes.

De plus, non-seulement les influences locales agissent sur le calibre de l'urèthre, mais il en est de même de l'état général du système nerveux qui, par son influence sur toutes les fibres musculaires du corps, peut aussi dilater ou resserrer ces muscles en particulier et manifester ainsi la *tonicité* ou l'absence de tonicité. Le froid et la chaleur produisent des effets contraires. Un frisson s'accompage d'une diminution du jet de l'urine; et réciproquement, lorsque le corps est relâché par la chaleur, on observe un jet plus volumineux. La congestion vasculaire interne qui se produit en même temps doit avoir une grande part dans la production de ces symptômes (1). Nous devons par conséquent nous attendre à trouver peu de cas de rétrécissements organiques qui n'aient pas une fois ou l'autre subi l'influence du spasme; l'observation est sur ce point pleinement d'accord avec le fait.

Ces remarques nous conduisent tout naturellement à la question que nous devons examiner maintenant : le spasme de l'urèthre se présente-t-il en dehors de l'existence d'un rétrécissement organique antérieur, quelque léger qu'il soit? Le fait peut avoir lieu peut-être dans des circonstances exceptionnelles; mais, dans la grande majorité des cas, il existe quelque lésion antérieure. On observe certains cas où la cause du spasme échappe à l'action des sens, et qu'on ne peut expliquer qu'en supposant qu'il prend son origine dans les centres nerveux eux-mêmes, et qu'il est le produit d'une action centrale plutôt que d'une action extérieure. Cette conjecture est tout à fait en harmonie avec ce que nous savons des lois qui gouvernent le système nerveux et avec les analogies qui se présentent dans l'action irrégulière des muscles des autres parties du corps. On peut ranger, sans aucun doute, dans cette catégorie les cas décrits par quelques auteurs comme des exemples de *rétrécissement spasmodique pur*, qu'ils regardent du reste comme extrêmement rares.

C'est ainsi que s'exprime à ce sujet Sir B. Brodie : « Il ne manque pas d'exemples de personnes sujettes depuis longtemps à des accès de rétention d'urine, suites de rétrécissements spasmodiques, quoique dans l'intervalle de ces accès le jet d'urine n'ait pas subi de diminution notable. Nous pouvons en conclure qu'un rétrécissement spasmodique peut exister en dehors de toute affection organique actuelle. Cependant il faut reconnaître que

(1) L'exemple suivant est un type qui se retrouve fréquemment :

Un policeman, atteint depuis trois ou quatre ans d'un rétrécissement organique peu étroit, et plus tard soigné par l'auteur, raconte qu'il faisait son service le matin de bonne heure, et souffrait beaucoup du froid en hiver. La présence de son rétrécissement se faisait sentir surtout à cette période du jour ; au contraire lorsqu'il était réchauffé, la difficulté d'uriner disparaissait presque entièrement. Peu après, il fut atteint d'une rétention d'urine opiniâtre, dans une de ces froides matinées, et depuis lors, le rétrécissement se prononça de plus en plus.