

Dès lors, il faut agir en conséquence, et non seulement suturer la peau, mais fermer l'orifice de sortie afin d'empêcher la chute dans la cavité abdominale des liquides sécrétés au niveau de la plaie. Voici donc, à notre avis, l'opération de choix : Si le sac n'est pas adhérent à la peau (ce qui est l'exception), l'isoler, suturer ou lier son collet, l'extirper, et suturer soigneusement l'orifice herniaire, après avivement de ses bords.

Si le sac est adhérent, on l'excisera simplement en même temps qu'un excédent de peau, généralement nécessaire à supprimer, pour obtenir un affrontement régulier des parties. Mais toujours on pratiquera la suture de l'orifice avec autant de soin que pour une plaie de l'abdomen.

Nos tableaux contiennent une seule observation de hernie obturatrice dans laquelle on a extirpé le sac après ligature de son collet. La cicatrisation a été lente, mais deux mois après il n'y avait pas de récurrence. Ce fait unique ne se prête évidemment à aucune généralisation.

Nous terminerons là notre étude sur l'opportunité des manœuvres de cure radicale dans la kélotomie pour étranglement. — Rationnelles dans l'opération de la hernie crurale, nettement indiquées dans celle de la hernie ombilicale, elles ne doivent pas être risquées lorsqu'on opère une hernie inguinale. — Cette conclusion résume les préceptes auxquels on doit à notre avis se conformer dans l'opération de la hernie étranglée.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

TABLEAU A. — HERNIES INGUINALES NON ÉTRANGLÉES¹

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de l'opération. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|--------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | | | SAC. | ANNÉAU. | | |
| * 1. ESMARCHEL. In <i>Neurolog. Archiv. f. Klin. Chirur. Bd. XXVI</i> , 2. | Homme. 26 ans. | Hernie droite. | 27 juin 1880. | Suture du collet. Ex- tirpation du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | Cicatrisation en 24 jours. | Pas de réci- dive au bout de 5 mois. |
| * 2. GUSSENBAUER. In <i>Bayer, Prager med. Wochenschrift</i> , 3 août 1884, n° 3. | Homme. 42 ans. | Hernie droite. | 11 janvier 1881. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | Cicatrisation en 38 jours. | Bon résultat éloigné. |
| * 3. GUSSENBAUER. In <i>Bayer, Prager med. Wochenschrift</i> , 3 août 1881, n° 31. | Homme. 43 ans. | Hernie réductible, double, de la grosseur d'une tête d'adulte. | 16 juin 1881. | Double opération en une séance. Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | | Mort le 3 ^e jour. Péritonite sep- tique. |
| * 4. HEUSNER. In <i>Aly. Deutsche med. Wo- chenschrift</i> , 1880, n° 42. | Homme. 63 ans. | Hernie droite de la grosseur du poing. | 1 ^{er} décem. 1879. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers. | Cicatrisation en 21 jours. | Guérison con- statée au bout de 5 mois. Pas de bandage. |
| * 5. HEUSNER. In <i>Aly. Deutsche med. Wo- chenschrift</i> , 1880, n° 42. | Homme. 63 ans. | Hernie gauche, suite de toux violente. | 2 avril 1882. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers. | Cicatrisation au bout de 21 jours. | Pas de réci- dive au bout de 4 mois. |
| * 6. HEUSNER. In <i>Aly. Deutsche med. Wochenschrift</i> , 1880, n° 42. | Homme. 30 ans. | Hernie droite. | 31 décem. 1879. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers. | Cicatrisation au bout de 30 jours. | Pas de réci- dive au bout de 2 mois. Pas de bandage. |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| * 7. MC. LEON. In <i>The Indian Medical Gazette</i> , vol. XVII, febr. 1882, n° 2. | Homme. 50 ans. | Hernie gauche. | | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | Réunion par première inten- tion. | Pas de réci- dive à la sortie. Ma- lade non revu. |
| * 8. L. MAYER. In <i>Cen- tralblatt</i> , 1877, n° 35, p. 347. | Homme. 41 ans. | Hernie droite. | 1 ^{er} juillet 1876. | Extirpation du sac. Suture du collet. | Pas de suture des piliers. | | Mort au bout de dix jours par gangrène du scrotum. Pas de peritonite. |
| * 9. MAAS. In <i>Bres- lauer ärztl. i. Zeitschrift</i> , 1879, n° 5 et 6, et commu- nication particulière. | Homme. 33 ans. | Dégénérescence fi- breuse du sac. Abscès. | 14 juin 1878. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | Cicatrisation en 3 semaines. | Hernie ingui- nale intersti- tielle constatée au bout de 6 m. |
| * 10. MAAS. In <i>Leis- rink, loc. cit. Tableau A</i> , obs. 109. | Femme. 15 ans. | Hernie droite réducti- ble. | 17 mars 1880. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Sutures des pi- liers au catgut. | Cicatrisation. | Résultat défi- nitif inconnu. |
| * 11. RIESSEL. In <i>Deutsche med. Wochenschrift</i> , 1877, nos 38, 39. | Homme. 30 ans. | Hernie gauche de la grosseur du poing. Réduction facile, l'an- neau admet l'extrémité de trois doigts. | 29 mai 1877. | Ligature du collet au catgut. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers par 6 points de suture. | Cicatrisation en 8 jours. | Guéri. Porte bandage. |
| * 12. RIESSEL. In <i>Leis- rink loc. cit. Tableau A</i> , obs. 22. | Homme. 58 ans. | Hernie droite oblique externe. | 7 février 1878. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | Cicatrisation en 35 jours, — hémorrhagie se- condaire, — gangrène du scrotum. | Malade revu le 11 nov. 1881. Pas de bandage. Résultat parfait. L'anneau est très rétréci. |

1. Nota bene. — Toutes les observations marquées d'une astérisque ont été empruntées aux tableaux de Leisrink.

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRAIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 13. RIESER. In <i>Lehrbuch, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 27. | Homme. 58 ans. | Hernie droite réductible. — Anneau admettant deux doigts. | 21 octob. 1878. | Ligature du collet. Exirpation du sac largement fendu. | Suture des piliers. | Cicatrisation. | Mort le 1 ^{er} juin 1879 d'un cancer du foie. A l'autopsie, aucune trace de hernie. Cicatrice étendue vers la partie profonde du canal herniaire. |
| * 14. SOCRIN. In <i>Général. Étude des résultats définitifs dans la cure radicale des hernies</i> . Lausanne, 1881. | Garçon. 45 ans. | Hernie double ayant beaucoup grossi dans les derniers temps. | 15 mars 1880. Hernie gauche. | Ligature du sac au catgut. | Suture des piliers au catgut. | Réunion par première intention. | Guérison constatée 17 mois après l'opération. Pas de bandage. Rien pendant la toux, mais l'anneau admet le doigt. |
| * 15. SOCRIN. In <i>Général. Étude des résultats définitifs dans la cure radicale des hernies</i> . Lausanne, 1881. | Garçon. 12 ans. | Hernie droite remontant à 2 ans, facilement réductible. — Kyste du cordon. | 7 février 1880. | Ligature du collet. Exirpation du sac. | Suture des piliers au catgut. | Réunion par première intention. | 17 mois après l'opération, guérison constatée. Pas de bandage. Rien pendant la toux ; l'anneau admet le doigt. |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| * 16. STUBSGAARD. In <i>Nordiskt medicinskt arkiv</i> , Bd. X, Heft 1, und <i>Centralblatt für Chirurgie</i> , 1878, page 489. | Homme. 55 ans. | Hernie inguinale. | 1878. | Exirpation du sac vide. Suture du collet. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Résultat définitif inconnu. |
| * 17. V. WAHL. In <i>Israelsohn, Über Radikal-operation der Hernien</i> . Dissertation Dorpat, 1880. | Homme. 42 ans. | Hernie double, grosse comme le poing. L'anneau admet deux doigts. | 22 août 1879. | Ligature du collet. Double exirpation. | Suture des piliers. | Cicatrisation. | Résultat inconnu. |
| * 18. WELZ. In <i>Becher, Prager med. Wochenschrift</i> , 3 août 1881, n° 31. | Homme. 42 ans. | Hernie gauche. Réductible. | 5 sept. 1878. | Ligature du collet du sac. | Suture des piliers à la soie. | Cicatrisation en 35 jours. | Pas de récurrence le 14 janvier 1879. Pas de bandage. |
| * 19. ANNANDALE. In <i>Edinb. med. Journal</i> , 1876, vol. 1, p. 1087. | Homme. 46. | Grosse hernie inguinale, réductible, et petite hernie crurale. | 1876. | Ligature du collet du sac de la hernie crurale à l'anneau (catgut). | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récurrence au bout de plusieurs mois du côté de la hernie inguinale. Petite récurrence de la hernie crurale. |
| * 20. FISCINA. In <i>Lawrentowski, Beiträge zur Radicaloperation d. Hernien</i> . Breslau, 1879. | Homme. 49 ans. | Hernie scrotale gauche. | 30 avril 1879. | Ligature du collet. Exirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Abcès scrotal; cicatrisation. | Terminaison inconnue. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE. | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|-------------------------|---|----------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 21. GUSSENBAUER. In <i>Bayr. Prager med. Wochenschrift</i> , 3 août 1881, n° 31. | Homme. 28 ans. | Hernie gauche réductible, de la grosseur d'une tête d'enfant. | 22 octob. 1881. | Ligature du collet. Exirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation en 52 jours. Abcès. | Résultat éloigné inconnu. |
| * 22. M.A.S. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 115. | Homme. 23 ans. | Hernie scrotale gauche. Hydrocèle de sac. | 4 juillet 1881. | Exirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Résultat définitif inconnu. |
| * 23. NUSSBAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 5. | Homme. 32 ans. | Hernie réductible droite. | 25 fév. 1879. | Suture du collet et exirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive jusqu'en juin 1881. |
| * 24. NUSSBAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 10. | Homme. 34 ans. | Hernie droite réductible. | 26 fév. 1881. | Suture du collet. Exirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive en juin 1881. |
| * 25. NUSSBAUM. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 13. | Garçon. 7 ans. | Hernie droite réductible. | 31 mai 1884. | Ligature et suture du collet. Exirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive en juin 1881. |
| * 26. RIBBEL. In <i>Deutsche med. Wochenschrift</i> 1877, nos 28, 39. | Homme. 52 ans. | Hernie droite, grosse comme un œuf de poule, — l'anneau inguinal est large. | 20 juin 1876. | Ligature au catgut du collet du sac. Exirpation du sac. La ligature glisse. Drainage. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation au bout de 10 jours. | Guéri. Porte bandage. |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|--|---------------------------------------|---|--|
| * 27. SOOXS. In <i>Stefan, Über Radical Operation d. Hernien. Wien. 1879 und Gubnod. Etude du résultat définitif dans la cure radicale des hernies. Lausanne, 1881.</i> | Homme. 24 ans. | Hernie du volume du poing, réductible. — Anneau admettant le doigt. | 2 fév. 1878. | Ligature du collet au catgut. Exirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. — Abcès. — Bandage. | Guérison constatée au bout de 14 mois, le 18 juillet 1881. 41 mois après l'opération, récidive complète. |
| * 28. BARDELEBEN. In <i>Leisvink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 146. | Garçon. 17 ans. | Hernie scrotale. L'anneau admet deux doigts. | 13 janv. 1880. | Ligature du collet. Ablation partielle du sac. | Suture des piliers au catgut. | Cicatrisation. | Malade non revu. |
| * 29. G. GRASSL. In <i>Ausdran, und Deutsche med. Wochenschrift</i> , 1878, page 24. | Homme. 25 ans. | Hernie droite, grosse comme un œuf de poule. — Anneau admettant trois doigts. | 13 nov. 1878. | Ligature du collet au catgut. Exirpation partielle du sac. | Suture des piliers au catgut. | Réunion par première intention. | Guérison absolue au bout de 4 mois. |
| * 30. BILLROTH. <i>Commentaire à Leisvink par Mikulicz et le Dr. Schüller.</i> | | Hernie double, datant de 20 ans, et grosse comme une tête d'adulte. | 1879. | Après ouverture du sac, réduction très difficile. Ligature du collet à la soie phéniquée. Drainage du sac non extirpé. Opération d'une durée d'une heure et demie. | Suture en bouton à la soie phéniquée. | | Mort 30 heures après l'opération. Péritonite généralisée commençante, constatée à l'autopsie. |
| * 31. GODLEE. In <i>Med. Times and Gazette</i> Oct. 22, p. 489. | Femme. 57 ans. | Très grosse hernie gauche. | | Ligature du sac. | Suture des piliers au catgut. | Cicatrisation. Élimination du sac par lambeaux. | Résultat inconnu. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXES ET ÂGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE DE L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|---|--------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 32. RIESSEL. In <i>Deutsche Wochenschrift</i> 1877, nos 38, 39. | Homme. 23 ans. | Hernie gauche facile à réduire. — Anneau admettant l'index. | 23 mars 1876. | Ligature du collet du sac au catgut. Le sac est ouvert et drainé. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation en 19 jours. | Guérison. |
| * 33. ALBERT. In <i>Wiener med. Presse</i> 1878, n° 36. | Homme. 63 ans. | Hernie gauche réduite. | 14 mars 1878. | | Suture simple au catgut des piliers du canal inguinal. | Cicatrisation en 14 jours. | A la sortie, pas de récurrence. |
| * 34. ALBERT. In <i>Wiener med. Presse</i> 1878, n° 36. | Homme. 19 ans. | Hernie réductible. Large anneau inguinal. | | | Triples suture au catgut des piliers du canal inguinal. | Cicatrisation. | Pas de récurrence. |
| * 35. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 23. | Homme. 32 ans. | Hernie réductible grosse comme un œuf de pigeon. | 12 juin. 1878. | Incision du canal. Ligature du collet et extirpation du sac. | Suture des piliers et de tout le canal. | Cicatrisation en 23 jours. | Bon résultat. |
| * 36. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 23. | Homme. 28 ans. | Hernie réductible de la grosseur de 2 poings. | 30 juillet 1878. | Incision du canal inguinal. Ligature du collet. Extirpation imparfaite du sac. | Suture du canal inguinal avec le catgut. | Cicatrisation. Le fond du sac n'ayant pas été extirpé, il existe une fistule à son niveau. | Bon résultat rapproché. Résultat éloigné inconnu. |
| * 37. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 26. | Homme. 26 ans. | Hernie droite de la grosseur du poing. | 26 sept. 1878. | Incision du canal inguinal. Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture du canal inguinal avec le catgut. | Réunion par première intention. | Bon résultat rapproché. Résultat éloigné inconnu. |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------------|--|---|---|---|
| * 38. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 28. | Homme. 34 ans. | Hernie gauche, de la grosseur d'un œuf d'oie. Réductible ainsi que le sac. | 5 déc. 1878. | Incision du canal inguinal. Le sac attiré à l'extérieur est lié et enlevé. | Suture des piliers. Le canal ing. est suturé au catgut. | Cicatrisation au bout de 10 jours. | A la sortie bon résultat. Résultat éloigné inconnu. |
| * 39. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 29. | Homme. 53 ans. | Hernie double réductible, constituée par l'S iliaque. | 28 déc. 1878. Côté gauche. | Incision du canal inguinal. Ligature du collet. Extirpation du sac. | Incision et suture du canal inguinal. | Cicatrisation en un mois. | Guérison constatée le 20 décembre 1880. |
| * 40. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 30. | Homme. 53 ans. | Hernie double réductible, même malade que ci-dessus. | 28 déc. 1878. Côté droit. | Ligature du collet. | Incision et suture du canal. | Cicatrisation en un mois. | Le 20 décembre 1880, guérison constatée. |
| * 41. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 31. | Homme. 24 ans. | Hernie scrotale, de la grosseur d'un œuf d'oie. L'orifice inguinal laisse passer l'extrémité du pouce. | 31 déc. 1878. | Incision du trajet inguinal. Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture du canal. | Cicatrisation. | Résultat final inconnu. |
| * 42. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 32. | Homme. 62 ans. | Hernie droite. | 2 janv. 1879. | Incision du canal. Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture du canal. | Cicatrisation. | Guérison constatée en août 1882. |
| * 43. RIESSEL. In <i>Leitcrink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 34. | Homme. 25 ans. | Hernie grosse comme une tête d'enfant. — Anneau admettant l'index. | 18 fév. 1879. | Incision du canal inguinal. Ablation du sac à l'exception du fond, qui est adhérent. | Suture du canal inguinal. | Cicatrisation. La partie adhérente du sac se mortifie et s'élimine. | Début de récurrence le jour de l'écoulement, au 4 avril 1879. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|-------------------------|--|----------------------|--|------------------|---|---|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 44. RIESEL. In <i>Leirink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 35. | Homme. 34 ans. | Hernie droite. | 4 mars 1879. | Ligature du collet. Extirpation du sac. Incision du canal. | Suture du canal. | Cicatrisation en 41 jours. | Résultat final inconnu. |
| * 45. RIESEL. In <i>Leirink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 36. | Homme. 34 ans. | Hernie droite, de la grosseur d'un œuf d'oie. — Anneau admettant le pouce. | 27 mars 1879. | Incision du sac et du canal. Ligature du collet et extirpation du sac. | Suture du canal. | Cicatrisation. | Le 7 décembre 1879, guérison parfaite. — Oblitération de l'anneau inguinal. |
| * 46. RIESEL. In <i>Leirink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 37. | Homme. 23 ans. | Hernie droite, grosse comme un œuf d'oie. | 25 avril 1870. | Incision du canal. Résection du sac. | Suture du canal. | Cicatrisation en 13 jours. | Le 5 juin 1879 guérison complète. Anneau oblitéré. |
| * 47. RIESEL. In <i>Leirink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 38. | Homme. 52 ans. | Hernie grosse comme un œuf de poule. Réductible ainsi que le sac. | 30 mars 1879. | Incision du canal. Ablation du sac. | Suture du canal. | Abcès. Cicatrisation au bout de 18 jours. | A la sortie, guérison complète. Résultat définitif inconnu. |
| * 48. RIESEL. In <i>Leirink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 40. | Homme. 49 ans. | Hernie double. Hydrocèle à gauche. | 29 nov. 1879. | Incision du canal. Sac extirpé, le fond non compris. | Suture du canal. | Cicatrisation. | Au bout de 3 mois, à droite, pendant la toux, point de hernie. Le canal inguinal est oblitéré des deux côtés. |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|---|-------------------------------|--|---|
| * 49. RIESEL. In <i>Leirink, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 41. | Homme. 49 ans. | Hernie double. Hydrocèle à gauche. | 29 nov. 1879. | Incision du canal et ouverture de la tunique vaginale. | Suture du canal. | Cicatrisation. | Il ne se modifie pas pendant la toux. Le canal est oblitéré à gauche. Il ne se modifie pas pendant la toux. |
| * 50. RIESEL. In <i>Deutsche med. Wochenschrift</i> , 1877, nos 38, 39. | Homme. 56 ans. | Hernie droite réduite. — Anneau admettant deux doigts. | 3 avril 1878. | Invagination du sac. Trois sutures au catgut à travers le sac invaginé. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation en 4 semaines. | Récidive au bout de 2 ans. |
| * 51. BUCHANAN. In <i>British med. Journal</i> , 1878, vol. 7, pag. 735. | Garçon. 16 mois. | Hernie congénitale, de la grosseur du poing. | 1878. | Sac incisé à sa partie moyenne. La partie inférieure est utilisée comme vaginale. La partie supérieure du sac est refoulée dans le canal inguinal. Suture à travers les parois du canal et à travers la portion du sac invaginé. Suture de la peau. | Suture des piliers à la soie. | Cicatrisation en 3 semaines. | Guérison complète à la sortie. |
| * 52. CZERNY. In <i>Czerny loc. cit.</i> and <i>Braun, Berlin. Klin. Wochenschrift</i> , 1881, n° 4. | Garçon. 18 mois. | Hernie congénitale double. | 26 juillet 1877. | Les sacs sont incisés jusqu'au collet. Ligaturé à la soie des deux côtés. | Suture des piliers à la soie. | A gauche, réunion par première intention. A droite, phlégomon. Élimination de la suture et de la ligature. | Récidive en septembre 1880, à droite. A gauche insuccès complet. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE DE L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|---|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|---|--|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| 53. CERNY. In <i>Tilanus. Congres international sept.</i> 1879, <i>und Bratsch, l. c.</i> | Garçon. 10 mois. | Grosse hernie congénitale double. | 24 janv. 1879. | Incision des deux sacs. Ligature au catgut des deux collectes. Pas d'extirpation du sac. | Suture au catgut des piliers. | Cicatrisation. | Exeat au 26 ^e jour. En juillet 1880, la guérison s'était maintenue. |
| * 54. RIESEL. In <i>Leisrirk, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 39. | Homme. 26 ans. | Hernie droite congénitale de la grosseur d'un œuf d'oie. Ectopie testiculaire. La hernie repousse le testicule en avant. | 23 janv. 1879. | Incision du canal inguinal. Ouverture du canal péritonéo-vaginal. Le testicule est refoulé au fond du scrotum, et au moyen de points de suture on l'enferme dans une tunique vaginale qu'on lui crée. | Suture du canal. | Cicatrisation. | A la sortie du malade, le testicule se trouve au - devant de l'anneau inguinal. Le doigt ne peut pas trouver l'anneau. Guérison constatée le 6 août. |
| 55. SOCRIN. In <i>Victor Guénot. Etude du résultat définitif dans les hernies.</i> Lausanne, 1881. | Garçon. 2 ans 1/2. | Hernie congénitale gauche ayant beaucoup grossi dans ces derniers temps. | 19 mai 1879. | | | Cicatrisation en 4 semaines. Suppuration. | Guérison constatée 25 mois après l'opération. |
| 56. LANGENBECK. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> , pag. 12 et 13. | Homme. 18 ans. | Hernie épiploïque congénitale. | 1879. | Ligature et ablation de l'épiploon adhérent. | Suture des piliers. | Cicatrisation. | Résultat définitif inconnu. |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|---|--|---|--|
| * 57. LEISRIK. <i>Observation personnelle.</i> | Garçon. 13 ans. | Hernie épiploïque congénitale dans une hydrocèle funiculaire. | 1881. | Ablation de l'épiploon | Suture des piliers à la soie. | Cicatrisation en 41 jours. | Pas de récurrence en septembre 1882. |
| * 58. SCHROE. In <i>Künneke, Neue Verbandmethode, etc. v. Langenbecks, Archiv.</i> xxviii, p. 106. | Homme. 26 ans. | Hernie épiploïque congénitale. | | | | Cicatrisation par première intention. | Pas de récurrence à la sortie. Malade non revu. |
| * 59. BRUX. In <i>Wiener med. Wochenschrift</i> , 1879, nos 36, sq. | Femme. 39 ans. | Très grosse hernie double irréductible. Grandes douleurs. Elle renferme intestin, utérus et annexes. | 1878. | Réduction après dilatation de l'anneau. Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers inguinaux avec suture en lacet. | Abrasion des lèvres de la plaie. Cicatrisation au bout de 2 mois. | Guérison complète à la sortie. |
| * 60. ESMARCH. In <i>Hermann Becker, die Herniotomien d. Kieiser Klinik, Kiel</i> , 1880. | Homme. 65 ans. | Sac enflammé. | 19 fév. 1879. | Suture du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers au catgut. | Abcès. Cicatrisation. | Pas de récurrence 21 mois après. Bandage. |
| * 61. ESCHLICH. In <i>Wiener Klinik</i> , 1878, n° 3. | Homme. 27 ans. | Hernie gauche, très difficilement réductible. Anneau admettant trois doigts. | 1878. | Ouverture du sac. Suture du collet, des piliers et de la peau. Drainage. | | Réunion par première intention. 2 petits abcès. | Cicatrices forment rétractée. Récidive interstittelle. |
| * 62. H. FISCHER. In <i>Laurentowski, Beiträge zur Radicaloperation d. Hernien.</i> Breslau, 1879. | Homme. 27 ans. | Hernie droite, grosse comme une tête d'adulte, irréductible. | Février 1878. | Le cocum est engagé dans la hernie. Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers au catgut. | Phlegmon du sac. Cicatrisation. | La récurrence apparaît dès que le malade quitte le lit. Bandage. |
| 63. KÜSTER. In <i>Tilanus, l. c.</i> | Garçon. 3 ans. | Hernie irréductible. | Mars 1878. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers. | | Mort par péritonite septique. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATEUR | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|-------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| 64. LEISERIK. <i>Observation personnelle.</i> | Homme. 65 ans. | Très grosse hernie scrotale irréductible. | 8 février 1882. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers à la soie. | Réunion par première intention. | Résultat inconnu. |
| 65. PAULY. In <i>Centralblatt für Chirurgie</i> , 1878, n° 13, pag. 201, sq. | Femme. 43 ans. | Hernie gauche descendant à mi-cuisse. Longueur, 23 cent.; circonférence, 37 cent. L'orifice admet 3 doigts. <i>Hernie irréductible.</i> | 21 déc. 1877. | Double ligature du collet. Ablation du sac. Suture de la peau au niveau du collet. | Suture des piliers au catgut. | Cicatrisation au bout de 2 mois. | A la sortie l'orifice inguinal est oblitéré. |
| 66. SCHMID. In <i>Titanus</i> , pag. 13. | Homme. 37 ans. | Hernie irréductible. | 8 octob. 1878. | Ligature du collet et extirpation du sac. | Suture des piliers au catgut. | Cicatrisation au bout de 12 jours. | Guérison vérifiée au bout de 6 mois. |
| 67. SCHMID. In <i>Titanus</i> , pag. 13. | Homme. 55 ans. | Grosse hernie irréductible. | janvier 1879. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers. | | Mort 4 heures après l'opération. |
| 68. SCHMID. In <i>Titanus</i> , pag. 13. | Homme. 37 ans. | Hernie irréductible. | mars 1879. | Ligature du collet et extirpation du sac. | Suture des piliers. | Cicatrisation en 36 jours. | Malade non revu. |
| 69. SOCRIS. In <i>Stefan, Über Radical operation d. Hernien Wien</i> , 1879, und <i>Guénod. Etude du résultat définitif dans</i> | Homme. 30 ans. | Hernie gauche irréductible, grosse comme une tête d'enfant. | 10 nov. 1877. | Ligature du collet au catgut. Extirpation du sac. Drainage. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation en 31 jours. | Le 14 décembre sorti avec bandage. Récidive au bout de 2 mois. Nouvelle opération |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| <i>la cure radicale des hernies. Lausanne</i> , 1881. | | | | | | | Le 29 janvier 1879. Extirpation et ligature. Suture de l'orifice. Nouvelle récidive. |
| 70. SOCRIS. In <i>Victor Guénod. Etude du résultat définitif dans la cure radicale des hernies. Lausanne</i> , 1881. | Femme. 33 ans. | Hernie gauche très douloureuse et non réductible. Symptômes d'étranglement. | 24 janv. 1880. | Suture du collet au catgut. | Suture des piliers, 3 ligatures au catgut. | Cicatrisation au bout de 7 jours. | Récidive brusque au bout de 5 mois. Au bout de 17 mois l'anneau admet l'index. Pendant la toux, hernie de la grosseur d'une noix. |
| 71. UNDE. In <i>Titanus, loc. cit.</i> , pag. 45. | Homme. 39 ans. | Hernie grosse irréductible. | 1878. | Extirpation du sac. | Suture des piliers. | Cicatrisation. | Guérison constatée au bout de 12 mois. N'a pas guéri. |
| 72. MAAS. In <i>Leislerink, loc. cit.</i> , Tableau A, obs. 112. | Homme. 43 ans. | Hernie très grosse irréductible. Sac épais. | 23 juillet 1880. | L'opération est restée inachevée, en raison du shock qu'a déterminé la réduction de l'intestin. | | | |
| 73. CZERNY. In <i>Titanus. Congrès international, sept. 1879, und Braun, l. c.</i> | Homme. 45 ans. | Grosse hernie gauche, peu réductible. | Avril 1878. | Ligature du collet à la soie phénique. Ouverture du sac. Drainage. Pas d'extirpation du sac. | Suture à la soie phénique. | | Gangrène du scrotum. Mort par embolie syphilitique. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE | SEXES ET ÂGES DE L'OPÉRÉ | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DEFINITIF. |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|---|--|---|
| | | | | SAC. | ANNÉAU. | | |
| * 74. CZERNY. In <i>Czerny, Beiträge zur operativen Chirurgie, und Maas, Breslauer ärztl. Zeitschr.</i> , 1879, n° 5 et 6. | Homme. 45 ans. | Hernie droite. L'anneau est très large. La hernie est irréductible. | 8 février 1877. | Intestin adhérent. Ligature au catgut du collet. Sac incomplètement extirpé en raison des adhérences. | Suture au catgut des piliers. | Cicatrisation, mais abcès scrotaux. Guérison complète en 27 jours. | Récidive au commencement de 1878. Bandage. |
| * 75. CZERNY. In <i>Tilanus, Congrès international, sept. 1879, und Braun loc. cit.</i> | Homme. 32 ans. | Hernie gauche irréductible. L'anneau admet deux doigts. | 11 janv. 1879. | La hernie est constituée par l'anneau. Ligature du collet. Pas d'extirpation du sac. | Suture des piliers à la sote phéniquée. | Cicatrisation au bout de 48 jours. | A la sortie, petite récidive. En septembre 1880, même état qu'au début. |
| * 76. KÜSTIG. In <i>Walzberg, Biedel, Deutsche Zeitschrift f. Chirurg.</i> , xxv, 5e et 6e fascicule. | Homme. 43 ans. | Hernie colossale, irréductible. | | Ligature du collet. Extirpation partielle du sac. | Suture des piliers au catgut. | Cicatrisation en 4 semaines. | Résultat inconnu. |
| * 77. ESMARCH. In <i>Hermann Becker, Die Herniotomien d. Kie-ler Klinik, Kiel</i> , 1880. | Garçon. 16 ans. | Hernie scrotale gauche irréductible. Hydrocèle. | 6 juillet 1879. | Suture des parois du sac au-dessous de l'anneau. Pas de drain. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation par seconde intention. | Guérison 3 mois 1/2 après l'opération. Bandage. |
| * 78. LANGENBECK. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> , pag. 12, 13. | Homme. 45 ans. | Hernie irréductible. | 1879. | Ligature du collet. | Pas de suture des piliers. | Pas de cicatrisation. | Mort le 6e jour de collapsus. Hémorrhagie par les vaisseaux du cordon. |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| * 79. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik, Die moderne Radikaloperation der Unterleibsbrüche</i> , 1880, pag. 1, n° 3 du tableau. | Homme. 40 ans. | Hernie droite compliquée d'adhérences. | 11 nov. 1876. | Extirpation du sac. Suture du collet. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Récidive au bout d'un an. |
| * 80. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> , Tableau A, obs. 4. | Homme. 25 ans. | Hernie gauche compliquée d'adhérences. | 6 déc. 1878. | Extirpation du sac et suture du collet. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Légère récidive. |
| * 81. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> , Tableau A, obs. 6. | Homme. 35 ans. | Hernie droite avec adhérences. | 26 juillet 1879. | Drainage du sac. Suture. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive jusqu'en juin 1881. |
| * 82. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> , Tableau A, obs. 7. | Garçon. 7 ans. | Hernie droite avec adhérences. | 9 juillet 1880. | Ligature du collet et extirpation du sac, puis suture. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive jusqu'en juin 1881. |
| * 83. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> , Tableau A, obs. 11. | Homme. 31 ans. | Hernie droite compliquée d'adhérences. | 8 mars 1880. | Suture du collet. Extirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive en juin 1881. |
| * 84. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> , Tableau A, obs. 12. | Homme. 30 ans. | Hernie droite compliquée d'adhérences. | 9 avril 1881. | Suture du collet. Extirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive en juin 1881. |
| * 85. V. NUSSBAUM. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> , Tableau A, obs. 14. | Garçon. 8 ans. | Hernie droite irréductible, renfermant l'appendice iléo-cæcal. | 14 juin 1881. | Ligature. Extirpation partielle du sac. Drainage. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive en juin 1881. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|---|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|---|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 86. SCHERDE. In <i>Centralbl. f. Chir.</i> 1877, n° 4. | Homme. 53 ans. | Hernie scrotale gauche, irréductible, très douloureuse. Hydrocèle biloculaire. | 12 sept. 1877. | Quatre mois auparavant, opération radicale contre l'hydrocèle. Le sac, très épais, est incisé et suturé au moyen de points très rapprochés. A la partie supérieure du sac, l'affrontement est fait en surface. Il est fait suivant les bords à la partie inférieure. Points de suture en capiton à travers le sac non extirpé. Drain dans le collet. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. Sac très rapidement oblitéré. Excise au 35 ^e jour. Pas de bandage. | A la mi-octobre, le canal est remplacé par un cordon cicatriciel qui s'insère sur le tegument. Point de bandeage, car la récurrence est impossible. |
| 87. SCHERDE. In <i>Tafelbuch, pag. 13.</i> | Homme. 58 ans. | Hernie irréductible. | Décemb. 1878. | Ligature du collet. Exstirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation au bout de 72 jours. | Guérison vérifiée au bout de 4 mois. |
| 88. SOEX. In <i>Stef. f. Ober. Med. Oper. d. Hernien, Wien, 1879, und Guénod, loc. cit.</i> | Homme. 57 ans. | Hernie gauche irréductible, deux fois étranglée précédemment. Petite hernie du côté droit. | 15 nov. 1878. | Liquide roussâtre abondant dans le sac. Les parois du sac ont de trois à cinq millimètres d'épaisseur. Il ne renferme aucun viscère. Ligature du sac dans le canal inguinal et extirpation. | Pas de suture des piliers. | Suppuration. Cicatrification au bout de 2 mois 1/2. | Guérison constatée au bout de 6 mois. Elle persiste jusqu'en octobre 1880. A ce moment, se produit une nouvelle hernie, pendant un accès de toux. — L'anneau inguinal admet 3 doigts. |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|---|---|--|---|
| 89. JULLIARD. Observation inédite. | Homme. 52 ans. | Hernie inguinale droite, non étranglée, grosse comme le poing, irréductible. | 21 avril 1882. | Incision de la peau et du sac. Exstirpation du sac. Suture du collet avec plusieurs fils de catgut. Sutures de la peau au catgut. | Pas de suture des piliers. | Un abcès survenu le 12 mai retarde la cicatrification qui n'est complète que 50 jours après l'opération. | Malade non revu. |
| 90. JULLIARD. Observation inédite. | Homme. 63 ans. | Hernie inguinale gauche, irréductible et douloureuse. | 16 mai 1883. | L'intestin est adhérent. Dissection de ses adhérences. Le Thermocautère arrête l'hémorragie de la surface de dissection. Réduction de l'intestin. Excision d'une partie du sac. Ligature du collet. Dix-huit points de suture en capiton sur ce qui reste du sac. | Pas de suture des piliers. | Réunion par première intention. Le port d'un bandage est conseillé. | Malade non revu. |
| * 91. ALBERT. In <i>Wiener med. Presse</i> , 1878, n° 36. | Homme. 34 ans. | Hernie gauche, de la grosseur du poing. Irréductible. | 14 janv. 1877. | Le sac est suturé. | Suture triple au catgut des parois du canal inguinal. | Hémorragie dans le scrotum. Suppuration. Cicatrification au bout de trois mois. | A la sortie pas de hernie pendant la toux et les efforts. |
| * 92. BILLROTH. <i>Obs. inédite.</i> Communiquée par Mikulicz et le Dr Schöster. | | Hernie gauche. A trois reprises, étranglée, guéri par le taxis. La hernie est réductible. | 1879. | Ligature de l'épiploon. Oblitération du sac au moyen de sutures en bouton, après ablation partielle du sac. | Suture en bouton des piliers. | Cicatrisation. Gangrène partielle de la peau au niveau de l'incision. | Le 12 octobre 1881, pas de récurrence. Pas de bandage. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXES ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATEUR. | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|--------------------------|---|----------------------|--|---|---|--|
| | | | | SAC. | ASSEAU. | | |
| *93. BILLROTH. <i>Obs. inédite. Communiqués par Mikulicz et le Dr Schaeffer in Leitzrinsk, loc. cit.</i> | | Hernie petite, facilement réductible. | 1880. | Ouverture du sac. Ablation d'un morceau d'épiploon. Extirpation du sac, après ligature du collet. | Suture en bouton à la soie phéniquée. | Cicatrisation après suppuration de la plaie. | Résultat éloigné inconnu. |
| *94. CZERNY. In <i>Beitrag zur operativen Chirurgie, und Mas. Breslauer Zeitfchr.</i> 1879, n° 5 et 6. | Homme. 36 ans. | Hernie gauche de la grosseur de deux poings. L'anneau laisse passer trois doigts. La hernie est partiellement irréductible et très douloureuse. | 12 janv. 1877. | Ablation de la hernie épiploïque. Excision du sac au niveau du collet. | Summe des piliers au catgut. | Cicatrisation au bout de 14 jours. Abscès du scrotum. | Récidive de la grosseur du poing au commencement de l'année 1878. Bandage. |
| 95. HOEMOKI. In <i>Wiener med. Presse</i> , 1879, n° 10 und <i>Tilanus</i> , pag. 13. | Homme. 38 ans. | Hernie droite. L'anneau admet deux doigts. | 1877. | Ablation de l'épiploon. Suture du collet. Pas d'ablation du sac. Drainage. | Suture des piliers. | Cicatrisation en 78 jours. 2 abscesses. | Guérison constatée au bout d'un an et demi. |
| *96. ILIUS. In <i>Hermann, Becker die Hernienoperationen d. Kielev Klinisk Kiel</i> , 1880. | Homme. 20 ans. | Épiploécèle gauche, volumineuse, irréductible. | 3 janv. 1879. | Ablation de deux masses épiploïques de la grosseur du poing. | Suture des piliers au catgut. | Septicémie. Drain dans la cavité abdominale. | Guérison constatée 24 mois après. Pas de bandage. |
| *97. RIESSEL. In <i>Leitzrinsk, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 24. | Homme. 39 ans. | Hernie droite compliquée de varicocèle et d'hydrocèle. | 12 juillet 1878. | Incision du canal inguinal. Ligature du collet. Ablation de l'épiploon adhérent. Excision du varicocèle. Ouverture de l'hydrocèle. | Summe du canal inguinal avec du catgut. | Cicatrisation en 42 jours. | Bon résultat immédiat. Résultat éloigné inconnu. |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|---|
| 98. SCHNEZ. In <i>Tilanus</i> , pag. 43. | Homme. 33 ans. | Hernie irréductible. | Avril 1879. | Ligature du collet et extirpation du sac après ablation de l'épiploon. | Suture des piliers. | Cicatrisation au bout de 8 jours. | Malade non revu. |
| 99. SOGIN. In <i>Victor Guérin. Étude du résultat définitif dans la cure radicale des hernies. Lausanne</i> , 1881. | Garçon. 15 ans. | Hernie double ayant fortement grossi dans ces derniers temps. | 23 janv. 1880. | Ablation de l'épiploon adhérent et ligature du sac. | Suture des piliers au catgut. (?) | Réunion par première intention. Orchite. Petite fistule tardive à l'angle inférieur de la plaie. | 47 mois après l'opération, guérison constatée. Pas de bandage. Pas d'impulsion pendant la toux; mais les deux anneaux admettent le doigt. |
| 100. SOGIN. In <i>Guérin. Étude du résultat définitif dans la cure radicale des hernies. Lausanne</i> , 1881. | Femme. 36 ans. | Hernie gauche du volume d'un œuf irréductible. Douleurs vives. | 47 avril 1880. | Ablation de l'épiploon adhérent. Ligature du collet. | Suture des piliers au catgut. (?) | Réunion par première intention. | Guérison constatée 14 mois après. L'anneau admet l'intro-duction du petit doigt. |
| 101. ENGBACH. In <i>Wiener Klinik</i> , 1878, n° 3. | Homme. 33 ans. | Hernie gauche réductible. L'anneau a 0m,02 1/2 de largeur. | 1878. | L'épiploon adhérent est enlevé. Ouverture du sac. Suture du collet, des piliers et de la peau. Drainage. | | Cicatrisation après élimination de tissu cellulaire et de tout le sac. | Guérison constatée à la sortie. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC | DATE de l'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATEUR | | EPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| 102. DITTEL. In <i>Tilanus, und Wiener med. Presse</i> , 1879, n° 40, pag. 13. | Homme. 40 ans. | Hernie droite irréductible. | 1879. | Ouverture du sac. Ablation de l'épiploon. Drainage. | On ne ferme ni le collet ni l'anneau. | Cicatrisation en 35 jours. | Récidive au bout de 6 mois. |
| 103. REVERDIN. In <i>B. et M. de la Soc. de Chir.</i> 1881, t. VII, p. 268. | Homme. 42 ans. | Épiplocèle volumineuse, irréductible et douloureuse. | 1 août 1880. | Dissection et incision du sac. Ligature et excision de l'épiploon. Réduction du pédicule. Extirpation du sac. Ligature du collet. | Suture des piliers dont le rapprochement est favorisé par 4 petites incisions ligaturées. | Cicatrisation complète le 4 septembre. Bandage appliqué le 25 septembre et bien supporté. | En novembre pas de récurrence. Plus de douleur. Port facile du bandage. |
| 104. V. LANGENBECK. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> p. 12, 13. | Homme. 30 ans. | Hernie épiploïque adhérente. | 1879. | Ligature après ablation de l'épiploon. Extirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Terminaison inconnue. |
| 105. L. MAYER. In <i>Centralblatt</i> , 1877, n° 35, p. 547. | Femme. 45 ans. | Hernie gauche de la grosseur des deux poings. | 12 juillet 1877. | Ablation du sac. Suture du collet. Résection d'une masse épiploïque de la grosseur du poing. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation au bout de 18 jours. | Guérie. Porte bandage. |
| 106. SCHNEDE. In <i>Centralblatt für Chirurgie</i> , 1877, n° 1. | Homme. 46 ans. | Hernie double, facilement réductible à droite. A gauche épiploon adhérent. Anneau admettant 3 doigts. | 18 avril 1877. A droite. 41 mai 1877. A gauche. | Ligature des collets. Extirpation des deux sacs. A gauche ablation de l'épiploon. A droite, pas de drainage. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation à droite au bout de 8 jours. A gauche au bout de 35 jours. Abscès scrotal. | A la sortie, le 20 juin, les orifices herniaires sont complètement oblitérés. |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 107. SCHNEDE. In <i>Tilanus</i> , pag. 43. | Homme. 64 ans. | Hernie irréductible. | janvier 1879. | Ligature du collet, ablation de l'épiploon. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation en 32 jours. | Guérison constatée au bout de 4 mois. |
| 108. SCHNEDE. In <i>Tilanus</i> , pag. 43. | Homme. 56 ans. | Hernie irréductible, épiploon adhérent. | mars 1878. | Ligature du collet et extirpation du sac. Résection de l'épiploon. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation au bout de 72 jours. | Pas de récurrence. |
| 109. SCHNEDE. In <i>Kärnell, Neue Verrhandlungsmethode, etc. V. Langenbeck's Archiv</i> , xxvii, pag. 106. | Homme. 40 ans. | Hernie épiploïque sphacelée. | | Extirpation du sac et des tissus voisins qui sont infléchés et putrides. | | | Cicatrisation, en partie par première intention. |
| 110. SOHN. In <i>Veber's Trésor. Etude du résultat définitif dans la cure radicale des hernies</i> . Lausanne, 1881. | Femme. 53 ans. | Hernie gauche irréductible et douloureuse. | 18 juillet 1879. | Le sac, très épais, ne renferme que de l'épiploon. L'épiploon est lié avec de la soie et réséqué. Ligature du collet au caduc. | Pas de suture des piliers. | Réunion par première intention. | Récidive commençant en février 1880. Bandage. 24 mois après l'opération, la hernie est grosse comme un œuf. L'anneau admet le pouce. |
| 111. STRUNGGARD. In <i>Nordiskt medicinskt Arkiv, Bd. X, Heft 1, und Centralblatt für Chirurgie</i> , 1878, pag. 489. | | Hernie inguinale. | 1878. | Hernie épiploïque. Suture du collet. Extirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Résultat définitif inconnu. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|-------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| 111 UMBE. In <i>Leisrinsk, loc. cit.</i> Ta- bleau A, obs. 118. | Homme. 49 ans. | Hernie épiploïque, irréductible. | 24 avril 1880. | Ligature du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Bon résultat. |
| 113 VOLKMANN. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> | Homme. 30 ans. | Grosse hernie irréduc- tible. | 1878. | Ablation de l'épiploon adhérent. | | | Mort le lende- main d'hémor- rhagie interne. |
| 114 TILANUS. <i>Loc. cit.</i> , p. 12, 13. | Homme. 56 ans. | Hernie lipomatense. Petit sac. | 1879. | Extirpation du lipo- me. Ligature du collet. Extirpation du sac. Drainage. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation en 10 jours. | Guérison con- statée au bout de 12 mois. |
| 115 W. BAUM. In <i>Leisrinsk, loc. cit.</i> Ta- bleau A, obs. 133. | Homme. 28 ans. | Hernie congénitale. Grandes difficultés dans la marche. Adhérences de l'épiploon et du tes- ticule. | 23 déc. 1879. | Ligature du collet. Excision d'une partie du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | Cicatrisation en 33 jours. | Bandage. Pe- tite récidive. |
| 116 H. FISCHER. In <i>Laurentowski, Bei- trage zur Radical Operation d. Hernien.</i> Breslau, 1879. | Homme. 46 ans. | Hernie scrotale con- génitale, droite, irréduc- tible, grosse comme une tête d'enfant. | Mai 1879. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers au catgut. | Suppuration. Forte réaction générale. Cicat- risation en 4 semaines. | Porte banda- ge. Pas de réci- dive au milieu de 1879. |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|---|
| 117 MAAS. In <i>Leisrinsk, loc. cit.</i> Ta- bleau A, obs. 110. | Garçon. 2 ans 1/2. | Hernie congénitale scrotale irréduc- tible. | 26 avril 1880. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des pi- liers. | Cicatrisation. | Résultat défi- nitif inconnu. |
| 118 SCHUBB. In <i>Tilanus, p. 13.</i> | Homme. 25 ans. | Hernie irréduc- tible congénitale. | Décemb. 1878. | Ligature du collet après ablation de l'épi- ploon. | Suture des pi- liers. | Cicatrisation au bout de 11 jours. | Guérison con- statée au bout de 4 mois. |
| 119 SOGIN. In <i>Steffen, Über Radical Operation d. Hernien Wien, 1879, und Gvé- nod. Étude du résul- tat définitif dans la cure radicale des her- nies.</i> Lausanne, 1884. | Homme. 43 ans. | Hernie congénitale gauche, grosse comme une tête d'adulte, incom- plètement réductible. Inflammation de la her- nie, le 3 février. Une ponction donne issue à 230 grammes de li- quide rougeâtre. Dans le sac est une masse tu- berculeuse. L'anneau ad- met quatre doigts. | 17 fév. 1879. | Pas d'épiploon : Le mésentère est épaissi, tuberculeux. Réduction après une demi-heure d'efforts. Extirpation du sac et du testicule dégé- néré. Suture du collet. | Suture des pi- liers par 3 points au catgut. | Cicatrisation, nécessaire. Guéri- son en 40 jours. | Récidive au milieu d'avril. |
| 120 SCHUBB. In <i>Tilanus, pag. 13.</i> | Homme. 25 ans. | Hernie congénitale irréductible. | Janvier 1879. | Ligature du collet. Résection de l'épiploon. | Suture des pi- liers. | Cicatrisation au bout de 39 jours. | Pas de réci- dive connue. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDE OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|---|-------------------------|--|----------------------|---|---|---|--|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 121. CZERNY. <i>Loc. cit. Und Braun, Berlin. Klin. Wochenschr., 1881, n° 4.</i> | Homme. 70 ans. | Hernie droite incoercible. Douleurs dans la cuisse. | 2 août 1877. | Ligature du collet à la soie. Ouverture du sac. Drainage. | Suture à la soie phéniquée. | Réunion par première intention. | Pointe de hernie en novembre 1877. Le malade meurt en 1879. La récidive ne s'est pas accrue. |
| * 122. CZERNY. In <i>Tilanus, Congrès international, sept. 1879. Und Braun, loc. cit.</i> | Homme. 44 ans. | Grosse hernie double. Incoercible. | 7 juin 1878. | Ligature du collet à la soie phéniquée. Sac incisé. Pas d'extirpation du sac. Drain. | Suture des piliers à la soie phéniquée. | Cicatrisation en 56 jours. Suppuration dans le scrotum. Élimination d'une substance du côté droit. | En novembre 1879, récidive scrotale à droite et petite récidive à gauche. Le malade porte bandage. |
| * 123. JULLIARD. <i>Obs. inédite.</i> | Homme. 47 ans. | Entéro-épiploclèle inguinale droite. La hernie est incoercible et a le volume des deux poings. | 13 décemb. 1880. | Ligature de l'épiploon. Excision de 300 grammes d'épiploon. Réduction du pédicule. Extirpation du sac. Suture du collet. Dans le sac extirpé ont été compris le canal défé- | Suture des piliers. | Le 25 décembre, gangrène et élimination du testicule et d'une partie du scrotum. Le malade sort 35 jours après l'opéra- | Malade non revu. |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | rent, les vaisseaux et nerfs spermatiques. | | tion, avec plaie bourgeonnante. | Mort au bout de 5 jours de pneumonie intercurrente. La plaie était cicatrisée. |
| * 124. KÜSTER. In <i>Tilanus, loc. cit.</i> | Homme. 76 ans. | Hernie incoercible. | Août 1878. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers. | | Mort au bout de 11 jours, la plaie étant cicatrisée. Perforation intestinale. |
| * 125. KÜSTER. In <i>Leisrunk, loc. cit. Tableau A, obs. 95.</i> | Homme. 59 ans. | Grosse hernie incoercible. | Février 1878. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers. | Réunion par 1 ^{re} intention. | Pas de récidive en septembre 1882. |
| * 126. KÜSTER. In <i>Leisrunk, loc. cit. Tableau A, obs. 96.</i> | Homme. 72 ans. | Grosse hernie double incoercible. | 14 février 1884. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers au catgut. | Cicatrisation en 8 jours. | |
| * 127. LEISRUNK. <i>Observation personnelle.</i> | Homme. 36 ans. | Hernie gauche incoercible. Anneau admettant deux doigts. | 8 février 1882. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers à la soie. | | |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET ÂGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de l'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RESULTAT DÉFINITIF. |
|---|-------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 128. MAAS. In <i>Breslauer Zeit. Zeitschrift</i> , 1879, n° 5 et 6. | Garçon. 2 ans 1/2. | Grosse hernie scrotale. Anneau admettant 2 doigts. Augmente sans cesse. Incoercible. | 8 mai 1878. | Ligature double après ablation du cordon. Ablation partielle du sac. | Suture des piliers au catgut. | Cicatrisation en 30 jours. | Récidive 6 semaines après la sortie. |
| * 129. MAAS. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 414. | Homme. 34 ans. | Hernie scrotale très grosse, double, incoercible. | 7 mai 1880. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers. | Cicatrisation. | Mort au bout de 2 jours de paralysie intestinale. |
| * 130. MAAS. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 414. | Homme. 51 ans. | Hernie scrotale incoercible. | 3 mars 1881. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers. | | Mort le 15 ^e jour d'embolie pulmonaire. |
| * 131. MAAS. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 413. | Garçon. 44 ans. | Hernie scrotale incoercible. | 8 septemb. 1880. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers. | Résultat définitif inconnu. | Résultat définitif inconnu. |
| 132. JULLIARD. Obs. inédite. | Homme. 31 ans. | Épiplocèle inguinale droite datant de 5 ans. Incoercibilité depuis 3 mois. Volume d'une pomme. | 25 octobre 1880. | Incision du sac. Résection de l'épiploon. Suture du sac. | Suture des piliers. | Tout pansement est cessé le 31 oct. Le malade sort 8 jours après l'opération. Un | Poit du bandage est continué. Malade non revu. |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | léger suintement persiste encore au niveau du point où passe le drainage. | |
| * 133. RESSL. In <i>Leisrnik, loc. cit.</i> Tableau A, obs. 42. | Homme. 28 ans. | Hernie droite incoercible, grosse comme un œuf de poule. | 24 avril 1880. | Réséction de l'épiploon. Ligature du collet et extirpation du sac. Incision du canal inguinal. | Suture du canal. | Cicatrisation. | Le 22 août 1882, guérison complète. Pas de bandage. |
| 134. UNGER. In <i>Franz. Wochenschrift</i> , 1878, n° 34. | Homme. 39 ans. | Hernie grosse incoercible. | 1879. | Extirpation du sac. | Suture des piliers. | Cicatrisation. | Guérison constatée au bout de 6 mois. |
| * 135. WEIL. In <i>Prager med. Wochenschrift</i> , 1878, n° 34. | Homme. 42 ans. | Hernie scrotale droite, grosse comme la tête d'un enfant. Anneau large. Hernie incoercible. | 5 septemb. 1878. | Ligature à la soie. Partie supérieure du sac suturée. | Suture des piliers à la soie. | Cicatrisation en un mois. Nécessairement partielle. | A la sortie, le sac est transformé en un cordon solide. L'anneau est complètement fermé. |
| * 136. WEINLECHNER. <i>Wien. med. Blätter</i> , 1879, nos 11, 12, 13. | Homme. 43 ans. | Hernie droite facilement réductible, mais incoercible. | 30 août 1878. | Suture et ligature du collet. Extirpation du sac. | Suture des piliers au catgut. Suture en lacet. | Cicatrisation. Forte suppuration. | Au bout de 6 mois, guérison constatée. Pas de bandage. |

| NOM DE L'OPÉRATEUR ET INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE. | SEXE ET AGE DE L'OPÉRÉ. | DIAGNOSTIC. | DATE de L'OPÉRATION. | PROCÉDÉ OPÉRATOIRE. | | ÉPOQUE de la CICATRISATION. | RÉSULTAT DÉFINITIF. |
|--|-------------------------|--|----------------------|---|----------------------------|--|---|
| | | | | SAC. | ANNEAU. | | |
| * 137. BURCKHARDT, In <i>Jahresbericht über die chirurg. Abtheilung des Ludwigspitals, etc. Vide Ausdauer</i> , page 32. | Homme. 33 ans. | Hernie grosse comme un œuf d'oie. Incoercible. L'anneau admet trois doigts. | 1878. | La partie inférieure de la hernie rentre dans les nodosités épiploïques. L'intestin se trouve à la partie supérieure. Ablation de l'épiploon; le collet est suturé, le sac extirpé. | Pas de suture de l'anneau. | Cicatrisation par seconde intention. | 3 mois après, récidive déjà apparente. |
| * 138. DOUTRELOUPONT. <i>Sitzungs-Berichte d. Niederrhein. Gesellschaft</i> . 21 janvier 1878. | Homme. 22 ans. | Hernie droite incoercible. Anneau admettant deux doigts. | 14 décemb. 1877. | Ligature du collet. Le sac est extirpé, autant du moins que le permettent les adhérences. | Pas de suture de l'anneau. | Cicatrisation au bout de 24 jours. | A la sortie, du côté opéré, impulsion moindre que du côté sain. |
| 139. JULLIARD. Obs. inédite. | Homme. 48 ans. | Hernie inguinale droite datant de 25 ans et grosse comme le poing. La contention par le bandage est insuffisante et douloureuse. | 21 février 1884. | Ligature du collet avec un fort catgut. Extirpation du sac. Suture du collet lié au pilier interne. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation après suppuration, le 25 mars. | Au bout de 6 mois, pas de récidive, mais le malade n'a pas cessé de porter bandage. |
| * 140. KOTTMANN. In <i>Correspondenzblatt für Schweizer-Ärzte</i> , 1878, n° 23. <i>Vide Ausdauer</i> , page 26. | Homme. 52 ans. | Hernie descendant jusqu'au genou. Incoercible. | 1878. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | | Pas de 1 ^{re} intention. Typhus. Gangrène de la peau. | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---------------------|--|----------------------------|---|---|
| 141. KÖSTER. In <i>Tilanus, Congrès international</i> , septembre 1879. <i>Vide Braun</i> . | Homme. 55 ans. | Hernie incoercible. | Novembre 1877. | Ligature du collet. Extirpation de sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive connue. |
| * 142. V. NUSSBAUM. In <i>Lehrbuch</i> , loc. cit., Tablenn A, obs. 9. | Homme. 57 ans. | Hernie droite difficilement contenue. | 14 décemb. 1880. | Suture du collet et extirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Pas de récidive en juin 1881. |
| 143. SOGIN. In <i>Steffen, Ueber Radical Operation d. Hernien</i> . <i>Wiener</i> , 1879. <i>Vide Guérin, Étude sur le résultat définitif dans la cure radicale des hernies</i> . Lausanne, 1884. | Garçon. 5 ans. | Hernie gauche incoercible. Accroissement rapide. | 12 décemb. 1877. | Ligature au catgut. Extirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation. | Guérison constatée au bout de 17 mois 1/2. Canal inguinal oblitéré. Même état au bout de 43 mois 1/2, mais anneau dilaté. |
| 144. THIANUS, loc. cit., p. 12, 13. | Garçon. 42 ans. | Hernie difficilement coercible. | 1878. | Ligature du collet. Extirpation du sac. | Pas de suture des piliers. | Cicatrisation en 17 jours. | Récidive au bout de 12 mois. |
| 145. DOUTRELOUPONT. In <i>Berlin. Klin. Wochenschr.</i> No 14, p. 499, 8 avril 1878. | Homme. 22 ans. | Hernie inguinale droite du volume d'un œuf d'oie, réductible, mais mal contenue. Deux doigts pénètrent aisément dans l'anneau. | ? | Ligature du collet au sac. Incision du reste du sac. Excision des bords du sac. Suture des restes du sac à la peau. Suture des lèvres de la plaie cutanée. | Pas de suture des piliers. | Gangrène de la partie du sac suturée aux téguments. Le malade se lève le 24 ^e jour et porte bandage. | ? |