

DEUXIÈME APPENDICE.

FORMULAIRE DE PRESCRIPTIONS. BAINS ET STATIONS THERMALES.

1. Antifébriles.

1. Sulf. Quinin. 1,0 — 2,0  
Acid. sulf. dil. q. s. pour dissoudre.  
Eau de menthe poiv. 15,0.  
M. A prendre en une fois.  
(Comme antifébrile. Dans la fièvre intermittente, la névralgie du trijumeau, etc.).
2. Sulf. Quinin. 0,5 — 1,0  
Donnez poudres semblables N° 6 en cachets.  
Tr.: A prendre de 1 à 2 cachets.
3. Sulf. Quinin. 1,5  
Poudre de feuilles de digitale 0,5  
Suc de réglisse q. s. pour 30 pil.  
Tr.: 1 à 2 pil. trois fois par jour.
4. Salicyl. de soude 5,0  
D. poudres pareilles N° 4.  
1 à 2 par jour dans du vin ou des pains azymes.
5. Salicyl. de soude 8,0 — 10,0  
Eau de menthe 30,0.  
Tr.: A prendre en deux ou trois fois dans les 24 heures.  
(Dans le rhumat. artic. aigu.)
6. Acid. salicyl. crist. en poudre 0,5  
D. 20 pareilles en cachets.  
Tr.: un cachet par heure.  
(Dans le rhum. art. aigu.)
7. Salol 1,0 — 2,0.  
D. poudres pareilles N° 10.  
Tr.: 3 à 4 poudres par jour dans des pains azymes.
8. Antipyrine 1,0 — 2,0  
Donnez 10 poudres semblables.  
Tr.: 1 à 2 poudres dans des pains azymes, dans de l'eau ou du vin.
9. Antifébrine 0,25 — 0,5  
D. poudres N° 10.  
1 à 2 poudres en cachets ou dans du vin.

10. Thalline 0,25 — 0,5  
D. poudres semblables N° 10.  
2 à 3 poudres en 24 heures.  
(ou des doses moindres de 0,05 à 0,1 d'heure en heure).

11. Phénacétine 0,5 à 1,0.  
Donnez 6 poudres semblables.  
A prendre dans du vin ou dans des pains azymes.

2. Acides.

12. Acid. Phosphorique 2,0  
Eau dist. 120,0  
Sir. de framb. 20,0.  
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
13. Acid. chlorhyd. dilué 2,0  
Eau distill. 120,0  
Sir. simpl. 15,0.  
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill.
14. Acid. sulf. dil. 2,0  
Eau dist. 120,0  
Sir. de framb. 20,0.  
Tr.: Toutes les 2 h. une grande cuill.
15. Carbonat. de pot. 4,0  
Jus de citr. récemment exprimé q. s. pour saturer.  
Eau comm. 100,0  
Sir. simpl. 20.  
Tr.: Une cuill. à soupe d'heure en heure ou de 2 en 2 heures (Pot. de Rivière.)

3. Expectorants.

16. Rac. d'ipéc. 0,3 — 0,5  
A infuser dans de l'eau bouillante 120,0  
Ajoutez sir. de guimauve 10,0  
(au besoin chlorhydrate de morph. 0,03 — 0,05.)  
Tr.: Toutes les 2 h. une grande cuill.
17. Infus. de rac. d'ipéc. 0,3—0,5: 120,0  
Eau d'amandes amères 3,0  
(ou extr. d'opium 0,2)  
Suc de réglisse 10,0  
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill.

18. Infus. de racine de sénéga 10,0 : 150,0  
Chlorhydr. d'ammoniaque 3,0  
Jus de réglisse 10,0  
Tr.: Toutes les h. une cuill. ou de 2 en 2 h.
19. Infus. de rac. de sénéga 10,0:150,0  
Liq. ammon. anisée 4,0  
Sir. simple 20,0  
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
20. Décoct. d'écorce de quillaja 5,0 : 200,0  
Sirop simpl. 10,0  
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill. à soupe. (préférable à la racine de sénéga).
21. Décoct. d'herbes de polygal. 15,0 : 150,0  
Liq. amm. anis. 5,0  
(ou liq. amm. succinée 3,0)  
Sir. de guimauve 20,0  
Tr.: Toutes les h. une cuill. ou de 2 en 2 heures.
22. Poud. de rac. d'ipéc. 0,03  
Opium 0,01  
Sucre blanc 0,3  
M. pour une poudre, donnez 20 par.  
Tr.: Toutes les 2 h. une poudre, ou d'heure en heure.
23. Liq. amm. anis.  
Teint. de stramon.  
Teint d'opium simpl. an. 5,0  
M. Tr.: Trois fois par jour 15 à 20 gouttes dans de l'eau.  
(Dans la bronchite chronique.)
24. Liq. amm. anis. 5,0  
Eau d'amand. amèr. 10,0  
M. Tr.: 20 gouttes 3 fois par jour dans de l'eau.
25. Chlorhyd. d'ammoniaque.  
Jus. de réglisse dépur. ana 3,0 à 5,0  
Eau de fenouil 180,0.  
M. Tr.: Toutes les 2 heures une cuill. à soupe.  
(Mixture fluidifiante.)
26. Chlorhyd. d'ammon. 5,0  
Tartre stibié 0,05  
Eau de fenouil 150,0  
Jus de réglisse 10,0  
M. Tr.: Toutes les 2 h. une cuill.

27. Soufre doré d'antimoine 0,03  
Chlorhyd. d'ammon.  
Sucre blanc ana 0,3.  
M. pour une poudre, donnez-en 15  
Tr.: Toutes les 2 ou 3 h. une poudre.
28. Souf. doré d'antim. 0,05  
Opium 0,02 — 0,03  
Sucre blanc 0,5  
M. pour une poudre. Donnez-en 10.  
Tr.: trois poudres par jour.
29. Chlorhyd. d'apomorphine 0,03—0,05  
Acid. chlor. dilué 0,5  
Chlorhyd. de morphine 0,03  
Eau de fenouil 150,0  
M. dans un verre obscur.  
Tr.: de 2 en 2 ou de 3 en 3 h. une cuill. à soupe.
30. Chlorh. d'apomorph. 0,05  
Jus et poudre de réglisse q. s. pour 50 pilules.  
M. d'heure en heure ou de 2 en 2 h. 1 à 3 pilules.
31. Acid. benzoïque 0,1 — 0,3  
Sucre blanc 0,5.  
M. pour une poudre, donnez-en 10 dans du papier gommé.  
Tr.: toutes les h. une poudre ou de 2 en 2 h.
32. Baume de Pérou 5,0  
Gomme arab. 2,5  
Eau dist. 150,0  
pour une émulsion. Ajoutez-y Sir. de cannelle 20,0.  
M. toutes les h. ou de 2 en 2 h. une cuill. à soupe après avoir agité.  
(Le baume de Pérou, de copahu, la térébenthine, etc. le myrtol (dans la bronchite fétide) se prescrit à l'intérieur contre la bronchoblennorrhée, le mieux sous forme de capsules gélatineuses.)

Expectorants pour la médecine des enfants.

33. Infus. de rac. d'ipéc. 0,1—0,3: 100,0  
Eau d'amandes amères 1,5  
Sir. de guim. 15,0  
M. toutes les 2 h. une cuill. d'enfant.
34. Infus. de rac. de sénéga 10,0: 100,0  
Liq. ammon. anis. 1,0  
M. toutes les 2 h. ou d'heure en heure une cuill. d'enfant.

35. Tartre émétique 0,03  
Eau dist. 100,0  
Sir. de guim. 20,0.  
M. toutes les 2 h. une cuill. d'enfant.
36. Chlorhyd. d'apomorphine 0,01  
Eau dist. 15,0  
Sir. de guim. 20,0  
M. 15 à 20 gouttes toutes les h.
37. Acid. benzoïque  
Camphre trituré ana 0,03 — 0,05  
Sucre de lait 0,3  
M. pour une poudre. Donnez-en 10 dans du papier gommé.  
*Tr.* : toutes les 2 h. une poudre (contre la bronchite capillaire.)

## 4. Inhalations.

38. Les remèdes pouvant le mieux servir en inhalations s'emploient dans les proportions suivantes :

Chlorure de sodium 2,0—10,0 : 500,0  
Bicarbonate de soude 2,0—10,0 : 500,0  
Chlorhydrate d'ammoniaque 2,0—5,0 : 500,0.

(En outre les eaux minérales d'Ems, de Salzbrunn, etc., sont fréquemment usitées en inhalations.)

Alun 2,0—5,0 : 500,0  
Acide tannique 2,5—10,0 : 500,0.

Acide phénique 0,5—1,5 : 500,0  
Eau créosotée 5,0—15,0 : 500,0  
Eau de goudron 20,0—100,0 : 500,0  
Eau de chaux mêlée à égale ou à double quantité d'eau.  
Borax 2,0—5,0 : 500,0  
Chlorate de potasse 2,0—5,0 : 500,0

(La térébenthine et le baume de Pérou, ce dernier étendu de 2 parties d'alcool, se versent par cuillerées à thé sur de l'eau bouillante et on fait inhaler les vapeurs qui se dégagent. La pipe dite de térébenthine est un engin très approprié, qui sert également à inhaler d'autres substances résineuses V. tome I. Les inhalations carboliques se font le plus convenablement à l'aide du masque de Curschmann. V. t. I. Les *inhalations d'iodoforme* se pratiquent de préférence avec l'appareil de Küssner.)

Eau d'amandes amères 5,0—10,0 : 500,0  
Teint. d'opium simple 1,0—3,0 : 500,0  
Extr. d'opium 0,3—0,5 : 500,0  
Bromure de potassium 3,0—10,0 : 500,0.

## 5. Autres formules et dosages pour le traitement des maladies des organes respiratoires (1).

39. Acid. carbol.  
Alcool ana 10,0  
Liq. ammon. caustique 5,0.  
M. pour renifler.  
(remède errhin.)
40. Les solutions les plus usitées pour *douches nasales* sont :  
Eau, thé de camomille, de sauge.  
Chlorate de potasse 15,0—50,0 : 1000,0  
Carbonate de soude, alun et tannin 10,0—20,0 : 1000,0  
Acide borique, salicylique et carbolique 5,0—10,0 : 1000,0  
Hypermanganate de potasse 1,0—5,0 : 1000,0.
41. Pour *badigeonner la muqueuse du pharynx, du nez et du larynx*, on emploie principalement :  
Nitrate d'argent 1,0 : 15,0—50,0 d'eau distillée.  
Alun et acide tannique 5,0 : 25,0 d'eau distillée.  
Teinture d'iode pure ou étendue d'alcool.  
Borax 5,0 avec glycerine 25,0.  
Alcool pur.  
Glycerine iodée :  
Iode pur 0,5  
Iodure de potassium 2,5  
Glycerine 25,0.  
M. usage externe.
42. Iodure de potassium 5,0—10,0  
Eau distillée. 200,0.  
M. 3 à 4 cuill. à soupe par jour dans de l'eau.  
(Dans la bronchite croupale et nommément dans l'asthme bronchique, où la dose peut être encore plus considérable.)
43. Extr. de belladone 0,01—0,02  
Sucre blanc 0,3.  
M. donnez 15 poudres pareilles.  
*Tr.* : 3 poudres par jour,  
(Dans la coqueluche.)
44. Bromure de potass. 2,0—5,0  
Eau dist. 100,0  
Sirop simple 20,0  
M. toutes les 3 h. une cuill. d'enfant.  
(Coqueluche.)
45. Chloroforme 30,0  
Éther 60,0  
Huile de térébenthine rectifiée 10,0  
M. une à deux cuil. à thé sur un mouchoir pour inhaler.  
(Dans la coqueluche.)
46. Acid. arsenieux 0,3—0,5  
Poivre noir 3,0  
Jus et poudre de réglisse q. s. pour 100 pil.  
*Tr.* : 2 à 3 pil par jour.  
(Tuberculose chronique.)
47. Créosote  
Cire blanche  
Poudre de racine de guimauve ana 2,0  
Muc. de gomm. arab. q. s. pour 100 pil. enrobées de gélatine.  
*Tr.* : 2 à 3 pil par jour.  
(Tuberc. pulm. chron.)  
(Créosote en capsule avec du baume de Tolu et de l'huile de foie de morue v. T. I.)

1. Remèdes narcotiques et cocaïne, v. plus loin.

48. Acét. de plomb 0,1  
Sucre blanc 0,4  
M. pour une poudre, donnez-en 10.  
*Tr.* : toutes les  $\frac{1}{2}$  heures ou toutes les heures une poudre.  
(Dans l'œdème pulmon.)

### 6. Prescriptions pour le traitement des maladies du pharynx (1).

49. Chlorate de potasse 1,00  
Eau dist. 300,0.  
M. en gargarisme, pur ou à moitié mélangé d'eau.

50. Alun 3,0—10  
Eau dist. 300,0.  
M. en gargarisme.

51. Inf. de fleurs de mauve (ou de feuilles de sauge) 15,0 : 200,0  
(au besoin borax 10,0.)  
M. gargarisme.

52. Chlorate de potasse 3,0—5,0  
Eau dist. 150,0  
(chez les enfants avec du sirop simpl. 10,0.)  
M. *Tr.* : avaler lentement  $\frac{1}{2}$  cuill. à thé de  $\frac{1}{4}$  d'heure en  $\frac{1}{4}$  d'heure ou de  $\frac{1}{2}$  en  $\frac{1}{2}$  h.  
(Dans l'angine simple, gangréneuse et diphthéritique.)

53. Papayotine 0,5  
Eau dist. 10,0  
M. pour badigeonner, plusieurs fois par jour.  
(Dans l'angine croupale pour dissoudre les membranes. Remède coûteux !)

54. Sublimé corrosif 0,02—0,05  
eau dist. 50,0.  
M. en badigeonnage, 4 à 6 fois par jour.  
(Dans la diphthérie à son début.)

### 7. Remèdes pour régler la circulation cardiaque.

55. Poudre de feuilles de digit. 1,0—2,0 faites infuser dans eau bouillante 150,0.  
M. toutes les h. ou de 2 en 2 h. une cuill. à soupe.

56. Feuilles de digit. en poudre 0,1—0,2.  
Donnez 20 poudres en cachets.  
*Tr.* : toutes les heures ou de 2 en 2 h. un cachet.

57. Infus. de feuilles de digit. 1,5 : 120,0  
Liqueur d'acétate de potasse 30,0  
Oxymel scillitique 15,0.  
M. toutes les heures une grande cuill.

58. Inf. de feuilles de digitale 1,5 : 120,0  
Crème de tartre soluble 4,0  
M. toutes les 2 h. une cuill. à soupe.

59. Salicylate de caféine sodique 0,3 !  
Donnez 12 poudres en cachets.  
*Tr.* : tous les jours de 4 à 6 poudres.  
On prétend que le salicylate de soude et de caféine qui est aussi très soluble dans l'eau, est, à la dose de 1 à 2 grm, digne d'être recommandé dans les maladies du cœur, comme succédané de la digitale.)

60. Infus. d'adonis vernal 3,0—5,0 : 150,0  
Sirop simple 10,0.  
M. toutes les 2 h. ou d'heure en heure une cuill. à soupe.  
(Succédané de la digitale récemment préconisé, surtout quand celle-ci n'est pas tolérée.)

61. Extrait de muguet (convallaria majalis) 2,0  
Alcool dilué 10,0.  
M. 4 fois par jour de 20 à 25 gouttes.  
(Prétend remplacer la digitale, réclame beaucoup de prudence !)

62. Sulfate de spartéine 0,001—0,002  
Sucre blanc 0,3.  
M. pour faire une poudre, donnez-en 10 semblables.  
*Tr.* : 1 à 3 par jour. (Remède également recommandé comme succédané de la digitale.)

63. Teinture de semences de strophanthus 10,0.  
*Tr.* : 3 fois par jour de 6 à 10 gouttes.  
(Préconisé contre la dyspnée et la faiblesse du cœur chez les cardiaques.)

### 8. Excitants (Analeptiques).

64. Camphre 2,5  
Huile d'amandes 10,0.  
M. pour injection sous-cutanée. Une seringue de Pravaz en entier en une fois.

65. Camphre trituré 0,1—0,15  
Sucre de lait 0,4.  
M. pour une poudre, donnez-en 10 dans du papier gommé.  
*Tr.* : une poudre d'h. en h. ou de  $\frac{1}{2}$  en  $\frac{1}{2}$  h.

66. Éther sulfurique 20,0.  
Pour injection sous-cutanée. Une seringue pleine en une fois.  
(De même l'éther acétique et l'esprit de nitre doux.)

67. Éther sulf. ou acétique 10,0  
*Tr.* : 10 à 20 gouttes sur du sucre.  
(De même l'esprit de nitre doux.)

68. Liq. ammon. anisat. 10,0  
Éther alcoolisé  
Teinture arom. ana 5,0.  
M. 20 gouttes sur du sucre ou dans de l'eau.

69. Musc. 0,1—0,2  
Sucre de lait 0,4.  
M. pour une poudre. Donnez-en 5 dans du papier gommé.  
*Tr.* : Une poudre de 2 en 2 ou 3 en 3 heures (0,1 de musc coûte 1 fr !)

70. Teinture de musc  
Sirop simple, ana 5,0.  
M. 30 à 40 gouttes plusieurs fois par jour.

71. Alcool dilué  
Teinture aromatique ana 3,0  
Eau distill. 120,0  
Sirop simple 15,0.  
M. toutes les 2 h. une cuill. à soupe.  
(Au lieu de vin dans la pratique des indigents.)

### 9. Stomachiques (digestifs) et amers.

72. Acide chlorhydrique dilué 10,0.  
*Tr.* : 10 à 20 gouttes dans de l'eau  $\frac{1}{3}$  heure après le repas.

73. Pepsine allemande solub. 0,5.  
Donnez 10 poudres semblables.  
*Tr.* : une poudre dans de l'eau après les repas.

74. Pepsine 0,5  
Chlorhydrate de morphine 0,01—0,02.  
M. pour une poudre. Donnez 10 semblables.  
*Tr.* : une poudre après le repas.  
(Dans les cardialgies.)

75. Pepsine 5,0  
Acide chlorhydrique 0,5  
Extr. de gentiane q. s. pour faire 50 pilules.  
Enveloppez de collodion.  
*Tr.* : 3 à 4 pilules par jour.

76. Pepsine 5,0  
Sir. d'écorces d'oranges 100,0.  
M. c'est le sirop de pepsine, à prendre par cuill. à thé.

77. Teinture amère 10,0  
Teinture aromatique 5,0.  
M. 15 à 20 gouttes.

78. Teinture de gentiane 10,0  
Teinture aromatique  
Sirop d'écorces d'oranges ana 5,0.  
M. 20 à 30 gouttes.

79. Teinture de rhubarbe vineuse  
Élixir d'orange composé ana 15,0.  
M. 20 à 25 gouttes.

80. Teinture de strychnine (ou de noix vomique)  
Eau de laurier cerise ana 5,0  
M. 10 à 15 gouttes 2 à 3 fois par jour.

81. Sous-nitrate de bismuth 0,3  
Sucre blanc 0,2.  
M. pour une poudre. Donnez-en 15.  
*Tr.* : 3 à 4 poudres par jour.  
(Ulcère de l'estomac, catarrhe chronique de l'estomac.)

82. Sous-nitrate de bismuth 0,3  
Chlorhydrate de morphine 0,01.  
Sucre blanc 0,2.  
M. pour faire une poudre. Donnez-en dix pareilles.  
*Tr.* : 2 à 3 poudres par jour.  
(Cardialgies.)

83. Sous nitrate de bismuth 2,0-5,0  
Bicarbonate de soude 30,0  
Élaeosaccharure de menthe 5,0.  
M. pour une poudre à délivrer dans une boîte.  
*Tr.* : 3 fois par jour une prise sur la pointe du couteau.

1. Solution pour le badigeonnage, v. aussi le n. 41.

84. Carbonate de magnésie 20,0  
Élaosacchar. de menthe 10.  
M. faites une poudre.  
*Tr.* : 2 à 3 fois par jour une prise sur la pointe du couteau.  
(Contre les aigreurs.)
85. Bicarbonate de soude 30,0  
Élaosacchar de menthe 10,0,  
M. pour une poudre. — une prise sur la pointe du couteau.
86. Bicarbon. de soude 5,0  
Eau distillée 150,0  
Teinture aromatique 5,0.  
M. *Tr.* : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
87. Décoction de condurango 15,0:150,0  
Sirop d'écorces d'oranges 15,0.  
M. une cuill. à soupe toutes les 2 ou 3 heures.  
(Stomachique, surtout dans le cancer de l'estomac.)
- 10. Émétiques (Vomitifs).**
88. Rac. d'ipéc. pulveris. 1,0  
Tartre stibié, 0,05.  
M. faites une poudre. Donnez 4 pareilles.  
*Tr.* : Tous les quarts d'heure une poudre jusqu'à effet.
89. Poudre de racine d'ipéca. 1,0—2,0  
Tartre stibié 0,03—0,05.  
Eau dist. 30,0  
Oxymel. scillit. 15,0.  
M. Toutes les 10 minutes une cuiller d'enfant jusqu'à effet.  
(Vomitif pour enfant.)
90. Hydrochlorate d'apomorphine 0,04  
Eau dist. 2,0.  
M.  $\frac{1}{2}$  à 1 seringue à injecter sous la peau.
91. Sulfat. de cuivre 1,0  
Eau dist. 50,0.  
M. à prendre par cuill. à thé jusqu'à effet.
92. Sulfate de zinc pulver. 0,3—0,5.  
Donnez 3 poudres semblables.  
*Tr.* : Toutes les 5 minutes une poudre jusqu'à effet.

**11. Laxatifs (Dérivatifs).**

93. Huile de ricin 60,0.  
*Tr.* : Une cuill. à soupe toutes les 2 heures.

94. Calomel 0,3—0,5.  
Donnez 5 poudres semblables en cachets.  
*Tr.* : Toutes les 3 h. une poudre.
95. Sulfate de soude 50,0  
Bicarbon. de soude 6,0  
Chlorure de sodium, 3,0.  
M. faites une poudre.  
*Tr.* : Le matin 1 à 2 cuill. à thé dans une tasse d'eau chaude.  
(Sels de Karlsbad artificiels.)
96. Sulfate de magnésie 50,0  
Bicarbon. de soude 10,0.  
M. pour une poudre, 1 cuill. à thé dans une tasse d'eau.
97. Racine de rhubarbe 5,0—15,0  
faites bouillir dans de l'eau chaude 150,0  
Sir. d'écorces d'oranges 10,0.  
M. *Tr.* : Toutes les h. une cuill. à soupe.
98. Feuilles de senné coupées 15,0  
Semences d'anis 5,0  
faites infuser dans eau chaude 150,0  
Ajoutez sulfate de soude 20,0.  
M. *Tr.* : Une cuill. à soupe d'heure en heure.
99. Écorce de nerprun (Rhamnus frangula) 25,0  
Faites bouillir dans de l'eau jusqu'à réduction à 120,0  
Sir. de manne 25,0.  
M. Toutes les h. une cuill. à soupe.
100. Racine de rhub. pulver. 5,0  
Sulfate de magnés. ou du soude 15,0  
Rhizome de gingembre 2,0.  
M. Pour une poudre.  
*Tr.* :  $\frac{1}{2}$  à 1 cuill. à thé.
101. Racine de rhubarbe  
Soufre précipité  
Bitartrate de potasse  
Semences d'anis ana 5,0  
Sucre blanc 20,0.  
M. Faites une poudre. Une prise sur la pointe du couteau.  
(Contre les hémorroïdes.)
102. Racine de rhubarbe  
Extr. de rhubarbe comp. ana. 1,5  
Extr. de belladone 0,1.  
M. Faites 30 pilules  
*Tr.* : 2 à 4 par jour.

103. Extr. d'aloès  
Savon de jalap, ana 1,5.  
M. pour faire 30 pilules.  
*Tr.* : 2 à 4 par jour.
104. Extr. d'aloès  
Poudre de racine de rhubarbe ana 1,0  
Extr. de coloquinte  
Gomme gutte ana 0,5.  
M. pour faire 30 pilules.  
*Tr.* : 2 à 3 pilules par jour.
105. Extr. d'aloès, 5,0  
Extr. de rhub. comp. 3,0  
Fer pulver. 3,0.  
M. pour 100 pilules.  
*Tr.* : 1 à 2 pilules à la fois.  
(Constipation habituelle chez les anémiques.)
106. Extr. d'aloès 3,0  
Extr. de belladone 0,5  
Savon médic. q. s.  
pour faire 30 pilules.  
*Tr.* : 1 à 2 pilules.
107. Podophylline 0,03—0,3  
Sucre blanc 0,3.  
M. pour une poudre. Donnez 10 pareilles.  
*Tr.* : Selon les besoins 1 à 2 poudres par jour.
108. Décoct. de pulpe de tamarin fraîche 50,0 : 250,0  
Sulfate de magnésie 25,0.  
M. *Tr.* : à prendre de bon matin  $\frac{1}{2}$  à 1 verre à vin.
109. Extr. fluide de Cascara sagrada 20,0.  
*Tr.* : 1 à 2 fois par jour  $\frac{1}{2}$  à 1 cuill. à thé.
110. Huile de ricin 30,0  
Gomme arab. 1,0  
faites une émulsion avec eau distil. 75,0  
Sir. d'amandes 15,0.  
M. d'heure en heure une cuill. d'enfant.  
(Bon purgatif pour les enfants.)
111. Glycerine 3,0—5,0.  
En clystère à l'aide d'une petite seringue  
(parfois avec un excellent effet.)

**12. Astringents et Antidiarrhéiques.**

112. Acide tannique 0,05—0,1  
Opium 0,02  
Sucre 0,5.  
M. faites une poudre, donnez-en 10.  
*Tr.* : Toutes les 2 à 3 h. une poudre.
113. Acide tannique  
Teinture d'opium simple ana 1,0  
—2,0  
Eau distillée 150,0  
Sir. simple 15,0.  
M. Une cuill. à soupe d'heure en heure ou de 2 en 2 h.
114. Nitrate d'argent 0,1—0,2  
Opium pulv. 0,2  
Racine et extr. de gentiane q. s.  
pour faire 50 pilules.  
*Tr.* : 4 à 6 pilules par jour.  
(Diarrhée chronique.)
115. Nitrate d'argent 0,1  
Eau dist. 50,0  
Glycerine 10,0.  
M. dans un verre obscur.  
*Tr.* : Toutes les deux h. une cuill. à thé.  
(Diarrhée infantile.)
116. Sous-nitrate de bismuth 0,5—1,0  
Opium 0,02  
Sucre blanc 0,3.  
M. faites une poudre, donnez-en 12.  
*Tr.* : 2 à 3 poudres par jour.  
(Ulcères chroniques de l'intestin.)
117. Sous-nitrate de bismuth 5,0  
Mucilag. de gomme arab.  
Sir. simple ana 15,0  
Eau dist. 120,0.  
M. Agitez, une cuill. à soupe par heure ou de 2 en 2 h.  
(Dysenterie.)
118. Acét. de plomb 0,03—0,05  
Opium 0,01—0,02  
Sucre blanc 0,5.  
M. faites une poudre. Donnez-en 12.  
*Tr.* : Toutes les 2 h. une poudre, ou toutes les 3 h.
119. Décoct. de bois de campêche 5,0  
—10,0 : 150,0  
Sir. simple 30,0.  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.

120. Infus de racine de colombo  
15,0 : 150,0  
Élixir d'écorces d'oranges 5,0  
Sir. simple 25,0  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
121. Décoct. de racine de ratanhia  
5,0—10,0 : 120,0  
Teint. aromatique 5,0  
Sirop simpl. 15,0.  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
122. Mucilag. gg. arab.  
Sirop simpl. ana 20,0  
Eau distill. 120,0  
Teinture d'opium simpl. 1,0—2,0.  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
123. Huile d'amandes 10,0  
Gomme arab. 5,0  
Eau distill. 120,0  
Faites une émulsion, ajoutez  
Sirop simple 20,0  
(au besoin Teinture d'opium simple, 2,0).  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
124. Naphthaline pure, 0,2 à 0,5  
Donnez poudres pareilles N° 10.  
Tr. : 3 à 4 poudres par jour (en cachets).
125. Décoct. de salep. 1,0 : 200,0  
Teinture d'opium safranée gtt. 3 à 5.  
M. une cuill. d'enfant toutes les h. ou toutes les 2 h. (diarrhée infantile).
126. Calomel 0,01  
Opium pur 0,003—0,005  
Sucre de lait 0,3.  
M. faites une poudre. Donnez-en 12.  
Tr. : une poudre de 2 en 3 ou de 3 en 3 heures,  
(Diarrhée infantile).
127. Créosote gtt. 2 à 4  
Eau dist. 35,0  
Sirop de guimauve 15,0.  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à thé.  
(Diarrhée infantile.)
128. Salicylate de bismuth 0,1—0,2  
Poudre de gomme, 0,5.  
M. faites une poudre. Donnez-en 12.  
Tr. : toutes les 2 h. une poudre.  
(Catarrhe intestinal des enfants.)
129. Décoct. de racine de colombo,  
5,0 : 100,0  
Teint. d'opium simple gtt. 4  
Sirop de guimauve 20,0.  
M. Toutes les 2 h. une cuill. d'enf.  
(Catarrhe intestinal des enfants.)
- 13. Anthelminthiques (Vermicides).**
130. Trochisques de santoline (jusqu'à 0,05) n° 10.  
M. matin et soir 2 tablettes.  
(Contre les ascarides et les oxyures.)
131. Fleurs de semen-contra (cina) 5,0  
Bulb. de jalap 1,0  
Sir. simpl. 25.  
M. faites un électuaire.  
Tr. : à prendre en 3 fois  
(ascarides).
132. Fleurs de koussou 5,0  
d. 3 doses semblables.  
Tr. : toutes les h. une poudre dans un verre de vin blanc.
133. Écorce de grenadier 50,0—100,0  
Eau comm. 1000,0  
Faites macérer pendant 24 heures et bouillir jusqu'à réduction à 150,0, ajoutez  
Extr. éthéré de fougère mâle 5,0.  
Tr. : Tous les quarts d'heure une cuill. à soupe.  
(ou en une fois à l'aide de la sonde œsophagienne !)
134. Décoction d'écorce de grenadier  
30,0 : 180,0  
Extr. éthér. de fougère mâle 2,5  
Sirop d'écorces d'oranges 20,0.  
M. En trois portions de demi-heure en demi-heure (ténia des enf.).
135. Extr. de fougère  
Poudre de racine de fougère ana 2,0.  
M. pour faire 20 pilules.  
Tr. : Matin et soir 10 pilules.
136. Extr. de fougère 8,0  
Mucil. de gomme arab. 30,0  
Sirop simple 20,0.  
M. Tr. : à prendre en deux portions dans l'espace d'une demi-heure.
137. Tannate de Pelletierine 0,3—0,5.  
A prendre dans de l'eau.  
Après une demi-heure un purgatif.  
(Très recommandable.)

- 14. Diurétiques.**  
(Hydragogues.)
138. Liqueur d'acét. de potasse  
Sirop simple ana 25,0  
Eau de fenouil 100,0.  
Tr. : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
139. Vinaigre scillit. 30,0  
Carbon. de potasse q. s. pour saturer complètement  
Eau de persil 120,0  
Sirop simple 20,0.  
M. Tr. : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
140. Acétate de soude 10,0  
Eau de persil 150,0  
M. Tr. : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
141. Inf. de bulbes de scille 1,5 : 150,0  
Crème de tartre solub.  
Sirop simpl. ana 15,0.  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
142. Racine de Bugrane (Ononis)  
Bois de genévrier  
Baies de genévrier  
Semences de persil. ana 25,0.  
M. Faites espèces diurétiques.  
Tr. : Une cuill. à soupe en infusion théiforme.
143. Cloportes (Blatta orient.) 0,1—0,3  
Sucre blanc 0,2.  
M. Pour une poudre. Donnez-en 10.  
Tr. : 3 poudres par jour.
144. Diurétine 2,0  
(Théobromine.)  
Donnez en 10.  
Tr. : 2 à 3 poudres par jour.
145. Calomel. 0,2  
Donnez 10 poudres pareilles dans des cachets.  
Tr. : 3 poudres par jour.  
(Diurétique dans les affections cardiaques, au besoin associé à la digitale.)
- 15. Diaphorétiques.**  
(Remèdes sudorifiques.)
146. Chlorhydrate de pilocarpine 0,2  
Eau dist. 10,0. Pour un grand verre.  
M. Tr. :  $\frac{1}{2}$  à 1 seringue pleine en injection sous-cutanée.
147. Chlorhydr. de pilocarp. 0,3  
poudre et jus de réglisse q. s. pour 30 pilul.  
Tr. : 1 à 2 pilules.
148. Poud. de Dower 0,3  
Sucre blanc 0,2.  
M. pour une poudre. Donnez en 10.  
Tr. : une poudre à prendre pendant l'enveloppement avec des draps chauds.
149. Commethés sudorifiques on donne de préférence :  
Les fleurs de camomille vulgaire, de tilleul et de sureau.
- 16. Narcotiques (Soporifiques et Anesthésiques).**
150. Chlorhydr. de morphine 0,01  
Sucre blanc 0,3.  
Faites une poudre. Donnez-en 10.  
Tr. : A prendre une poudre le soir avant le coucher.
151. Hydrochl. de morph. 0,05-0,1  
Eau d'amandes amères 10,0.  
M. Gouttes anodines, 10 à 15 gtt.
152. Chlorhydr. de morph. 0,25  
Eau dist. 25,0  
M. Solution à 1 p. % de morphine pour injection cutanée (une seringue de Pravaz pleine contient 0,01 de morphine.)
153. Chlorhydr. de morphine 0,05  
Sir simpl. 30,0.  
M. Tr. :  $\frac{1}{2}$  à 1 cuill. à thé.
154. Chlorhydr. de morph. 0,05  
Eau d'amandes am. 5,0  
Eau dist. 100,0  
Muc. gg. arab.  
Sirop simpl. ana 25,0.  
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
155. Chloral hydraté 2,0—5,0  
Eau dist.  
Sir. d'éc. d'oranges ana 5,0.  
M. A prendre en une fois ou par moitié.
156. Chloral. 2, 5  
Eau dist. 10,0.  
M. A prendre le soir dans 1 tasse de lait.
157. Chloral. amid. 2,0.  
Donnez 5 poudres pareilles.  
Tr. : le soir une poudre dans un cachet.