

APPENDICE.

Formules, Bains et Cures.

I. Antifébriles.

1. Sulf. Quinin. 1,0 — 2,0
Acid. sulf. dil. q. s. pour dissoudre,
Eau de menthe poiv. 15,0.
M. A prendre en une fois.
(Comme antifébrile, dans la fièvre
intermittente, la névralgie du
trijumeau, etc.).
2. Sulf. Quinin. 0,5 — 10,0
Donnez poudres semblables N° 6
en cachets.
Tr.: A prendre de 1 à 2 cachets.
3. Sulf. Quinin. 1,5
Poudre de feuilles de digitale 0,5
Suc de réglisse q. s. pour 30 pil.
Tr.: 1 à 2 pil. trois fois par jour.
4. Salicyl. de soude 5,0
D. poudres pareilles N° 4.
1 à 2 par jour dans du vin, du café
noir ou des pains azymes.
5. Salicyl. de soude 8,0 — 10,0
Eau de menthe 30,0.
Tr.: A prendre en deux ou trois fois
dans les 24 heures.
(Dans le rhumat. artic. aigu.).
6. Acid. salicyl. crist. en poudre 0,5
D. 20 pareilles en cachets (amylacés
ou gélatineux).
Tr.: un cachet par heure.
(Dans le rhum. art. aigu.)
7. Salol 1,0 — 2,0
D. poudres pareilles N° 10.
Tr.: 3 à 4 poudres par jour dans
des pains azymes.
8. Antipyrine 1,0 — 2,0
Donnez 10 poudres semblables.
Tr.: 1 à 2 poudres dans des pains
azymes, dans de l'eau ou du vin.
9. Antifébrine 0,25 — 0,5
D. poudres N° 10.
1 à 2 poudres en cachets ou dans
du vin.

10. Salipyrine 1,0 — 2,0
D. poudres semblables N° 10.
1 à 3 poudres dans des cachets ou
du vin.
11. Phénacétine 0,5 à 1,0.
Donnez 6 poudres semblables.
A prendre dans du vin ou dans
des pains azymes.

2. Acides.

12. Acid. phosphorique 2,0
Eau distill. 120,0
Sir. de framb. 20,0.
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
13. Acid. chlorhyd. dilué 2,0
Eau distill. 120,0
Sir. de framboises 15,0.
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill.
14. Acid. sulf. dil. 2,0
Eau dist. 120,0
Sir. de framb. 20,0.
Tr.: Toutes les 2 h. une grande cuill.
15. Carbonat. de pot. 4,0
Jus de citr. récemment exprimé
q. s. pour saturer.
Eau comm. 100,0
Sir. simpl. 20.
Tr.: Une cuill. à soupe d'heure en
heure ou de 2 en 2 heures (Pot. de
Rivière.)

3. Expectorants.

16. Rac. d'ipéc. 0,3 — 0,5
A infuser dans de l'eau bouillante
120,0
Ajoutez sir. de guimauve 10,0
(au besoin chlorhydrate de morph.
0,03 — 0,5.)
Tr.: Toutes les 2 h. une grande cuill.
17. Infus. de rac. d'ipéc. 0,3 — 0,5 : 120,0
Eau d'amandes amères 3,0
(ou extr. d'opium 0,2)
Suc de réglisse 5,0.
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill.

18. Infus. de racine de sénéga 10,0 :
150,0
Chlorhydr. d'ammoniaque 3,0
Jus de réglisse 10,0
Tr.: Toutes les h. une cuill. ou de 2
en 2 h.
19. Infus. de rac. de sénéga 10,0 : 150,0
Liq. ammon. anisée 4,0
Sir. simple 20,0
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
20. Décoct. d'écorce de quillaja 5,0 :
180,0
Sirop simpl. 10,0
Tr.: Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
(préférable à la racine de sénéga).
21. Décoct. d'herbes de polygal. 15,0 :
150,0
Liq. amm. anis. 5,0
Sir. de guimauve 20,0
Tr.: Toutes les h. une cuill. ou de 2
en 2 heures.
22. Poud. de rac. d'ipéc. 0,03
Opium 0,01
Sucre blanc 0,3
M. pour une poudre, donnez 20 par.
Tr.: Toutes les 2 h. une poudre, ou
d'heure en heure.
23. Liq. amm. anis.
Teint. de stramon.
Teint. d'opium simpl. an. 5,0
M. *Tr.*: Trois fois par jour 15 à 20
gouttes dans de l'eau.
(Dans la bronchite chronique.)
24. Liq. amm. anis. 5,0
Eau d'amand. amèr. 10,0
M. *Tr.*: 20 gouttes 3 fois par jour
dans de l'eau.
25. Chlorhyd. d'ammoniaque.
Jus. de réglisse dépur. ana. 3,0 à
5,0
Eau de fenouil 180,0.
M. *Tr.*: Toutes les 2 heures une
cuill. à soupe.
(Mixture fluidifiante.)
26. Chlorhyd. d'ammon. 5,0
Tartre stibié 0,05
Eau de fenouil 150,0
Jus de réglisse 10,0
M. *Tr.*: Toutes les 2 h. une cuill.
27. Soufre doré d'antimoine 0,03
Chlorhyd. d'ammon.
Sucre blanc. ana 0,3
M. pour une poudre. Donnez-en 15.
Tr.: Toutes les 2 ou 3 h. une pou-
dre.
28. Souf. doré d'antim. 0,05
Chlorhydrate de morphine 0,005
0,01
Sucre blanc 0,5
M. pour une poudre. Donnez-en 10.
Tr.: deux à trois poudres par jour.
29. Chlorhyd. d'apomorphine 0,03 — 0,05
Acid. chlor. dilué 0,5
Chlorhyd. de morphine 0,03
Eau de fenouil 150,0
M. dans un verre obscur.
Tr.: de 2 en 2 ou de 3 en 3 h. une
cuill. à soupe.
30. Chlorh. apomorph. 0,05
Jus et poudre de réglisse q. s.
pour 50 pilules.
M. d'heure en heure ou de 2 en 2 h.
1 à 3 pilules.
31. Acid. benzoïque 0,1 — 0,3
Sucre blanc 0,5.
M. pour une poudre, donnez-en 10
dans du papier gommé.
Tr.: Toutes les h. une poudre ou de
2 en 2 h.
32. Baume de Pérou 5,0
Gomme arab. 2,5
Eau dist. 150,0
pour une émulsion. Ajoutez-y
Sir. de cannelle 20,0.
M. toutes les h. ou de 2 en 2 h. une
cuill. à soupe après avoir agité.
(Le baume de Pérou, de copahu, la
térébenthine, etc. le myrtol. (dans
la bronchite fétide) se prescri-
vent à l'intérieur contre la bron-
choblennorrhée, le mieux sous
forme de capsules gélatineuses.)
33. Infus. de rac. d'ipéc. 0,1 — 0,3 : 100,0
Eau d'amandes amères 1,5
Sir. de guim. 15,0
M. Toutes les 2 h. une cuill. d'enfant.

- | | |
|---|--|
| <p>34. Infus. de rac. de sénéga 5,0 : 100,0
Liq. ammon. anis. 1,0
M. Toutes les 2 h. ou d'heure en heure
une cuill. d'enfant.</p> <p>35. Tartre émétique 0,03
Eau dist. 100,0
Sir. de Guim. 20,0.
M. Toutes les 2 h. une cuill. d'enfant.</p> | <p>36. Chlorhyd. d'apomorphine 0,04.
Eau dist. 15,0
Sir. de guim. 20,0
M. 15 à 20 gouttes toutes les h.</p> <p>37. Acid. benzoïque
Camphre trituré ana 0,03 — 0,05
Sucre de lait 0,3
M. pour une poudre. Donnez-en 10
par. dans un papier gommé.
<i>Tr.</i> : toutes les 2 h. une poudre (contre
la bronchite capillaire.)</p> |
|---|--|

4. Inhalations.

38. Les remèdes pouvant le mieux servir en inhalations s'emploient dans les proportions suivantes :

Chlorure de sodium 2,0—10,0 : 500,0
Bicarbonate de soude 2,0—10,0 : 500,0
Chlorhydrate d'ammoniaque 2,0—5,0 : 500,0.

(En outre les eaux minérales d'Ems, de Salzbrunn, etc., sont fréquemment usitées en inhalations.)

Alun 2,0—5,0 : 500,0
Acide tannique 2,5—10,0 : 500,0.

Acide phénique 0,5—1,5 : 500,0
Eau créosotée 5,0—15,0 : 500,0
Eau de goudron 20,0—100,0 : 500,0
Eau de chaux mêlée à égale ou à double quantité d'eau.
Borax 2,0—5,0 : 500,0
Chlorate de potasse 2,0—5,0 : 500,0

(La térébenthine et le baume de Pérou, ce dernier étendu de 2 parties d'alcool, se versent par cuillerées à thé sur de l'eau bouillante et on fait inhaler les vapeurs qui se dégagent. La pipe dite de térébenthine est un engin très approprié, qui sert également à inhaler d'autres substances résineuses. V. tome I. Les inhalations carboliques se font le plus convenablement à l'aide du masque de Curschmann. V. t. I. Les *inhalations d'iodoforme* se pratiquent de préférence avec l'appareil de Küssner.)

Eau d'amandes amères 5,0—10,0 : 500,0
Teint. d'opium simple 1,0—3,0 : 500,0
Extr. d'opium 0,3—0,5 : 500,0
Bromure de potassium 3,0—10,0 : 500,0.

5. Autres formules et dosages pour le traitement des maladies des organes respiratoires (1).

- | | |
|---|--|
| <p>39. Acid. carbol.
Alcool ana 10,0
Liq. ammon. caustique 5,0.
M. pour renifler.
(remède errhin.)</p> <p>40. Les solutions les plus usitées pour <i>douches nasales</i> sont :
Eau, thé de camomille, de sauge.
Chlorate de potasse 15,0—50,0 : 1000,0
Carbonate de soude, alun et tannin 10,0—20,0 : 1000,0
Acide borique, salicylique et carbolique 5,0—10,0 : 1000,0
Hypermanganate de potasse 1,0—5,0 : 1000,0.</p> <p>41. Pour <i>badigeonner la muqueuse du pharynx, du nez et du larynx</i>, on emploie principalement :
Nitrate d'argent 1,0 : 15,0—50,0 d'eau distillée.
Alun et acide tannique 5,0 : 25,0 d'eau distillée.
Teinture d'iode pure ou étendue d'alcool.
Borax 5,0 avec glycérine 25,0.
Alcool pur.
Acide phénique pur.
Glycérine iodée :
Iode pur 0,5
Iodure de potassium 2,5
Glycérine 25,0.
M. usage externe.</p> <p>42. Iodure de potassium 5,0—10,0
Eau distillée. 200,0.
M. 3 à 4 cuill. à soupe par jour dans de l'eau.</p> <p>(Dans la bronchite croupale et nommément dans l'asthme bronchique, où la dose peut être encore plus considérable.)</p> <p>43. Extr. de belladone 0,01—0,02
Sucre blanc 0,3
M. Donnez 15 poudres pareilles.
<i>Tr.</i> : 3 poudres par jour,
(Dans la coqueluche.)</p> <p>44. Bromure de potass. 2,0—5,0
Eau dist. 100,0
Sirop simple 20,0
M. toutes les 3 h. une cuill. d'enfant.
(Coqueluche.)</p> <p>45. Chloroforme 30,0
Éther 60,0
Huile de térébenthine rectifiée 10,0
M. une à deux cuill. à thé sur un mouchoir pour inhaler.
(Dans la coqueluche.)</p> | <p>Résorcine pure 3,00
Glycérine 30,0
Usage externe (dans la diphtérie.)</p> <p>46. Bromoforme 3,00
dans un verre foncé
<i>Tr.</i> : 3 fois par jour dans de l'eau
sucrée 3 à 5 gouttes
(Dans la coqueluche.)</p> <p>47. Acid. arsenieux 0,3—0,5
Poivre noir 3,0
Jus et poudre de réglisse q. s. pour
100 pil.
<i>Tr.</i> : 2 à 3 pil. par jour.
(Tuberculose chronique.)</p> <p>48. Acétate de plomb 0,1
Sucre blanc 0,4
M. pour une poudre, donnez-en 10
<i>Tr.</i> : toutes les ½ heures ou toutes
les heures une poudre
Dans l'œdème pulmon.</p> |
|---|--|

1. Remèdes narcotiques et cocaïne, v. plus loin.

6. Prescriptions pour le traitement des maladies du pharynx (1).

49. Chlorate de potasse 1,00
Eau dist. 300,0
M. en gargarisme, pur ou à moitié mélangé d'eau.
50. Alun 5,0—10.
Eau dist. 300,0
M. en gargarisme
51. Borax 10,0
Eau dist. 300.
M. en gargarisme.
52. Chlorate de potasse 3,0—5,0
Eau dist. 150,0
(chez les enfants avec du sirop simpl. 10,0.)
M. *Tr.*: avaler lentement $\frac{1}{2}$ cuill. à thé de $\frac{1}{4}$ d'heure en $\frac{1}{4}$ d'heure ou de $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}$ h.
(Dans l'angine simple, gangréneuse et diphtérique.)
53. Papayotine 0,5
Eau dist. 10,0
M. pour badigeonner, plusieurs fois par jour.
(Dans l'angine croupale pour dissoudre les membranes. Remède coûteux !)
54. Sublimé corrosif 0,02—0,05
Eau dist. 50,0.
M. en badigeonnage, 4 à 6 fois par jour.
(Dans la diphtérie à son début.)
- ### 7. Remèdes pour régler la circulation cardiaque.
55. Poudre de feuilles de digit. 1,0—2,0 faites infuser dans eau bouillante 150,0.
M. toutes les h. ou de 2 en 2 h. une cuill. à soupe.

56. Feuilles de digit. en poudre 0,1—0,2.
Donnez 20 poudres en cachets.
Tr.: toutes les heures ou de 2 en 2 h. un cachet.
57. Inf. de feuilles de digit. 1,5 : 120,0
Liquueur d'acétate de potasse 30,0
Oxymel scillitique 15,0.
M. Toutes les heures une grande cuill.
58. Inf. de feuilles de digit. 1,5 : 120,0
Crème de tartre soluble 4,0.
M. toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
59. Salicylate de caféine et de soude 0,3 !
Donnez 12 poudres en cachets.
Tr.: tous les jours de 4 à 6 poudres.
Diurétique et succédané de la digitale.
60. Infus. d'adonis vernal 3,0—5,0 : 150,0
Sirop simple 10,0.
M. toutes les 2 h. ou d'heure en heure une cuill. à soupe.
(Succédané de la digitale, surtout quand celle-ci n'est pas tolérée.)
61. Infusion de muguet (convallaria majalis) 5,0 : 150,0
Sirop simple 10,0.
Tr.: 3 à 4 fois par jour une cuill. à soupe.
(Également pour remplacer la digitale, réclame de la prudence.)
62. Sulfate de spartéine 0,001—0,002
Sucre blanc 0,3.
M. pour faire une poudre, donnez-en 10 semblables.
Tr.: 1 à 3 par jour. (Remède également recommandé comme succédané de la digitale.)
63. Teinture de semences de strophanthus 10,0.
10 à 15 gouttes plusieurs fois par jour.
(Bon excitant dans la faiblesse cardiaque chronique et surtout aiguë.)

1. Solution pour le badigeonnage, v. aussi le n. 41.

8. Excitants (analeptiques).

64. Camphre 2,5
Huile d'amandes 10,0.
M. pour injection sous-cutanée. Une seringue de Pravaz en entier en une fois.
65. Camphre trituré 0,1—0,15.
Sucre de lait 0,4.
M. pour une poudre, donnez-en 10 dans du papier gommé.
Tr.: une poudre d'h. en h. ou de $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}$ h.
66. Éther sulfurique 20,0.
Pour injection sous-cutanée. Une seringue pleine en une fois.
(De même l'éther acétique et l'esprit de nitre doux.)
67. Éther sulf. ou acétique 10,0
Tr.: 10 à 20 gouttes sur du sucre.
(De même l'esprit de nitre doux.)
68. Liq. ammon. anisat. 10,0
Éther alcoolisé
Teinture arom. ana 5,0.
M. 20 gouttes sur du sucre ou dans de l'eau.
69. Musc. 0,1—0,2
Sucre de lait 0,4.
M. pour une poudre. Donnez-en 5 dans du papier gommé.
Tr.: Une poudre de 2 en 2 ou 3 en 3 heures (0,1 de musc coûte 1 fr. !)
70. Teinture de musc.
Sirop simple, ana 5,0.
M. 30 à 40 gouttes plusieurs fois par jour.
71. Alcool dilué
Teinture aromatique ana 3,0
Eau distill. 120,0
Sirop simple 15,0.
M. toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
(Au lieu de vin dans la pratique des indigents.)
- ### 9. Stomachiques (digestifs) et amers.
72. Acide chlorhydrique dilué 10,0.
Tr.: 10 à 20 gouttes dans de l'eau $\frac{1}{2}$ heure après le repas.
73. Pepsine allemande solub. 0,5.
Donnez 10 poudres semblables.
Tr.: une poudre dans de l'eau après les repas.
74. Pepsine 0,5.
Sirop d'écorces d'oranges 100,0.
Sirop de pepsine par cuillères à thé.
75. Teinture amère 10,0
Teinture aromatique 5,0
M. à prendre 15 à 20 gouttes.
76. Teinture de gentiane 10,0
Teinture aromatique
Sirop d'écorces d'oranges ana 5,0.
M. 20 à 30 gouttes.
77. Teinture de rhubarbe vineuse
Élixir d'orange composé ana 15,0.
M. 20 à 25 gouttes.
78. Teinture de strychnine (ou de noix vomique)
Eau de laurier-cerise ana 5,0
M. 2 ou 3 fois par jour 10 à 15 gr.
79. Chlorhydrate d'orexine 0,3—0,5
Donnez 10 poudres. 1 à 2 poudres par jour dans des cachets.
(Excitant de l'appétit.)
80. Sous-nitrate de bismuth 0,3
Sucre blanc 0,2.
M. pour une poudre. Donnez-en 15.
Tr.: 3 à 4 poudres par jour.
(Ulçère de l'estomac, catarrhe chronique de l'estomac.)
81. Sous-nitrate de bismuth 0,3
Chlorhydrate de morphine 0,01
Sucre blanc 0,2.
M. pour faire une poudre. Donnez-en dix pareilles.
Tr.: 2 à 3 poudres par jour.
(Cardialgies.)
82. Sous-nitrate de bismuth 2,0—5,0
Bicarbonate de soude 30,0
Élaeosaccharure de menthe 5,0.
M. pour une poudre à délivrer dans une boîte.
Tr.: 3 fois par jour une prise sur la pointe du couteau.
83. Carbonate de magnésie 20,0
Élaeosacch. de menthe 10,0
M. pour une poudre, 2 à 3 fois par jour sur la pointe d'un couteau (dans la pituite).

84. Bicarbonate de soude 30,0
Élaosacchar. de menthe 10.
M. faites une poudre.
Tr. : une prise sur la pointe du couteau.
85. Résorcine pure 2,0
Eau distillée 180,0
Sirop simple 20,0
M. dans un verre obscur, une cuill. toutes les 2 h.
(Recommandé dans la dyspepsie aiguë et chronique.)
M. *Tr.* : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
86. Décoction de condurango 15,0 : 150,0
Sirop d'écorces d'oranges 15,0
M. une cuill. à soupe toutes les 2 ou 3 heures.
(Stomachique, surtout dans le cancer de l'estomac.)
- 10. Émétiques (Vomitifs).**
87. Rac. d'ipéc. pulver. 1,0
Tartre stibié, 0,05.
M. faites une poudre. Donnez 4 pareilles.
Tr. : Tous les quarts d'heure une poudre jusqu'à effet.
88. Poudre de racine d'ipéca 1,0—2,0
Tartre stibié 0,03—0,05.
Eau dist. 30,0
Oxymel. scillit. 15,0.
M. Toutes les 10 minutes une cuiller d'enfant jusqu'à effet.
(Vomitif pour enfant.)
89. Hydrochlorate d'apomorphine 0,04
Eau dist. 2,0.
M. $\frac{1}{2}$ à 1 seringue entière à injecter sous la peau.
90. Sulfat. de cuivre 1,0
Eau dist. 50,0.
M. à prendre par cuill. à thé jusqu'à effet.
91. Sulfate de zinc pulver. 0,3—0,5.
Donnez 3 poudres semblables.
Tr. : Toutes les 5 minutes une poudre jusqu'à effet.

11. Laxatifs (Dérivatifs).

92. Huile de ricin 60,0.
Tr. : Une cuill. à soupe toutes les 2 heures ou toutes les heures.
Plus agréable à prendre dans des capsules gélatineuses.
93. Huile de ricin 30,0
Gomme arabique 1,0
Pour une émulsion avec de l'eau distillée 15,0
Sirop d'amandes 15,0.
D'heure en heure une cuill. d'enfant (bon purgatif pour les enfants).
94. Calomel 0,3—0,5.
Donnez 5 poudres semblables en cachets.
Tr. : Toutes les 3 h. une poudre jusqu'à effet.
95. Sulfate de soude 50,0
Bicarbon. de soude 6,0
Chlorure de sodium, 3,0.
M. faites une poudre.
Tr. : Le matin 1 à 2 cuill. à thé dans une tasse d'eau chaude.
(Sels de Carlsbad artificiels.)
96. Sulfate de magnésie 50,0
Bicarbon. de soude 10,0.
M. pour une poudre, 1 cuill. à thé dans une tasse d'eau.
97. Racine de rhubarbe 5,0—15,0
Faites bouillir dans de l'eau chaude 150,0
Sir. d'écorces d'oranges 10,0.
M. *Tr.* : Toutes les h. une cuill. à soupe.
98. Feuilles de senné coupées 15,0
Semences d'anis 5,0
Faites infuser dans de l'eau chaude 150,0
Ajoutez sulfate de soude 20,0
M. *Tr.* : Une cuill. à soupe d'heure en heure.
99. Écorce de nerprun (Rhamnus frangula) 25,0
Faites bouillir dans de l'eau jusqu'à réduction à 120,0
Sir. de manne 25,0
M. Toutes les h. une cuill. à soupe.

100. Racine de rhub. pulver. 5,0
Sulfate de magnés. ou du soude 15,0
Rhizome de gingembre 2,0.
M. Pour une poudre.
Tr. : $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. à thé.
101. Racine de rhubarbe
Soufre précipité
Bitartrate de potasse
Semences d'anis ana 5,0
Sucre blanc 20,0.
M. Faites une poudre. Une prise sur la pointe du couteau.
(Contre les hémorrhoides.)
102. Racine de rhubarbe
Extr. de rhubarbe comp. ana. 1,5
Extr. de belladone 0,1.
M. Faites 30 pilules
Tr. : 2 à 4 par jour.
103. Extr. d'aloès
Savon de jalap, ana 1,5.
M. pour faire 30 pilules.
Tr. : 2 à 4 par jour.
104. Extr. d'aloès
Poudre de racine de rhubarbe ana 1,0
Extr. de coloquinte
Gomme gutte ana 0,5.
M. pour faire 30 pilules.
Tr. : 2 à 3 pilules par jour.
105. Extr. d'aloès, 5,0
Extr. de rhub. comp. 3,0
Fer pulver. 3,0.
M. pour 100 pilules.
Tr. : 1 à 2 pilules à la fois.
(Constipation habituelle chez les anémiques.)
106. Extr. d'aloès 3,0
Extr. de belladone 0,5
Savon médic. q. s.
pour faire 30 pilules.
Tr. : 1 à 2 pilules.
107. Podophylline 0,03—0,3
Sucre blanc 0,3.
M. pour une poudre. Donnez 10 pareilles.
Tr. : Selon les besoins 1 à 2 poudres par jour.

108. Décoct. de pulpe de tamarin fraîche 50,0 : 250,0
Sulfate de magnésie 25,0.
M. *Tr.* : à prendre de bon matin $\frac{1}{2}$ à 1 verre à vin.
109. Extr. fluide de Cascara sagrada 20,0.
Tr. : 1 à 2 fois par jour $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. à thé.
110. Glycérine 3,0—5,0.
En clystère à l'aide d'une petite seringue
(parfois avec un excellent effet.)

12. Astringents et Antidiarrhéiques.

111. Acide tannique 0,05—0,1
Opium 0,02.
Sucre 0,5.
M. faites une poudre, donnez-en 10.
Tr. : Toutes les 2 à 3 h. une poudre.
112. Acide tannique
Teinture d'opium simple ana 1,0—2,0
Eau distillée 150,0
Sir. simple 15,0.
M. Une cuill. à soupe d'heure en heure ou de 2 en 2 h.
113. Nitrate d'argent 0,1—0,2
Opium pulv. 0,2
Racine et extr. de gentiane q. s. pour faire 50 pilules.
Tr. : 4 à 6 pilules par jour.
(Diarrhée chronique.)
114. Nitrate d'argent 0,1
Eau dist. 50,0
Glycérine 10,0.
M. dans un verre obscur.
Tr. : Toutes les deux h. une cuill. à thé.
(Diarrhée infantile.)
115. Sous-nitrate de bismuth 0,5—1,0
Opium 0,02
Sucre blanc 0,3.
M. faites une poudre, donnez-en 12.
Tr. : 2 à 3 poudres par jour.
(Ulcères chroniques de l'intestin.)

116. Sous-nitrate de bismuth 5,0
Mucilag. de gomme arab.
Sir. simple ana 15,0
Eau dist. 120,0
M. Agitez, une cuill. à soupe par heure ou de 2 en 2 h. (Dysenterie.)
117. Salicylate de bismuth 0,1 à 0,2
Poudre de gomme 0,5
M. pour faire une poudre, donnez-en 12 pareilles.
Toutes les 2 h. une poudre. (Catarrhe intestinal des enfants.)
118. Acét. de plomb 0,03—0,05
Opium 0,01—0,02
Sucre blanc 0,5.
M. faites une poudre. Donnez-en 12.
Tr. : Toutes les 2 h. une poudre, ou toutes les 3 h.
119. Décoct. de bois de campêche 5,0—10,0 : 150,0
Sir. simple 30,0.
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
120. Infus. de racine de colombo 15,0 : 150,0.
Élixir d'écorces d'oranges 5,0
Sir. simple 25,0
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
121. Décoct. de racine de ratanhia 5,0—10,0 : 120,0
Teint. aromatique 5,0
Sirop simpl. 15,0
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
122. Mucilag. gg. arab.
Sirop simpl. ana 20,0
Eau distill. 120,0
Teinture d'opium simpl. 1,0—2,0.
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
123. Huile d'amandes 10,0
Gomme arab. 5,0
Eau distill. 120,0
Faites une émulsion, ajoutez Sirop simple 20,0
(au besoin Teinture d'opium simple, 2,0).
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
124. Naphthaline pure, 0,2 à 0,5
Donnez poudres pareilles N° 10.
Tr. : 3 à 4 poudres par jour (en cachets).

125. Décoct. de salep. 1,0 : 200,0
Teinture d'opium safranée. gtt. 3 à 5.
M. une cuill. d'enfant toutes les h. ou toutes les 2 h. (diarrhée infantile).
126. Calomel 0,01
Opium pur 0,003—0,005
Sucre de lait 0,3.
M. faites une poudre. Donnez-en 12.
Tr. : une poudre de 2 en 2 ou de 3 en 3 heures.
(Diarrhée infantile.)
127. Créosote gtt. 2 à 4
Eau dist. 35,0
Sirop de guimauve 15,0.
M. Toutes les 2 h. une cuill. à thé. (Diarrhée infantile.)
128. Décoct. de racine de colombo, 5,0 : 100,0
Teint. d'opium simple gtt. 4.
Sirop de guimauve 20,0.
M. Toutes les 2 h. une cuill. d'enf. (Catarrhe intestinal des enfants.)
- 13. Anthelmintiques (Vermicides).**
129. Trochisques de santoline (jusqu'à 0,05) n° 10.
M. matin et soir 2 tablettes.
(Contre les ascarides et les oxyures.)
130. Fleurs de semen-contra (cina) 5,0
Bulb. de jalap 1,0
Sir. simpl. 25.
M. faites un électuaire.
Tr. : à prendre en 3 fois (ascarides).
131. Fleurs de koussou 5,0
d. 3 doses semblables.
Tr. : toutes les h. une poudre dans un verre de vin blanc.
132. Écorce de grenadier 50,0—100,0
Eau comm. 1000,0
Faites macérer pendant 24 heures et bouillir jusqu'à réduction à 150,0, ajoutez
Extr. éthéré de fougère mâle 5,0.
Tr. : Tous les quarts d'heure une cuill. à soupe.
(ou en une fois à l'aide de la sonde œsophagienne !)

133. Décoction d'écorce de grenadier 30,0 : 180,0
Extr. éthér. de fougère mâle 2,5
Sirop d'écorces d'oranges 20,0.
M. En trois portions de demi-heure en demi-heure (ténia des enf.).
134. Extr. de fougère
Poudre de racine de fougère ana 2,0.
M. pour faire 20 pilules,
Tr. : Matin et soir 10 pilules.
135. Extr. de fougère 8,0
Mucil. de gomme arab. 30,0
Sirop simple 20,0.
M. Tr. : à prendre en deux portions dans l'espace d'une demi-heure. (Le mode le plus simple et le plus commode d'administrer l'extrait de fougère (ce sont les capsules gélatineuses de 1 à 4 grammes).
136. Tannate de Pelletierine 0,3—0,5.
A prendre dans de l'eau.
Après une demi-heure un purgatif. (Recommandable.)
- 14. Diurétiques.**
(Hydragogues.)
137. Liqueur d'acét. de potasse
Sirop simple ana 25,0
Eau de fenouil 100,0.
Tr. : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
138. Vinaigre scillit. 30,0
Carbon. de potasse q. s. pour saturer complètement.
Eau de persil 120,0
Sirop simple 20,0.
M. Tr. : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
139. Acétate de soude 10,0
Eau de persil 150,0
M. Tr. : toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
140. Inf. de bulbes de scille 1,5 : 150,0
Crème de tartre solub.
Sirop simpl. ana 15,0.
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
141. Racine de Bugrane (Ononis)
Bois de genévrier
Baies de genévrier
Semences de persil, ana 25,0.
M. Faites espèces diurétiques.
Tr. : Une cuill. à soupe en infusion théiforme.
142. Cloportes (Blatta orient.) 0,1—0,3
Sucre blanc 0,2.
M. Pour une poudre. Donnez-en 10.
Tr. : 3 poudres par jour.
143. Diurétine 2,0. (Salicylate de soude et de Théobromine.) Faites-en une poudre. Donnez-en 10.
Tr. : 2 à 3 poudres par jour en cachets (coûteux).
144. Calomel. 0,2
Donnez 10 poudres pareilles dans des cachets.
Tr. : 3 poudres par jour.
(Diurétique dans les affections cardiaques, au besoin associé à la digitale. De même la caféine (v. n° 59) et le salicylate de soude (3 à 4 grammes par jour) ont un effet diurétique prononcé.)
- 15. Diaphorétiques.**
(Remèdes sudorifiques.)
145. Chlorhydrate de pilocarpine 0,2
Eau dist. 10,0. Pour un grand verre.
M. Tr. : $\frac{1}{2}$ à 1 seringue pleine en injection sous-cutanée.
146. Chlorhydr. de pilocarp. 0,3
poudre et jus de réglisse q. s. pour 30 pilul.
Tr. : 1 à 2 pilules.
147. Poud. de Dower 0,3
Sucre blanc 0,2.
M. pour une poudre. Donnez-en 10.
Tr. : une poudre à prendre pendant l'enveloppement avec des draps chauds.
148. Comme thés sudorifiques on donne de préférence :
Les fleurs de camomille vulgaire, de tilleul et de sureau.

16. Narcotiques (Soporifiques et Anesthésiques).

149. Chlorhydr. de morphine 0,01
Sucre blanc 0,3.
Faites une poudre. Donnez-en 10.
Tr. : A prendre une poudre le soir avant le coucher.
150. Hydrochl. de morph. 0,05-0,1
Eau d'amandes amères 10,0
M. Gouttes apodines, 10 à 15 gtt.
151. Chlorhydr. de morph. 0,25
Eau dist. 25,0
M. Solution à 1 p. % de morphine pour injection cutanée (une seringue de Pravaz pleine contient 0,01 de morphine.)
152. Chlorhydr. de morphine 0,05.
Sir. simpl. 30,0.
M. *Tr.* : $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. à thé.
153. Chlorhydr. de morph. 0,05
Eau d'amandes am. 5,0
Eau dist. 100,0
Muc. gg. arab.
Sirop simpl. ana 25,0.
M. Toutes les 2 h. une cuill. à soupe.
154. Chloral hydraté 2,0—5,0
Eau dist.
Sir. d'éc. d'oranges ana 5,0.
M. A prendre en une fois ou par moitié.
155. Chloral. 2, 5
Eau dist. 10,0.
M. A prendre le soir dans $\frac{1}{2}$ tasse de lait.
156. Chloral amid. 2,0
Donnez 5 poudres
Le soir une poudre en cachet.
157. Sulfonal 2,0.
Donnez 6 poudres semblables.
Tr. : Une poudre 2 h. avant le coucher dans une grande quantité de liquide.
158. Trional 1,0 à 2,0.
Donnez 6 poudres semblables.
Le soir une poudre en cachet.
159. Bromure de potass. 2,0—5,0.
donnez 5 poudres pareilles.
Tr. : A prendre le soir en solution dans un verre d'eau.
160. Tannate de Cannabine 0,3—0,5
Sucre bl. 0,2.
M. Pour une poudre, donnez en 6.
Tr. : le soir une poudre (coûte cher!).
161. Extr. de chanvre ind. 0,2—1,0 !
Sucre blanc 0,3.
M. Pour une poudre. Donnez en 6.
Tr. : Une poudre le soir.
162. Urethan. 1,5—3,0
Donnez 6 poudres semblables.
Tr. : le soir une poudre dans $\frac{1}{2}$ verre d'eau sucrée.
163. Hydrate d'amyle 4,0
Eau distillée 40,0
Extr. de réglisse 4,0.
Tr. : à prendre le soir en une fois (peut aussi s'employer en cachets de 1,0 ou en lavement).
164. Cocaine 0,5—1,0—1,5
Eau distill. 8,0
Esprit de vin rectifié 2,0.
M. usage externe en badigeonnage.
165. Chlorhydrate de cocaïne 0,1—0,15
Alcool q. s. pour dissoudre
Eau distillée 150,0.
M. 1 cuill. d'enfant de $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}$ h. ou d'heure en heure.
166. Chlorhydrate de cocaïne 0,5
Alcool q. s. pour dissoudre.
Eau distillée 10,0.
M. *Tr.* : En injection sous-cutanée. $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ seringue de Pravaz.
Les solutions de cocaïne deviennent toutes plus stables quand on emploie au lieu d'eau pure une solution de sublimé de 1 à 10000.

17. Toniques.

167. Fer réduit 0,05—0,2
Sucre de lait 0,5.
M. pour une poudre. Donnez-en 20.
Tr. : deux poudres par jour.

168. Saccharate d'oxyde de fer soluble 30,0.
D. dans une boîte.
Tr. : Trois fois par jour une prise sur la pointe du couteau.
169. Saccharate de fer carbonaté 30,0.
Tr. : trois fois par jour une prise.
170. Sulfate de fer.
Carbonate de potasse pur ana 10,0 à 15,0, gomme adragante q. s. pour 100 pilules
M. *Tr.* : 3 fois par jour 2 à 4 pilules (pilules de Blaud).
171. Lact. de fer
Suc. de réglisse dépur. ana 6,0.
M. pour 100 pilules.
Tr. : 3 fois par jour 2 à 8 pilules.
172. Lact. de fer.
Extr. de quinquina ana 6,0
Muc. gg. arab. q. s.
pour 100 pilul.
Tr. : 3 fois par jour de 2 à 3 pil.
173. Teinture de fer pommée
Sirop simple ana 15,0.
M. 3 fois par jour, $\frac{1}{2}$ cuill. à thé
Gouttes ferrugin. pour enfants.
174. Teint. éthérée de perchlore de fer
Eau de cannelle ana 25,0.
M. 3 fois par jour $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. à thé dans du vin.
175. Liquor d'albuminate de fer 5,0
3 fois par jour une cuill. à thé.
176. Hémalbumine 50,0.
3 fois par jour $\frac{1}{2}$ cuill. à thé dans des cachets ou dans de l'eau.
177. Sulf. de quinin.
Sulfat. de fer ana 3,0
Jus de réglisse q. s. pour 60 pil.
Tr. : 3 fois par jour 1 à 2 pil.
178. Sirop d'iod. de fer.
Sirop simpl. ana 30,0.
M. 3 fois par jour $\frac{1}{2}$ à 1 cuill. à thé.
179. Acid. arsénieux 0,3
Poivre noir 3,0
Jus et poivre de réglisse q. s. pour 100 pilules.
Tr. : 2 à 3 pilules par jour.
180. Fer réduit 5,0
Acide arsen. 0,2
Extr. de gentiane q. s.
pour 100 pilul.
Tr. : 2 à 3 fois par jour 1 à 2 pilules.

18. Nervins.

181. Bromure de potassium pulv. 1,0 à 3,0.
Donnez 20 poudres semblables dans du papier gommé.
Tr. : 2 à 3 poudres par jour dans $\frac{1}{2}$ verre d'eau ou d'eau de Selters.
182. Liqueur d'arséniat de potasse (solution de Fowler).
Eau de menthe ana 5,0.
3 fois par jour, 10 gtt. augmenter graduellement la dose (*).
183. Nitrate d'argent 1,0
Argile 10,0
Eau distillée q. s.
pour faire 100 pil.
Tr. : 3 fois par jour 1 à 2 pilules avant les repas.
184. Extr. de seigle ergoté 5,0
Poudre et jus de réglisse q. s. pour 100 pil.
Tr. : 3 fois par jour 1 à 3 pil.
185. Sulfate d'atropine 0,01
Poudre et jus de réglisse q. s. pour 20 pil.
Tr. : 2 à 3 pil. par jour.
186. Hydrochlorate d'hyoscine 0,01
Eau distill. 10,0.
Tr. : 1 à 15 gtt. L'hyoscine s'emploie aussi en ingestion sous-cutanée dans la paralysie agitante, les tremblements, les états d'excitation.
187. Oxyde de zinc 0,1 à 0,3
Sucre bl. 0,3.
M. faites une poudre. Donnez-en 20.
Tr. : 2 à 3 poudres par jour.
188. Oxyde de zinc 5,0
Extr. de bellad. 2,0
Extr. de valériane, 5,0
Poudre de racine de valer. q. s. pour 100 pilules
Tr. : 3 fois par jour 2 pilules. (Epilepsie, chorée).

1. Voir pour les autres recettes arsenicales, nos 179 et 180.