

rence vésiculeuse, et toujours sans pédicules ; d'autres fois elles sont comme pédiculées, peu nombreuses, rouges, et offrent assez de ressemblance avec certaines végétations vénériennes ; enfin il en est qui se présentent comme un semis de petits grains durs qui n'occupent que l'extrême superficie de l'organe, et quelques autres qui sont assez larges, mais tellement aplaties, qu'elles sont à peine perceptibles au toucher.

Si ces sortes d'éruptions miliaires et phlycténoïdes peuvent se terminer sans laisser de solution de continuité, le plus souvent leur rupture donne naissance à de petites ulcérations superficielles qui par leur rapprochement finissent quelquefois par n'en former plus qu'une seule.

L'existence des granulations de la muqueuse du museau de tanche, ainsi que les rougeurs et les ulcérations superficielles de cet organe, s'annoncent ordinairement par les symptômes plus ou moins violents de la métrite chronique simple ; tels sont un sentiment de chaleur et cuisson au fond du vagin, un écoulement abondant, des douleurs vives pendant le coït, et quelquefois pendant la défécation, des pesanteurs sur le fondement, des tiraillements dans les aines et les lombes, des bouffées de chaleur au visage, des accès d'hystérie, etc. L'application du spéculum permet non seulement de constater les lésions locales que nous avons signalées, mais encore un gonflement mou et un état de congestion inflam-

ROUG., ULC. ET ÉRUPT. DU COL DE L'UTÉRUS. 631
matoire, marquée par une teinte rouge foncée, une sorte d'ecchymose, enfin par une sensibilité extrême des parties et un suintement de sang qui est provoqué par le contact de l'instrument explorateur, l'opération du toucher, et l'acte génital.

Le traitement de l'inflammation granuleuse du col réclame, comme l'affection précédente, l'emploi des antiphlogistiques, les petites saignées révulsives, les narcotiques, les dérivatifs, le repos absolu des parties, enfin la cautérisation avec le protonitrate acide de mercure. Cependant si l'affection occupait toute la surface du museau de tanche, il faudrait se borner à en cautériser seulement une portion, de peur qu'en déterminant trop d'excitation, il ne survînt des accidents graves ; six ou huit jours après on devrait recommencer la même opération, en portant seulement le caustique sur les points qu'on aurait ménagés la première fois.

Si l'on supposait que le mal dépendit d'un vice syphilitique, scrofuleux, etc., on l'attaquerait par les moyens locaux et généraux dont l'expérience a fait constater l'efficacité pour combattre ces diverses maladies.

DES ULCÈRES CHANCREUX, SCROFULEUX, ETC. SIÈGEANT SUR LE MUSEAU DE TANCHE.

Il est prouvé par un grand nombre de faits, que le col de la matrice peut être le siège d'ulcères qui se sont