

blanche. Cinquante trois livres d'un liquide épais, noirâtre et sanguinolent, s'écoulèrent par la canule; une compression méthodique fut ensuite exercée au moyen de la ceinture de *Monro* et de plusieurs serviettes; la malade, âgée de cinquante ans, fut guérie complètement; car dix mois après l'opération il n'était pas survenu de récurrence. La ponction sus-pubienne a également été faite avec avantage par *Noel Desmairais*, dans un cas d'hydrométrie coexistant avec l'état de grossesse; dans ce cas, comme dans l'hydropisie simple de la matrice, nous pensons qu'il serait préférable d'employer la ponction à travers l'orifice du museau de tanche, comme le conseillent *Huermann* (1), *Zanc* (2), et plusieurs autres auteurs. Cependant, comme il n'est pas impossible de confondre l'hydrométrie avec la vraie grossesse, et que d'ailleurs cette opération peut être suivie d'accidents mortels ainsi que M. le professeur *Cruveilhier* (3), en rapporte un exemple, on ne saurait mettre trop de réserve dans l'usage de ce moyen qui ne devra jamais être employé que comme une ressource extrême (4); nous terminerons en disant que de quel-

(1) Abhandl. von den vornehmsten chir. op. Th. I. hap. 5. § 186. p. 410.

(2) Darstell. blut. heilk. operat. Th. III. abh. 1. p. 289.

(3) Anatomie pathologique, tom. I. p. 281.

(4) Pour éviter la ponction, *Sanctorius* a proposé une sorte de petit spéculum brisé, destiné à ouvrir le museau de tanche, à évacuer l'eau et à faire les injections médicamenteuses.

(Comment. in prim. fen. canon. Avicene, p. 608.)

que manière que l'évacuation du liquide ait été obtenue, on devra tâcher de prévenir la récurrence en prescrivant des injections légèrement détersives, en maintenant pendant quelque temps le col ouvert au moyen d'une petite sonde de gomme élastique, enfin en combattant les affections générales ou locales qu'on supposerait avoir pu déterminer la sécrétion morbide.

## DES HYDATIDES DE LA MATRICE.

Si l'existence des hydatides abdominales a été connue dès la plus haute antiquité, puisque *Arétée* en fait mention dans ses œuvres (1), *Aetius* (2) est le premier auteur ancien qui ait parlé de celles qui se développent dans la matrice. Ces sortes de productions morbides rangées parmi les acéphalocystes, forment une classe particulière de vers vésiculaires, qui quoique bien décrite par *Laennec*, en 1805, n'est pas encore admise par les helminthologues allemands et italiens.

On a admis deux espèces d'acéphalocystes hydatiques: 1<sup>o</sup>, les acéphalocystes en grappes ou hydatides pédiculées; 2<sup>o</sup> les acéphalocystes libres qui présentent deux variétés: les hydatides avec un ongle, et les hydatides sessiles qui sont dépourvues d'onglet et de pédicule.

(1) *Aræti*, de causis et signis diurni. morb. lib. IV. cap. I.

(2) *Med. contractæ*, tetrab. IV. Serm. IV. cap. 79.