

5 minutes et on fait alors ingérer à la malade 100 grammes de lait glacé.

Nous conseillons de donner à la malade, deux heures après la séance, toutes les demi-heures une cuillerée à soupe de lait glacé, mais jusqu'à 6 heures du matin elle refuse de prendre toute nourriture.

A 10 heures du soir et à 2 heures du matin, vomissements. Pendant toute la nuit, insomnie, hoquet fréquent, subdélirium.

Température vaginale soir 36°,4. Pouls soir, 120.

6 juillet. — De 6 heures du matin à 10 heures, ingestion de 200 grammes de lait glacé par doses fractionnées, pas de vomissements.

Même état général que la veille.

A 10 heures, séance d'électrisation d'une demi-heure. Galvanisation descendante du Pn. Dr. Injection 100 grammes de lait glacé.

De 11 heures à 2 heures, hoquet continu. La malade prend par doses fractionnées 90 grammes de lait sans amener de vomissements.

A 2 heures du soir, séance d'électrisation. Galvanisation descendante du Pn. Dr. Le hoquet cesse au bout de 5 minutes et on fait prendre à la malade 100 grammes de lait glacé qui ne sont pas rejetés. Durée de la séance, une demi-heure.

La malade ne voit plus trouble, ne se plaint plus de bourdonnements dans les oreilles. Gastralgie et céphalalgie moins intenses.

Toujours rétention d'urine, envies fréquentes d'uriner, constipation.

Pas de rétrécissement du champ visuel, pas de polyopie, pas de troubles sensitivo-sensoriels.

Réflexe rotulien diminué, réflexe palpébral aboli, réflexe pharyngien normal.

A 6 heures. — Galvanisation descendante du Pn. b. pendant une demi-heure et ingestion de 200 grammes de lait.

Dans l'intervalle de ces deux dernières séances, la malade prend par doses fractionnées 260 grammes de lait, et de plus on fait injection sous-cutanée de 100 grammes d'eau salée à 7‰.

Dans le courant de toute cette journée, la malade n'a eu aucun vomissement.

Poids 38 k. 200. Température vaginale, matin 36°,8, soir 37°. Pouls, matin 104, soir 112.

7 juillet. — Dans la nuit, aucun vomissement, léger délire vers 2 heures du matin.

De 8 heures du soir (6 juillet) à 8 heures et demie du matin : 640 grammes de lait par doses de 40 grammes. Pas de vomissements.

Ce matin la malade a un teint meilleur, la mine plus éveillée, la parole plus facile, plus de céphalalgie, plus de gastralgie, plus de constipation.

Toujours rétention d'urine, envies fréquentes d'uriner, douleur à l'hypogastre.

De 8 heures et demie du matin à 6 heures du soir, 1.140 grammes de lait par doses de 60 grammes toutes les demi-heures, pas de vomissements.

Poids 39 k. 300. Température vaginale, matin 38°,6, soir 37°. Pouls, matin 100, soir 116.

8 juillet. — De 6 heures du soir (7^e jour), à 5 heures du matin, 800 grammes de lait par doses fractionnées de 60 gr.

Léger délire.

Elle se plaint, pour la première fois, d'une douleur assez vive dans la région sublinguale et l'on constate à gauche une tuméfaction douloureuse grosse comme un pois, 2 séances d'électrisations. Durée 1/4 d'heure, pôle Pn. droit.

La malade prend dans la journée, sans avoir aucun vomissement, 1.240 grammes de lait par doses fractionnées.

Poids 39 kg. 300. Température, matin 36°,6, soir 37°,6. Pouls matin 108, soir 124.

9 juillet. — De 6 heures du soir (8 j.), à 3 heures du soir (9 j.), 1.500 grammes de lait. Subdélirium pendant la nuit.

La malade se plaint toujours d'une douleur sous la langue. Gargarismes boriqués tièdes. Mais la faiblesse générale a beaucoup diminué, et on note un appétit très accentué.

Dans le courant de la journée, la malade prend 200 grammes de lait, 600 grammes de bouillon, un œuf à la coque et du pain, et on fait deux séances d'électrisation d'une durée de 1/4 d'heure, le pôle étant appliqué sur le Pn. g.

Poids 39 kg. 300. Temp. vag., matin 36°,8 ; soir 37°,9. Pouls matin 104, soir 124.

10 juillet. — La malade a bien reposé et n'a pas présenté la moindre agitation. De 6 heures du soir (9 j.) à 9 heures du matin 1.500 grammes de lait.

Toujours rétention d'urine, envies fréquentes d'uriner.

La tuméfaction sublinguale a augmenté un peu de volume et est devenue plus douloureuse.

On continue les gargarismes boriqués tièdes.

Deux séances d'électrisation d'un quart d'heure. Pôle Pn. b.

Dans la matinée, la malade prend 100 grammes de lait, 300 grammes de bouillon, une côtelette et du pain, dans l'après-midi 500 grammes de lait et le soir 100 grammes de lait, un peu de viande, un œuf à la coque, 200 grammes de bouillon, un peu de pain.

Poids 38 kg. 900. Temp. vag. matin 37°, soir 38°. Pouls matin 110, soir 128.

11 juillet. — Dans la nuit jusqu'à 10 heures du matin, injection 1.100 grammes de lait.

Ce matin, la malade souffre beaucoup dans la bouche. La tuméfaction de la région sublinguale présente les mêmes caractères que la veille, mais la langue est augmentée de volume surtout du côté droit et est très douloureuse à la pression. M. Bar fait une incision en dedans de l'arcade dentaire inférieure (côté droit) au niveau de la première petite molaire.

Il s'écoule un peu de sang, mais pas de pus. On fait une irrigation de la bouche à l'eau boriquée.

Dernière séance de galvanisation. Pôle Pneumogas. dr. pendant 1/4 d'heure.

Par suite de cette affection de la bouche, la mastication est impossible et la malade rend par intervalle du bouillon, lait, bière. De plus, toutes les 4 heures, irrigation de la cavité buccale avec de l'eau boriquée tiède.

Dans la soirée on constate un gonflement dans la région sous-maxillaire très douloureux, mais il n'existe pas de fluctuation. A gauche légère tuméfaction des ganglions sous-maxillaires. Poids 39 kg. 880. Temp. vag. 37°6, soir 39°2. Pouls matin 110, soir 140.

12 juillet. — Malgré la douleur, la malade a passé une assez bonne nuit. Mais il existe une gêne très notable de la déglutition. M. Bar, après un examen très minutieux de la malade, fait une nouvelle incision au bistouri dans la même région que précédemment, et avec une sonde cannelée va à la recherche du pus. Malgré tout le soin apporté dans cette intervention, on ne trouve aucune collection purulente. Irrigations de la cavité buccale toutes les 2 heures avec eau boriquée tiède. Temp. vag. matin 37°8. Pouls matin 120.

Malgré cette affection intercurrente, les faits sont assez probants pour démontrer sans discussion possible l'efficacité réelle et rapide de la galvanisation.

Depuis le soir de la première séance, les vomissements ont complètement cessé et n'ont pas reparu, l'alimentation s'est effectuée, l'état général est devenu en quelques jours très satisfaisant.

Poids.	Alimentation.
6 juillet. — 38 k. 300	750 grammes de lait.
7 » 39 k. 300	1.780 » »
8 » 39 k. 300	2.040 » »
9 » 39 k. 300	1.700 » »
	600 grammes de bouillon
	1 œuf à la coque.
	80 grammes de pain.
10 » 38 k. 900	2.300 » de lait.
	500 » de bouillon.
	1 œuf à la coque.
	Viande, pain.
11 » 39 k. 880	2.100 grammes de lait.
	150 » de bouillon.
	400 » de bière.

	Urine	Urée	UROLOGIE				Albumine
			Chlo- rures	Phos. alcalins	Ph. alc. Terr.		
6 juillet	185 cc	19 gr. 76	0 gr. 14				0 gr. 75
7 »	1.230 »	20 26	1 10	0 gr. 75	0 gr. 031		0 20
8 »	1.710 »	22 37	1 06	0 96	0 067		0 12
9 »	2.620 »	21 05					traces d'al- bumine.
10 »	1.885 »	20 61					»
11 »	1.460 »	21 55					»

Les urines ont toujours été très claires et n'ont présenté aucun dépôt.

OBSERVATION LXIX. — M^{me} N..., rue Moncey, nous est adressée le 23 décembre 1897 par M. le Dr Champetier de Ribes pour des vomissements incoercibles qui datent de quinze jours. Cette jeune femme de 22 ans, très nerveuse, a eu une première grossesse 16 mois avant, avec des vomissements intermittents pendant les 5 premiers mois.

Les 23, 24 et 25 décembre, nous pratiquons six séances de courants galvaniques, avec la plaque positive à la nuque et la deuxième au creux épigastrique. Durée de chaque traitement : 20 minutes à une demi-heure.

Dès la première séance, l'alimentation est conservée et la nuit est plus calme. Nous abandonnons la malade le 3^e jour du traitement, la guérison paraissant définitive.

Depuis, aucun vomissement, la grossesse approche de son terme.

OBSERVATION LXX. — M^{me} de B..., avenue de Messine, âgée de 28 ans, 4^e grossesse, nous est adressée par M. le Dr Champetier de Ribes, en avril 1897. Femme lymphatique, enceinte de quatre mois, vomissant les 2 premiers repas depuis un mois, gardant un peu de bouillon ou de boissons minérales le soir. Très épuisée, dans l'impossibilité de se lever, et appréhende vivement le traitement.

Les 3, 4, 5 avril, trois séances de courants continus, avec électrode positive au niveau du pneumo-gastrique droit et négative au creux épigastrique. Le premier traitement ne procure aucun soulagement, le 2^e fait merveille. Après le troisième traitement, la malade est abandonnée. L'accouchement a été régulier, et de la fin du traitement à la délivrance quelques nausées ont persisté ; mais l'alimentation a été parfaite.

OBSERVATION LXXI. — M^{me} B..., rue de Madrid, nous est confiée en juin 1896 par M. le professeur Budin. Jeune femme de 25 ans, lymphatique, épuisée par des vomissements datant de 4 mois. Grossesse de 4 mois.

Première grossesse 25 mois avant, dans d'excellentes conditions. Le traitement électrique est vivement appréhendé par la malade.

Douze séances de courants continus en 8 jours ; dès la troisième séance, grand soulagement : un repas sur deux est gardé. A la sixième séance le