

6 mars. — Les règles ont duré juste une semaine, deux jours seulement un peu abondantes. Aucune douleur avant ni pendant; seulement une légère pesanteur dans la région lombaire. La malade se dit très bien portante et absolument guérie. L'utérus est bien mobile, le col en parfait état, tous les signes physiques comme fonctionnels ont parfaitement disparu; il persiste seulement dans le cul-de-sac supérieur vaginal une petite tumeur dure. En déprimant fortement la couche graisseuse abdominale, on sent l'utérus déborder légèrement le plan des pubis. Le traitement est terminé. Jusqu'au 20, on revoit 2 fois la malade, l'état est le même; hystérométrie, 6 centimètres.

2 juillet 1895. — Le Dr Le Blond a revu la malade ces temps derniers. Etat parfait de tous points. L'utérus est seulement encore un peu gros.

OBSERVATION XCIX. (LE BLOND. Th. de LÉVY.) — M^{me} Gari... Un peu maigre, très nerveuse.

Début il y a 4 ans. Métrite et pelvipéritonite à cette époque: en même temps les tumeurs fibreuses sont diagnostiquées. Pas de métrorrhagies en dehors des règles, mais celles-ci durent 10 à 12 jours très abondantes, sont accompagnées de coliques violentes, de douleurs lombaires et de névralgies crurales à gauche vives. Tumeur faisant saillir l'abdomen en avant; elle remonte jusqu'à 2 travers de doigt au-dessous de l'ombilic, une autre tumeur remonte à gauche jusqu'à 4 centimètres au-dessus du bord supérieur des pubis. Le col utérin est gros, irrégulier, dur, douloureux à la pression. Utérus immobilisé par des adhérences, hystérométrie (incomplète), 6 centimètres (2^e séance seulement).

A la suite de la 1^{re} séance (14 décembre) + 60°, 10 minutes, galvanisation vaginale, la tumeur latérale droite devient douloureuse au toucher. Les petites masses fibreuses qui formaient des irrégularités dans le col semblent se séparer les unes des autres par des sillons; l'une d'elles à droite et dans la lèvre antérieure du col semble vouloir s'énucléer; hystérométrie partielle devenue possible.

16, 19, 23 décembre 1892. — 2^e, 3^e, 4^e applications, 85°, 160°, 150°, 8 minutes et 7 minutes, coliques utérines une ou deux heures après la séance. Les deux tumeurs constatées par la palpation abdominale semblent se séparer par un sillon; toutes deux sont d'une dureté ligneuse; elles semblent limitées plus nettement; la masse utéro-néoplasique remonte à 5 travers de doigt au-dessus des pubis, 7 centimètres en dehors de la ligne médiane à gauche, 6 centimètres à droite. Le doigt vaginal semble séparé de la main abdominale par un espace d'environ 7 centimètres d'épaisseur. Certains symptômes fonctionnels, accentués il y a quelques jours, se sont un peu améliorés: palpitations et essoufflement, besoins d'uriner; l'appétit et le sommeil sont meilleurs, la station assise est maintenant facile une heure ou deux. 5^e application, 150°, 7 minutes.

Deux heures après la séance surviennent des coliques, puis les règles

apparaissent. Elles ont été bien moins douloureuses qu'elles sont d'ordinaire, aussi longues, aussi peu abondantes.

2 janvier. — 75°, 5 minutes +.

6. — 50°, 8 minutes +.

9. — 65°, 10 minutes +. La masse se mobilise. Bon état; quelques coliques à la suite des applications; après la dernière quelques pertes rouges précédées de coliques, douleurs lombaires et crurales; galvanisation vaginale, 90°, 10 minutes, pôle positif (13 janvier).

20. — Les règles ainsi avancées ont duré 10 jours, assez abondantes, moins douloureuses et bien plus faciles qu'elles ont encore été depuis 5 ou 6 ans. L'appétit et le sommeil sont meilleurs qu'ils ont été depuis plus de 4 mois; galvanisation vaginale, pôle +, 35°, 10 minutes.

27. — Galvanisation utérine, pôle positif, 40 milliampères, 10 minutes. A ce moment la tumeur a beaucoup diminué, l'utérus est complètement libéré de ses adhérences et bien mobilisable.

30. — Galvanisation positive, intra-utérine, 50 milliampères, 12 minutes.

3 février. — 75 milliampères, 7 minutes, pôle positif utérin. La tumeur est à peine de la grosseur du poing (dans sa partie abdominale), elle débordé à gauche la ligne médiane de 4 travers de doigt environ.

6. — La malade ayant perdu quelques gouttes de sang hier matin, on pense que les règles vont arriver et l'on applique l'électrode dans le vagin, 42° 12 minutes.

10. — Galvanisation intra-utérine positive, 50 milliampères, 7 minutes.

20. — Les règles viennent de se terminer; elles ont duré 8 jours, pas douloureuses. Galvanisation vaginale + 75°, 10 minutes.

27. — 17^e séance, 35°, 10 minutes, pôle positif, vaginal.

27. — Très bon état, la malade se dit absolument guérie; elle souffre seulement de douleurs abdominales et de céphalalgie après plusieurs jours de constipation, état qui remonte à son enfance. L'utérus est bien mobile, encore un peu gros, dépassant de 2 travers de doigt le détroit supérieur. 100°, 8 minutes.

3 mars. — 65°, 8 minutes +.

6. — La malade s'étant purgée énergiquement avant-hier, les douleurs abdominales et céphaliques dont elle souffrait ont tout à fait disparu; la malade pense (comme nous-même) que son fibrome n'était pour rien dans les douleurs qu'elle ressentait encore parfois. Utérus bien mobile, pas très gros, pas douloureux, col normal, 2^oe application, 80 milliampères, 10 minutes.

10. — 75°, pôle + utérin.

24. — 22^e et dernière application, 50°, 10 minutes. La malade vient d'avoir ses règles, le 14, à peu près 32 jours après les précédentes; aucune douleur, ni avant, ni pendant, ni après, alors qu'autrefois et même dès l'enfance, elle ressentait de fortes douleurs dans les seins, le ventre, les

lombes, la cuisse gauche. La malade se trouve absolument guérie. Objectivement l'utérus est bien mobile, il ne paraît pas dépasser le bord supérieur des pubis; l'hystérométrie indique seulement 7 cent. 1/2, et une légère antéversion, peut-être un peu plus accentuée que normalement. L'état général est excellent; la malade, très engraisée, ne possède plus comme inconvénient, que de la constipation.

2 juillet 1893. — La malade revue tout récemment par le Dr Le Blond est encore parfaitement bien portante. Il n'y a pas trace de tumeur.

OBSERVATION C. (LE BLOND. Th. de LÉVY). — M^{me} Dus..., maigre, parois abdominales minces, offrant très peu de résistance au courant. Très nerveuse.

Fibrome du volume d'un œuf de dinde, dur; pertes blanches très abondantes, palpitations, douleurs abdominales et lombaires, station debout, marche sont toutes deux difficiles, mais la station assise l'est davantage encore. Tels sont les symptômes qui préoccupent le plus la malade, qui en somme ne peut s'occuper activement de rien. Les règles durent habituellement 3 jours seulement, mais sont très fortes. Col libre, allongé un peu dur.

14 décembre 1892. — Galvanisation intra-utérine +, 75 milliampères, 10 minutes.

19. — 150 milliampères, +.

23. — 90°, 10 minutes +, suivis de coliques peu intenses, durant 3¹ ou 4 heures.

2 janvier 1893. — Les règles ont débuté jeudi et ont duré jusqu'à hier matin très abondantes; la malade a été très énervée pendant leur durée, se plaignant de démangeaisons continuelles sans localisations fixes, phénomènes qui se reproduisent d'ailleurs à chaque période mensuelle.

6. — 85°, 10 minutes +.

9. — Les nuits sont devenues plus calmes. La malade qui se réveillait toutes les nuits en sursaut, 2 ou 3 fois par nuit, ne se réveille plus qu'une fois; à ces moments elle ressent une douleur lancinante dans la nuque et les épaules; c'est alors que se produit le réveil. La sensibilité générale est toujours exagérée. La tumeur semble avoir un peu diminué d'épaisseur, de même la dimension verticale; celle-ci dépasse en ce moment le rebord supérieur des pubis de 5 centimètres environ. Elle dépasse de 4 ou 5 centimètres de chaque côté la ligne médiane; elle est un peu plus saillante et plus douloureuse du côté droit que du côté gauche. 100 milliampères, pôle positif vaginal.

13. — 6^e séance, pôle positif utérin, 150 milliampères, 8 minutes. Les phénomènes névralgiques ont complètement cessé, les nuits sont calmes. L'utérus et la tumeur ont remonté et sont plus difficiles à atteindre par le toucher vaginal. Pertes liquides abondantes jusqu'à hier.

16. — Très bon état général; la tumeur, très dure, ne s'est pas modifiée dans ses dimensions, pôle positif, 100 milliampères, 10 minutes.

20. — Après la dernière séance surviennent quelques coliques, fortes surtout à gauche, suivies de l'expulsion de quelques caillots sanguins; depuis, un peu de sang rosé s'est encore écoulé; en même temps pesanteur dans les aines. La tumeur est assez difficile à percevoir par le simple palper abdominal. Combiné avec le toucher vaginal, celui-ci fait sentir la tumeur, peu épaisse, se prolongeant à 2 travers de doigt à droite, 4 travers de doigt à gauche de la ligne médiane. Cet examen ne produit pas de douleur; 40 milliampères, pôle vaginal positif.

23. — Très bon état depuis la dernière séance; 75 milliampères, 10 minutes, pôle vaginal positif.

27. — Excellent état depuis la dernière séance, pôle positif intra-utérin 75 milliampères, 12 minutes.

6 février. — Vient d'être réglée, très facilement. Il persiste de la leucorrhée. La tumeur semble avoir un peu diminué sans qu'on puisse être bien affirmatif. Très bon état général, 155 milliampères, 7 minutes, pôle intra-utérin positif.

10. — La malade se considère comme absolument guérie; sa famille et ses amis lui trouvent une mine excellente; elle monte des escaliers, etc., sans aucune fatigue. Une heure après la dernière séance elle remarque une éruption sur l'abdomen d'une quantité considérable de petites bulles qui se crèvent ensuite; aujourd'hui ils offrent l'aspect d'une miliaire jaunâtre, non douloureuse. 145 milliampères, pôle intra-utérin, 7 minutes.

13. — 170 milliampères, 10 minutes, pôle positif intra-utérin.

On place l'électrode abdominale dans les plis d'une serviette, un de ces plis fortement imbibé d'eau salée tiède étant interposé entre l'électrode et la paroi.

17. — 125°, 7 minutes +. L'éruption miliaire abdominale est tout à fait guérie et les croûtes tombées.

24. — 110°, 10 minutes +.

3 mars. — Les règles sont survenues le 28, 28 jours exactement après les précédentes, abondantes 2 jours, très peu la veille et le lendemain.

Aucune douleur lombaire ni autre, pas de coliques, pas de caillots, 65°, 8 minutes.

6. — Très bon état, la tumeur semble avoir durci, mais ne varie pas sensiblement dans ses dimensions, 83°, 10 minutes.

14. — 100°, 8 minutes +.

17. — 19^e application, 100°, 8 minutes.

20. — 20^e et dernière séance, 150°, 8 minutes. La malade qui, il y a 3 mois, était invalide, met aujourd'hui un corset relativement serré, fait autant de courses et de travail qu'une femme robuste peut en faire, peut rester très longtemps assise, debout, marchant, etc., engraisse. En un mot son état général est aussi satisfaisant qu'on peut le vouloir; la leucorrhée accompagnée de débris d'eschare solides a complètement cessé. Elle se dit mieux portante qu'elle a jamais été. A l'examen la tumeur