

de genièvre, édulcorées au besoin avec la lactose (50 grammes par litre).

8° Baies de genièvre.....	10 gr.
Faire infuser dans eau.....	150 —
Passer et ajouter acétate de potasse.....	1 —
Nitrate de potasse.....	1 —
Sirop des cinq racines.....	10 —
Oxymel scillitique.....	10 —

A prendre dans la journée.

On peut encore donner le vin diurétique de la Charité à la dose de 20 à 30 grammes dans un julep.

Autres préparations toni-cardiaques :

9° Extrait de muguet.....	1 gr.
Sirop de stigmates de maïs.....	30 —
Eau distillée.....	100 —
10° Teinture de muguet.....	XL gouttes.
Sirop de digitale.....	10 gr.
— de café.....	10 gr.
Eau.....	80 —

On donne parfois la convallamarine (1 centigr. par année d'âge), le strophantus (granules d'extrait de 1 milligr. : 2 à 3 par jour), la teinture de strophantus Kombé (V à X gouttes).

11° Sulfate de spartéine.....	0,5, 10
Sirop d'écorces d'oranges.....	30 gr.
Infusion de fleurs de genêt.....	80 —

A prendre dans les vingt-quatre heures par cuillerées.

12° Sulfate de spartéine.....	0,5, 20
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Une à deux seringues de Pravaz par jour.

13° On donne aussi la théobromine en suspension dans une cuillerée d'eau sucrée (par prises de 20 centigr., jusqu'à 1 gr., 1 gr. 50). Le salicylate de soude et de théobromine ou diurétine se prescrit en potion, vu sa solubilité.

Diurétine.....	2 gr.
Sirop de fleurs d'orange.....	20 —
Eau distillée.....	80 —

En même temps que ces médicaments on insiste sur le repos absolu au lit et sur la diète lactée.

En cas de dyspnée cardiaque, d'étouffements inquiétants, mettre en œuvre les inhalations d'oxygène, les injections de sérum artificiel, et au besoin les injections de chlorhydrate de morphine (1 milligr. par année d'âge).

Ataxie héréditaire (Voy. MALADIE DE FRIEDREICH).

Athétose (Voy. HÉMIPLÉGIE SPASMODIQUE).

Athrepsie.

Allaitement naturel ; à son défaut, lait stérilisé, lait d'ânesse, lait maternisé, gavage. On combattra la faiblesse générale par la couveuse, par les injections de sérum artificiel, par l'alcool (5 gr. dans 1/2 julep), par les frictions chaudes et stimulantes (baume de Fioravanti, vinaigre aromatique), par les inhalations d'oxygène. Contre la diarrhée verte, on donnera l'acide lactique (1 à 2 gr. dans un julep). Dans quelques cas, l'eau de chaux, l'eau de Vals, l'eau de Vichy seront préférables.

Atrophie musculaire.

On fera l'électrisation continue (séances quotidiennes de cinq minutes), le massage, la révulsion sur la colonne vertébrale : on donnera des bains salins ou sulfureux, de l'iode de potassium, le sulfate de strychnine (1 à 4 milligr. par jour suivant l'âge). Chez les enfants grandets on conseillera une cure aux eaux salines chaudes de Bourbonne ou aux eaux d'Aix-en-Savoie.

B

Bégalement.

Redresser l'enfant dès qu'il commence à parler, le faire articuler lentement, à haute voix, en veillant à ce

que sa respiration soit correcte. Pour cela, la gymnastique suédoise, la mécano-thérapie peuvent intervenir.

Blépharites.

TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Huile de foie de morue, sirops iodés, avec la restriction que la muqueuse oculaire ne soit pas irritée par l'iode, bonne nourriture, séjour à la campagne, l'air de la mer ne convenant pas aux enfants atteints d'ophtalmie. La cure de la Bourboule, d'Uriage, de Challes peut être conseillée. Eviter la poussière, la fumée, la lecture, porter des lunettes coquilles fumées.

TRAITEMENT LOCAL. — Appliquer matin et soir avec un pinceau, ou mieux un bout de papier roulé après nettoyage à l'eau boricuée chaude, sur le bord ciliaire, gros comme un pois des pommades suivantes :

1° Axonge fraîche.....	4 gr.
Précipité jaune.....	0 ^{sr} ,40
Teinture de benjoin.....	VII gouttes.

Cette préparation (Vidal) me semble trop forte.

2° Vaseline.....	10 gr.
Précipité jaune.....	0 ^{sr} ,20
3° Axonge benzoïnée.....	5 gr.
Précipité rouge.....	0 ^{sr} ,10
Acétate de plomb cristallisé.....	0 ^{sr} ,005
Huile de noisettes.....	V gouttes.

(Galezowski).

4° Axonge fraîche.....	15 gr.
Carbonate de plomb.....	0 ^{sr} ,30
Calomel.....	0 ^{sr} ,10

(Guépin).

5° Vaseline.....	10 gr.
Précipité blanc.....	} aa 0 ^{sr} ,10
Oxyde de zinc.....	
Huile de bouleau.....	

XII gouttes.

On peut encore employer une pommade à l'aristol à 1 p. 10 ou la glycérine au sublimé à 1 p. 100 (Despagnet).

Bourgeois conseille le crayon de nitrate d'argent mitigé à 1 p. 3 dans la forme ulcéreuse. S'il y a prurit, Landolt conseille :

Résorcine.....	1 gr.
Vaseline.....	10 —

et Bourgeois :

Acétate neutre de plomb.....	0 ^{sr} ,10
Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{sr} ,15
Vaseline blanche.....	3 gr

Frictions deux à quatre fois par jour.

Dans l'eczéma palpébral, les compresses imbibées de sublimé ou de cyanure d'hydrargyre à 1 p. 10000 sont recommandables. Si le mercure est mal supporté, essayer les pommades à l'oxyde de zinc (1 p. 10), au soufre (1 p. 40), à l'iodol (1 p. 10).

Bothriocéphale (Voy. TÉNIAS).

Botulisme.

En présence de l'empoisonnement par les viandes gâtées, il faut s'empresse d'évacuer le tube digestif; si l'on est appelé assez tôt, on peut faire le lavage de l'estomac avec la sonde. Ou bien on donne le calomel à doses fractionnées (5 centigr. toutes les deux heures). Pour continuer l'antisepsie intestinale, on formulera 3 à 4 paquets par jour ainsi composés :

Salicylate neutre de bismuth.....	} aa 0 ^{sr} ,20
Benzonaphтол.....	
Poudre de cannelle.....	

Boissons abondantes, régime lacté, bains chauds suivis de frictions stimulantes, inhalations d'oxygène, injections sous-cutanées de caféine, éther, sérum artificiel.

FAC. DE MED. U. A. N. L.
BIBLIOTECA

Bouillons de cérumen.

Instiller, pendant vingt quatre ou quarante huit heures, de la glycérine boratée dans le conduit auditif :

Glycérine.....	10 gr.
Borax.....	05 ^r ,15

Après introduction de XV à XX gouttes de cette solution, on met un tampon d'ouate. Puis irrigation d'eau bouillie ou boriquée tiède jusqu'à évacuation constatée par le spéculum.

Bradycardie.

Le ralentissement du pouls des convalescents n'indique aucun traitement. S'il est symptomatique d'une myocardite, on prescrit le repos absolu dans la position horizontale et on fait des frictions stimulantes, des injections de sérum artificiel, d'éther, de caféine, d'huile camphrée, de strychnine ; on prescrit la potion de Todd, les inhalations d'oxygène, etc.

Bronchite aiguë.

Au début, boissons chaudes (tisanes, lait), boîtes d'ouate, vomitif :

1 ^o Poudre d'ipéca.....	05 ^r ,50
Sirop d'ipéca.....	50 gr.

Par cuillerées à café de cinq en cinq minutes jusqu'à effet.

2 ^o Sulfate de cuivre.....	05 ^r ,20
Eau distillée.....	60 gr.

Par cuillerées à dessert de cinq en cinq minutes.

Comme tisane, on peut prescrire :

Hysope.....	} aa	5 gr.
Lierre terrestre.....		
Polygala.....		
Infuser dans eau.....		1000 —
Ajouter sirop de Désessartz.....		50 —

Comme potion expectorante et calmante on donnera :

1 ^o Oxyde blanc d'antimoine.....	1 gr.
Sirop de Tolu.....	20 —
— de codéine.....	10 —
Infusion d'hysope.....	60 —

Par cuillerées à café d'heure en heure.

2 ^o Kermès bien trituré.....	05 ^r ,10
Looch blanc.....	60 gr.

Par cuillerées à café de deux en deux heures (enfant de cinq à six ans).

3 ^o Carbonate d'ammoniaque.....	1 gr.
Sirop de Désessartz.....	20 —
Eau de menthe poivrée.....	80 —

Par cuillerées à dessert toutes les deux heures.

Comme expectorant, on a vanté en Amérique le bichromate de potasse, 3 à 5 prises de 2 à 3 milligr. triturés avec sucre. Une toux violente indique l'usage des antispasmodiques :

Téinture de belladone.....	} aa	X gouttes.
Alcoolature de racines d'aconit.....		
Elixir parégorique.....		
Sirop de violettes.....		20 gr.
Infusion de lierre terrestre.....		60 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures (enfant de cinq ans).

Élixir parégorique.....	X gouttes.
Eau de laurier-cerise.....	5 gr.
Sirop de coquelicot.....	20 —
Infusion de capillaire.....	60 —

Comme médicaments balsamiques, agissant bien sur le catarrhe bronchique, on a conseillé :

1 ^o Terpène.....	05 ^r ,25
Benzoate de soude.....	1 gr.
Sirop de Tolu.....	40 —
Eau distillée.....	60 —

Agitez. — Une cuillerée toutes les deux heures.

2 ^o Benzoate de soude.....	5 gr.
Eau.....	10 —
Sirop d'écorces d'oranges.....	40 —

Par cuillerées dans de la tisane de bourgeons de sapin (Ruault).

3 ^o Sirop de térébenthine.....	20 gr.
— de Tolu.....	40 —

Une cuillerée matin et soir dans une tasse de lait chaud.

Si l'enfant est abattu, on donne un peu d'alcool :

Cognac.....	10 gr.
Sirop de goudron.....	20 —
Eau de menthe.....	40 —

A prendre par cuillerées à café d'heure en heure.

On fera de la révulsion sur le thorax avec les ventouses sèches, la teinture d'iode, les cataplasmes sinapisés. Pas de vésicatoires, ni thapsia, ni huile de croton. On peut employer l'emplâtre poreux (*poreplaster*).

Pour assurer l'antisepsie des premières voies, on fera des pulvérisations à vapeur toutes les trois ou quatre heures avec l'eau boriquée ou une eau sulfureuse (Enghien, Challes, Labassère).

Hygiène thérapeutique : garder la chambre et même le lit s'il y a de la fièvre, température 18° à 20°. Aération. Alimentation légère, voire liquide (lait, bouillon).

Bronchite capillaire.

Ventouses sèches, cataplasmes sinapisés, compresses froides renouvelées d'heure en heure, inhalations d'oxygène, bottes d'ouate, bains chauds à 36° ou 38° (deux à trois par jour pendant cinq à dix minutes).

Potions toniques et stimulantes :

1 ^o Acétate d'ammoniaque.....	2 gr.
Eau de menthe.....	10 —
Sirop d'écorces d'oranges.....	20 —
Vin de Malaga.....	80 —

Par cuillerées à dessert d'heure en heure.

2 ^o Acétate d'ammoniaque.....	1 gr.
Sirop de codéine.....	5 —
Alcoolature de racines d'aconit.....	XV gouttes.
Julep gommeux.....	100 —

(Jules Simon).

3 ^o Teinture de digitale.....	V gouttes.
Cognac vieux.....	20 gr.
Sirop de terpine.....	10 —
— de Tolu.....	40 —

Par cuillerées à café.

En cas d'agitation, J. Simon conseillait un lavement avec :

Teinture de valériane.....	XV gouttes.
— de musc.....	XX —
Hydrate de chloral.....	0sr,50
Eau.....	60 gr.

Bronchite chronique.

Révulsifs répétés, teinture d'iode, ventouses, sinapisation. Contre les paroxysmes, on usera des vomitifs et des expectorants :

1 ^o Poudre d'ipéca.....	0sr,10
Tartre stibié.....	0sr,01

Pour un paquet, N° 3; en prendre un toutes les cinq ou dix minutes dans une cuillerée d'eau sucrée (enfant de six ans).

2 ^o Soufre lavé.....	0sr,10
Kermès.....	0sr,01
Sucre en poudre.....	1 gr.

Pour un paquet; à prendre toutes les deux heures dans une cuillerée de lait.

3 ^o Fleurs de soufre.....	0sr,50
Miel.....	20 gr.

Faire un électuaire à prendre en quatre ou cinq fois.

4 ^o Fleurs de soufre.....	5 gr.
Extrait de quinquina.....	20 —
Sirop de gomme.....	250 —

Une cuillerée à soupe matin et soir.

5° Iodure de potassium.....	1 gr.
Sirop d'iodure d'amidon.....	120 —
Une cuillerée à café avant le repas (Roger).	
6° Arséniate de soude.....	0 ^{gr} ,05
Sirop de quinquina.....	150 gr.
Une cuillerée à café deux fois par jour.	

Tisanes de bourgeons de sapin, de goudron; sirop de Tolu, etc.

En hiver, l'huile de foie de morue est à recommander, ou le sirop iodo-tannique.

En été, cure thermale au Mont-Dore ou Eaux-bonnes, Cauterets, Enghien, Challes, etc. On peut prendre à domicile une eau sulfureuse : La Bassère, Enghien (1 à 2 cuillerées le matin dans une tasse de lait chaud).

Bronchite pseudo-membraneuse.

Vomitif pour faciliter l'expulsion des fausses membranes; révulsifs et frictions. Balsamiques à l'intérieur :

1° Extrait oléo-résineux de cubèbe.....	2 gr.
Sirop de térébenthine.....	40 —
— de Tolu.....	60 —

Une cuillerée matin et soir dans du lait.

2° Terpène.....	0 ^{gr} ,60
Cognac.....	} 20 gr.
Sirop de goudron.....	
Eau distillée.....	

A prendre en trois fois dans la journée.

On donnera l'huile de morue, le sirop d'iodure de fer ou iodo-tannique; on conseillera le séjour dans le Midi pendant l'hiver, une cure sulfureuse en été (Luchon, Saint-Honoré, Allevard).

Broncho-pneumonie.

Hygiène thérapeutique : chambre vaste (50 mètres cubes), bien aérée, bien exposée (sud), bien éclairée,

chauffage au bois, température 18°; si l'on dispose de deux chambres, on changera l'enfant toutes les douze heures (chambre de jour, chambre de nuit); éviter le dessèchement de l'atmosphère par des vaporisations d'eau. Isolement des broncho-pneumoniques. Propreté du corps, lavages des cavités accessibles, éviter l'immobilité dans la même position. Alimenter autant que possible avec lait, bouillon, décoctions de céréales, crèmes liquides, lait de poule, etc.; au besoin lavements nutritifs avec lait, peptone :

Lait tiède.....	60 à 100 gr.
Jaune d'œuf.....	N° 1.
Peptone sèche.....	10 gr.
Sel.....	Une pincée.

Chez les débiles et prématurés, la couveuse, le gavage, les inhalations d'oxygène sont parfois indiqués.

Médicaments. — Révulsifs (ventouses sèches, cataplasmes sinapisés, teinture d'iode ou coton iodé, pas de vésicatoires). Les enveloppements froids du thorax avec des compresses ou des serviettes mouillées sont très utiles; on les renouvelle toutes les heures ou plus souvent si cela est nécessaire; elles font rougir la peau, refroidissent le corps, facilitent la respiration, rendent l'atmosphère humide, etc. Le drap mouillé agit de la même façon avec un peu plus d'énergie. Les bains sont très utiles. Tous les enfants supportent bien le bain tiède (32°) ou même chaud (36°, 37°, 38°). Renaut (de Lyon) a préconisé le bain à 38° renouvelé toutes les trois heures chez les enfants atteints ou menacés de broncho-pneumonie.

Dans les broncho-pneumonies hyperthermiques à foyers limités chez des enfants assez forts pour réagir, ou peut employer avec avantage le bain frais à 28°, 25° et même 20°. Ce bain devra être court (cinq à dix minutes au plus).

Le bain sinapisé (150 à 200 gr. de farine de moutarde

par bain) servira à combattre la cyanose, la tendance au collapsus, l'adynamie. A ajouter à tous ces moyens externes : les bottes d'ouates, les frictions stimulantes avec les baumes ou liniments alcooliques, térébenthinés, etc. L'emploi des agents pharmaceutiques doit être très discret; le vomitif convient très rarement à cause de son action dépressive. L'ipéca ne sera indiqué que dans les phases de début. Les purgatifs doux (manne, huile de ricin, calomel) sont plus souvent indiqués.

Le calomel à doses fractionnées notamment ne peut que rendre des services :

Calomel à la vapeur.....	0sr,02
Sucre de lait.....	0sr,50

Pour un paquet, n° 5; à prendre toutes les heures dans une cuillerée de lait ou d'eau.

Il faut assurer la diurèse par des boissons abondantes, et des diurétiques (scille, digitale, café, caféine) :

Poudre de scille.....	} aa	0sr,05
— de digitale.....		
Sirop des cinq racines.....	} aa	15 gr.
— de café.....		
Eau distillée.....		50 —

Une cuillerée à dessert toutes les deux heures.

On ne donnera pas d'opium ni de stupéfiants, mais au contraire les stimulants, la potion de Todd :

Rhum ou cognac.....	20 gr.
Teinture de cannelle.....	1 —
Sirop de quinquina.....	20 —
Eau.....	60 —

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

Vin de Malaga.....	40 gr.
Teinture de Kola.....	2 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	20 —
Eau.....	60 —

S'il y a menace d'asphyxie et de syncope, on fera des

injections sous-cutanées d'éther, de caféine, de spartéine, de strychnine, des inhalations d'oxygène :

Caféine.....	2sr,50
Benzoate de soude.....	3 gr.
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Chaque seringue de Pravaz contiendra 0sr,25 de caféine.

Sulfate de spartéine.....	0sr,20
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Faire une injection matin et soir.

Sulfate de strychnine.....	0sr,01
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Deux à trois injections par vingt-quatre heures.

Camphre.....	0sr,50
Huile stérilisée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Une à deux injections par jour.

Parmi les meilleurs stimulants et diffusibles à employer figure le sérum artificiel ou eau salée : on injecte 50, 100, 200 grammes d'eau salée à 7 grammes p. 1000 ou de sérum de Hayem :

Eau distillée bouillie.....	1000 gr.
Sulfate de soude.....	10 —
Chlorure de sodium.....	5 —

Parmi les médicaments antithermiques, le moins mauvais est la quinine qu'on peut donner en potion, en lavement, en suppositoire :

Bichlorhydrate de quinine.....	2 gr.
Extrait ou jus de réglisse.....	10 —
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau distillée.....	60 —

Deux à trois cuillerées à soupe par jour.

L'extrait de réglisse masque assez bien le goût désagréable de la quinine: le café est également un bon véhicule, mais il précipite une partie du sel.

L'*euquinine*, n'ayant pas de saveur, peut remplacer les sels amers de quinine. On la donne en paquets de

15 à 20 centigrammes délayés dans l'eau sucrée ou le lait.

Si l'enfant ne peut avaler, on prescrit :

Bichlorhydrate de quinine.....	0 ^{sr} ,25
Laudanum.....	1 goutte.
Eau tiède.....	60 gr.

Pour un lavement à garder.

Bichlorhydrate de quinine.....	0 ^{sr} ,25
Beurre de cacao.....	2 à 3 gr.

Pour un suppositoire.

Quand on veut agir vite, on fait des injections sous-cutanées avec :

Bichlorhydrate de quinine.....	2 gr.
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

Faire une à deux injections par jour.

Les frictions avec une pommade à la quinine ne sont efficaces, et encore, que chez les nourrissons.

Axonge benzoinée.....	30 gr.
Chlorhydrosulfate de quinine.....	5 —

L'antipyrine est un bon antithermique, mais plus dépresseur que la quinine à laquelle on peut d'ailleurs l'associer :

Chlorhydrate basique de quinine.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 2 gr.
Antipyrine.....	
Extrait de réglisse.....	10 —
Sirop de menthe.....	30 —
Eau distillée.....	60 —

Deux à trois cuillerées à soupe par jour.

La digitale sera prescrite dans les cas de tachycardie et de faiblesse du pouls :

Teinture de digitale.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 5 gr.
Alcoolature de racines d'aconit.....	

Prendre X gouttes trois fois par jour.

La sérothérapie antistreptococcique n'a rien donné dans le traitement des broncho-pneumonies.

Quand la broncho-pneumonie passe à l'état chronique, on soutient l'enfant par une forte alimentation (purée de légumes, hachis de viande, etc.), et on donne les balsamiques.

Benzoate de soude du benjoin.....	3 gr.
Extrait de réglisse.....	5 —
Sirop de baume de Tolu.....	30 —
Sirop de térébenthine.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 20 —
— de belladone.....	

Une cuillerée à dessert trois fois par jour dans une tasse de tisane de bourgeons de sapin.

Comme expectorant, on peut prescrire :

Oxyde blanc d'antimoine.....	2 gr.
Sirop de goudron.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 20 —
— de polygala.....	
— de fleurs d'oranger.....	10 —
Eau distillée.....	40 —

Donner quatre à cinq cuillerées à café par jour dans une infusion de capillaire ou de violettes.

Kermès minéral.....	0 ^{sr} ,10
Looch blanc.....	60 gr.

Par cuillerées à dessert de deux en deux heures.

S'il y a dilatation bronchique, fétidité de l'haleine, on donnera par cuillerées :

Teinture d'eucalyptus.....	2 gr.
Sirop d'althéa.....	20 —
— de menthe.....	30 —
Eau.....	50 —

L'huile de foie de morue, les sirops iodés, phosphatés, le quinquina serviront à remonter les petits malades.

Sirop de quinquina.....	} $\bar{a}\bar{a}$ 100 gr.
— antiscorbutilique.....	
Arséniate de soude.....	0 ^{sr} ,05

Une cuillerée à café matin et soir.

Une cure à la Bourboule, au Mont-Dore ou dans les stations sulfureuses des Pyrénées pourra compléter le traitement. Si la saison ne permet pas cette cure thermique, on enverra les petits malades à Cannes, Menton, etc.

En cas de broncho-pneumonie chronique, de sclérose pulmonaire, l'iodure de potassium peut rendre des services, à la dose de 10 à 20 centigrammes par jour.

PROPHYLAXIE. — La broncho-pneumonie est une maladie infectieuse et contagieuse. Cette notion doit inspirer la prophylaxie. On prescrira donc l'isolement pour préserver l'entourage. De plus, pour préserver l'enfant lui-même, quand il est menacé (rougeole, coqueluche, diphtérie, etc.), on fera la toilette aseptique de ses cavités accessibles : nez, bouche, gorge (pulvérisations, instillations d'huile résorcinée ou mentholée, gargarismes, etc.).

Pour éviter la broncho-pneumonie chez les enfants trachéotomisés, Moussous a fait porter au-devant du cou une cravate de tarlatane imbibée d'eau boriquée ou de :

Essence de cannelle de Ceylan.....	6 gr.
Alcool à 85°.....	50 —
Glycérine neutre.....	60 —

On fait aussi des instillations d'huile mentholée dans la canule interne.

Brûlures.

Autant que possible, dans les brûlures, il faut faire un pansement antiseptique; il y a plusieurs moyens de réaliser l'antiseptie.

Capitan, après avoir lavé à l'eau boriquée ou au sublimé à 1 p. 2000, perce les phlyctènes et enduit avec la pommade suivante :

Vaseline.....	30 gr.
Salol.....	4 —
Chlorhydrate de cocaïne.....	0 ^{gr} ,25

Par-dessus cette pommade, on applique de minces gâteaux d'ouate hydrophile imbibés de sublimé à 1 p. 2000 et bien exprimés, on superpose plusieurs de ces gâteaux et on enveloppe de taffetas gommé, taffetas chiffon, ou gutta-percha laminée. Changer le pansement tous les trois jours.

Fato et Cabatelli, après lavage et évacuation des phlyctènes, étendent des linges imprégnés de :

Lanoline.....	100 gr.
Salol.....	3 —

Renouveler le pansement deux ou trois fois par jour.

Reclus conseille la pommade à l'iodoforme :

Iodoforme.....	1 gr.
Acide borique.....	5 —
Antipyrine.....	50 —
Vaseline.....	50 —

Peyrot a employé le salol camphré :

Vaseline.....	80 gr.
Salol camphré.....	20 —

On a pansé avec le sous-nitrate de bismuth en poudre.

Reichtmann a préconisé une pommade à l'aristol :

Aristol.....	3 gr.
Huile d'olive.....	20 —
Lanoline.....	77 —

Wertheimer, après avoir lavé à l'eau boriquée tiède, applique des couches de coton hydrophile imbibées du liniment suivant et maintenues par une bande de gaze :

Thymol.....	0 ^{gr} ,10
Eau de chaux.....	60 gr.
Huile de lin.....	60 —

On peut aussi se servir de la pommade :

Acide borique.....	4 gr.
Sous-nitrate de bismuth.....	6 —
Huile d'olive.....	20 —
Lanoline.....	70 —

Pour calmer l'agitation des enfants, on donnera en même temps une cuillerée à café, à dessert, ou à soupe, suivant l'âge, de la potion :

Chloral.....	1 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	15 —
Eau.....	50 —

Siebel a préconisé la pommade à l'europhène :

Europhène.....	3 gr.
Huile d'olive.....	7 —
Lanoline.....	30 —
Vaseline.....	60 —

Demme employait la gaze iodoformée ou aristolée fraîche en recouvrant d'une couche d'ouate et en faisant de la compression.

Bidder lave la brûlure avec une solution faible de sublimé, perce les phlyctènes, saupoudre d'acide borique et badigeonne avec le *thiol* liquidé, étendu d'eau à parties égales; il applique ensuite une couche d'ouate et maintient par une bande.

Après lavage antiseptique et poudrage iodoformé des parties dénudées, Nikolsky badigeonne deux à trois fois par jour avec :

Tanin.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 4 gr.
Alcool à 95°.....	
Éther sulfurique.....	

Mme Nageotte, après nettoyage à l'éther ou une solution antiseptique chaude, panse au *thiol* et enveloppe d'ouate.

Thiéry a préconisé un bon pansement des brûlures superficielles : compresses trempées dans une solution saturée d'acide picrique (1 p. 100), ouate hydrophile par-dessus, pansements rares (trois jours d'après Thiéry), huit jours d'après Peyrot. Celui-ci conseille les injections d'atropine (1 à 2 ou 3 milligr.), pour combattre l'intoxication générale des grandes brûlures.

C

Calculs de la vessie.

Traitement chirurgical par la lithotritie, quand le calcul est mou et peu volumineux, par la taille pubienne ou hypogastrique dans le cas contraire. Chez les filles, on peut essayer l'extraction par l'urètre.

Cancer de l'œil.

Extirpation précoce et radicale, énucléation du globe, et évidemment de toute la cavité orbitaire si le nerf optique est envahi.

Cancer du rein (Voy. TUMEURS DU REIN).

Carie du rocher.

Outre les soins préventifs, le traitement antiseptique des otites, il faudra intervenir chirurgicalement, trépaner la mastoïde, évacuer l'os, etc.

Carreau.

Traitement général par les reconstituants (huile de morue, sirops iodés, bains de mer, eaux chlorurées sodiques), par la cure d'air, par les bains iodés :

Iode.....	2 gr.
Iodure de sodium.....	10 —
Eau distillée.....	200 —

Verser dans la baignoire qui doit être en bois.

Révsulsifs sur le ventre : vésicatoires volants, badigeonnages de teinture d'iode.

Frictions quotidiennes sur le ventre avec la pommade résolutive suivante :

Teinture d'iode.....	1 gr.
Iodure de potassium.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 4 —
Extrait de ciguë.....	
Axonge benzoïnée.....	