

Pour calmer l'agitation des enfants, on donnera en même temps une cuillerée à café, à dessert, ou à soupe, suivant l'âge, de la potion :

Chloral.....	1 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	15 —
Eau.....	50 —

Siebel a préconisé la pommade à l'europhène :

Europhène.....	3 gr.
Huile d'olive.....	7 —
Lanoline.....	30 —
Vaseline.....	60 —

Demme employait la gaze iodoformée ou aristolée fraîche en recouvrant d'une couche d'ouate et en faisant de la compression.

Bidder lave la brûlure avec une solution faible de sublimé, perce les phlyctènes, saupoudre d'acide borique et badigeonne avec le *thiol* liquidé, étendu d'eau à parties égales; il applique ensuite une couche d'ouate et maintient par une bande.

Après lavage antiseptique et poudrage iodoformé des parties dénudées, Nikolsky badigeonne deux à trois fois par jour avec :

Tanin.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 4 gr.
Alcool à 95°.....	
Éther sulfurique.....	

Mme Nageotte, après nettoyage à l'éther ou une solution antiseptique chaude, panse au *thiol* et enveloppe d'ouate.

Thiéry a préconisé un bon pansement des brûlures superficielles : compresses trempées dans une solution saturée d'acide picrique (1 p. 100), ouate hydrophile par-dessus, pansements rares (trois jours d'après Thiéry), huit jours d'après Peyrot. Celui-ci conseille les injections d'atropine (1 à 2 ou 3 milligr.), pour combattre l'intoxication générale des grandes brûlures.

C

Calculs de la vessie.

Traitement chirurgical par la lithotritie, quand le calcul est mou et peu volumineux, par la taille pubienne ou hypogastrique dans le cas contraire. Chez les filles, on peut essayer l'extraction par l'urètre.

Cancer de l'œil.

Extirpation précoce et radicale, énucléation du globe, et évidemment de toute la cavité orbitaire si le nerf optique est envahi.

Cancer du rein (Voy. TUMEURS DU REIN).**Carie du rocher.**

Outre les soins préventifs, le traitement antiseptique des otites, il faudra intervenir chirurgicalement, trépaner la mastoïde, évacuer l'os, etc.

Carreau.

Traitement général par les reconstituants (huile de morue, sirops iodés, bains de mer, eaux chlorurées sodiques), par la cure d'air, par les bains iodés :

Iode.....	2 gr.
Iodure de sodium.....	10 —
Eau distillée.....	200 —

Verser dans la baignoire qui doit être en bois.

Révsulsifs sur le ventre : vésicatoires volants, badigeonnages de teinture d'iode.

Frictions quotidiennes sur le ventre avec la pommade résolutive suivante :

Teinture d'iode.....	1 gr.
Iodure de potassium.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 4 —
Extrait de ciguë.....	
Axonge benzoinée.....	

A l'intérieur, lait phosphaté et iodé, potion à l'iode :

Iodure de potassium.....	10 gr.
Sirop de quinquina.....	} aa 100 —
— de fleurs d'oranger.....	

Une cuillerée à café matin et soir.

Cataracte.

Dans la cataracte zonulaire congénitale, si elle est petite, centrale, on s'abstient; si elle est volumineuse, iridectomie optique en bas et en dedans; si le noyau est gros, extraction. On extraira la cataracte molle congénitale, de même celle du diabète, etc.

Catarrhe naso-pharyngien.

Traitement général par l'huile de morue, les sirops iodés, le grand air.

Traitement local antiseptique des cavités naso-pharyngiennes; pulvérisations boriquées et sulfureuses, vaseline boriquée dans les narines, instillations biquotidiennes d'huile mentholée à 1 p. 100 ou d'huile d'olives stérilisée résorcinée à 1 p. 20.

On pourra faire des badigeonnages du pharynx avec un collutoire boraté à 1 p. 10.

Catarrhe suffocant (Voy. BRONCHITE CAPILLAIRE).

Céphalalgie.

On cherchera la cause (surmenage, dyspepsie, croissance, arthritisme) et on agira en conséquence.

Repos physique et cérébral, grand air.

Alimentation riche, mais de digestion facile (purées, œufs, laitages, fruits cuits, viandes blanches), peu de liquide (eau ou lait). Affusions froides ou douches, fric-

tions sèches ou aromatiques, drap mouillé. Médicaments eupeptiques et antiseptiques :

Bicarbonate de soude.....	} aa 0 ^{sr} ,20
Craie préparée.....	
Benzo-naphtol.....	
Poudre de noix vomique.....	0 ^{sr} ,01

Pour un paquet, n° 20; en prendre un avant les deux principaux repas dans une cuillerée à café d'eau sucrée ou de lait.

Aux enfants nerveux, on conseillera Bagnères-de-Bigorre ou Nérès, aux constipés Châtel-Guyon, aux diarrhéiques Plombières.

Céphalématome.

Ne rien faire, protéger la tuméfaction avec une couche d'ouate. S'il y a tension excessive, ponction aseptique.

S'il y a suppuration, ouverture large et pansement iodoformé.

Chlorose.

Avant tout, il faut prescrire le fer :

1 ^o Sous-carbonate de fer.....	} aa 5 gr.
Poudre de cannelle.....	
— de rhubarbe.....	

Une pincée avant chaque repas.

2 ^o Lactate de fer.....	} aa 5 gr.
Poudre de rhubarbe.....	
Sucre en poudre.....	

Même mode d'administration.

3 ^o Lactate de fer.....	0 ^{sr} ,30
Sucrate de fer.....	1 ^{sr} ,50
Oléo-saccharure de cannelle.....	2 gr.

Faire six doses; une matin et soir.

4 ^o Protoxalate de fer.....	} aa 0 ^{sr} ,10
Poudre de colombo.....	
Magnésie calcinée.....	
Poudre de noix vomique.....	

Pour un paquet, n° 20; en prendre deux par jour.

5° Sirop d'iodure de fer (deux à quatre cuillerées à café par jour) :

Iode.....	4 ^{gr} ,25
Limaille de fer.....	2 gr.
Eau distillée.....	10 —
Sirop de gomme.....	785 —
— de fleurs d'oranger.....	200 —

6° On peut prescrire une à trois cuillerées à café du mélange :

Sirop d'iodure de fer.....	200 gr.
— de sulfate de strychnine.....	20 —

7° La teinture de Bestuchef (V à X gouttes, matin et soir) est ainsi composée :

Perchlorure de fer sec.....	1 gr.
Liquueur d'Hoffmann.....	7 —

8° On peut associer le fer à l'arsenic :

Liquueur de Fowler.....	} à 5 gr.
Tartrate ferrico-potassique.....	

X gouttes avant chaque repas.

9° Pour les injections hypodermiques, d'ailleurs douloureuses, on a proposé :

Citrate de fer.....	1 gr.
Eau de laurier-cerise.....	10 —

10° Enfin on peut prescrire les eaux minérales ferrugineuses qui sont par degrés descendants de force :

Spa (19 centigr. par litre), La Bauche (14 centigr.), Orezza (12), Renlaigue, Schwalbach (8), Pymont, Forges-les-Eaux (7), Bussang (3).

Outre le traitement ferrugineux, il faut prescrire le repos absolu et prolongé au lit, le lait et la viande crue, les frictions sèches, les douches, les inhalations d'oxygène, les purgatifs. Quand le fer n'agit pas, on insiste sur l'arsenic et on conseille La Bourboule.

Le manganèse a été prescrit avec succès dans certains cas :

Carbonate ou sulfate de manganèse.....	0 ^{gr} ,10
Magnésie calcinée.....	0 ^{gr} ,20
Poudre de noix vomique.....	0 ^{gr} ,01

Pour un paquet, n° 20 ; en prendre deux par jour avant le repas.

Quelques médecins ont prescrit le sang défibriné par la bouche ou en lavements.

Botkine faisait absorber deux fois par jour 60 à 100 centimètres cubes de sang de veau, débarrassé de sa fibrine par le battage.

Teissier a donné le sang de bœuf défibriné en lavements (125 gr. matin et soir).

Le Dr Thibault (d'Angers) résume ainsi le traitement de la chlorose :

Beaucoup de repos, une bonne alimentation, petites doses de fer, pas de vin de quinquina.

Choléra asiatique.

Diète aqueuse, boissons glacées, potion de Rivière, eau de seltz, Champagne, tisane lactique :

Acide lactique.....	5 gr.
Sirop de coings.....	60 —
Essence de menthe.....	V gouttes.
Eau.....	500 gr.

Par cuillerées à soupe de dix en dix minutes.

Réchauffer l'enfant par des frictions avec flanelles chaudes, ou avec le baume composé :

Baume opodeldoch.....	} à 50 gr.
Éther.....	
Vinaigre.....	

Boules d'eau chaude aux pieds et le long des jambes, bains chauds à 38°, inhalations d'oxygène, injections

sous-cutanées d'éther, de strychnine pour combattre le collapsus :

Sulfate de strychnine.....	05 ^r ,01
Eau de laurier-cerise.....	10 gr.

Une seringue de Pravaz matin et soir.

Lavage de l'estomac à l'eau bouillie, irrigations de l'intestin avec le lavement à 38° de Cantani :

Eau bouillie.....	1000 gr.
Acide tannique.....	5 —
Gomme arabique.....	30 —
Laudanum.....	V gouttes.

En cas d'algidité et suppression du pouls, injections sous-cutanées ou intra-veineuses de sérum artificiel (100, 200 gr.) :

1° Eau stérilisée.....	1000 gr.
Bicarbonate de soude.....	3 —
Chlorure de sodium.....	4 —
	(Cantani).
2° Eau stérilisée.....	1000 gr.
Sulfate de soude.....	10 —
Chlorure de sodium.....	5 —
	(Hayem).
3° Eau stérilisée.....	1000 gr.
Chlorure de sodium.....	7 —

Isolement des malades, désinfection des matières et objets souillés, des locaux, etc.

Choléra infantile (Voy. DIARRHÉE CHOLÉRIFORME).

Chorée de Sydenham.

Pour amener le sommeil et triompher rapidement de l'agitation, on donnera l'opium ou même le *chloral* (1 gr., 1^{er},50, 1^{er},75, à prendre dans la journée, Joffroy). Féré a prescrit le *chloralose* qui, à cause de sa toxicité, sera employé à doses faibles (15, 30, 40 centigr.).

Le paraldéhyde, le sulfonal, le trional remplissent les mêmes indications :

1° Paraldéhyde.....	1 gr.
Sirop de limon.....	30 —
Eau de tilleul.....	70 —

A prendre en deux fois le soir.

2° Sulfonal ou trional.....	05 ^r ,25
-----------------------------	---------------------

Pour un paquet, à prendre dans une tasse de thé chaud ; répéter la dose une ou deux fois à une heure d'intervalle.

3° Sulfonal ou paraldéhyde.....	05 ^r ,50
Beurre de cacao.....	2 gr.

Pour un suppositoire.

Moncorvo, Löwenthal ont prescrit l'exalgine à la dose de 20 centigrammes trois fois par jour.

L'antipyrine, plus efficace, se prescrit à doses massives (50 centigr. par année d'âge), en trois, quatre ou cinq fois dans la journée :

Antipyrine.....	3 gr.
Julep gommeux.....	60 —

Une cuillerée à soupe toutes les trois heures.

On a encore employé le chlorhydrate de phénocolle (1 à 3 gr.).

Le bromure de potassium doit être prescrit à doses fortes :

Bromure de potassium.....	4 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	30 —
Eau de tilleul.....	50 —

Par cuillerées à soupe de trois en trois heures.

Les capsules de bromure de camphre à 20 centigrammes (une à huit par jour) ont donné des succès à Bourneville.

Rilliet et Barthez ont conseillé la tisane de chénopode ou thé du Mexique :

Chénopodium ambrosioides.....	4 gr.
Infuser dans eau bouillante.....	500 —
Ajouter sirop de fleurs d'oranger.....	50 —

West donnait l'oxyde de zinc à la dose de 15 à 50 centigrammes par jour.

A. Voisin associait l'oxyde de zinc (20 centigr.) à l'extrait de valériane et au bromure.

Decroizilles formule :

Valérianate de zinc.....	} ã 5 gr.
Extrait de jusquiame.....	
Sous-nitrate de bismuth.....	

Pour trente pilules ; trois à six par jour.

Frerichs a conseillé :

Extrait de chanvre indien.....	} ã 3 gr.
Lupulin.....	
Sucre en poudre.....	

Pour dix doses ; une matin et soir.

M. Magnan a fait des injections sous-cutanées de *chlorhydrate d'hyoscine* (1/2 à 1 milligr. par centimètre cube). M. Ferrand a donné le *bromhydrate de cicutine* en granules de 1 milligramme (1 à 10 par jour).

Parmi les médicaments les plus efficaces, supérieurs à l'antipyrine même, il faut citer l'arsenic. Malheureusement il doit être prescrit à doses fortes, toxiques, et il expose à la paralysie par polynévrite.

On a prescrit la liqueur de Pearson (solution d'arséniat de soude à 1 p. 600), la liqueur de Fowler (arsénite de potasse à 1 p. 100), et enfin la liqueur de Boudin (arsenic à 1 p. 1000) que je préfère.

Quand le choréique est âgé de plus de sept ans, je prescris dans une potion gommeuse, 10 grammes de liqueur de Boudin (10 milligr. d'acide arsénieux), à prendre par cuillerées toutes les deux heures. En même temps repos au lit, régime lacté. Le deuxième jour on donne 15 grammes de liqueur de Boudin, puis 20, 25, 30, parfois 35, et on redescend graduellement à 10. Le traitement dure ainsi de neuf à onze jours et l'enfant a absorbé 170 à 235 milligrammes d'acide arsénieux. Au

cours du traitement on peut avoir des vomissements, des nausées, un état saburral très prononcé, de la fièvre.

Le Dr E. Weill (de Lyon) a préconisé un beurre arsenical qui serait mieux toléré : on prend 10 grammes de beurre, 18 centigrammes d'acide arsénieux et 3 gr. 60 de sel marin, qu'on mêle intimement ; 10 centigrammes 1/2 de ce mélange contiennent 5 milligrammes d'acide arsénieux. On donne progressivement 5, 10, 15, 20, 25, 30 milligrammes d'arsenic et on redescend à 5, ce qui oblige à peser 10 1/2, 21, 31 1/2, gr., etc., de beurre arsenical qu'on triture avec 10 grammes de beurre frais et qu'on fait absorber sur des tartines. La dose est administrée en une fois et répétée tous les deux jours. Widerhofer, Fruhwald ont employé la liqueur de Fowler en injections sous-cutanées ; on l'étend de son poids d'eau distillée, ce qui abaisse le titre à 1 p. 200 ; on injecte une division de la seringue de Pravaz et on augmente tous les jours d'une division jusqu'à 8 ou 10, puis on redescend. Pour rendre l'injection moins douloureuse, on remplacera l'alcoolat de mélisse de la liqueur de Fowler par l'eau de laurier cerise.

Le *cacodylate de soude*, qui ne m'a pas donné de grands succès, a été vanté par quelques observateurs en lavements ou en injections sous-cutanées. On injecte tous les jours 1 centimètre cube d'une solution de 5 centigrammes de cacodylate par gramme. Après huit jours, on suspend quelques jours, puis on recommence.

Le traitement arsenical, qui amène très promptement la guérison de la chorée, doit être réservé aux formes graves.

Le salicylate de soude, le salophène n'ont pas d'action.

Parmi les agents physiques, il faut citer les *douches froides* souvent mal tolérées, les *affusions froides*, le *drap mouillé*, les ventouses sèches à la nuque, les pulvérisations d'éther ou de chlorure de méthyle le long de

la colonne vertébrale, la gymnastique cadencée et rythmée avec chants, la gymnastique suédoise avec massage, les courants continus, les aimants, la suggestion.

Hygiène thérapeutique.— isolement, repos au lit, nourriture peu échauffante (végétaux, laitages, viandes blanches), pas de boissons alcooliques.

Chorée électrique.

Outre les traitements prescrits dans la chorée de Sydenham, on a recommandé le tartre stibié :

Emétique..... 05^r,05
Prendre en une fois le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée.

L'électricité faradique, la suggestion ont donné des succès.

Chromidrose.

On traite les sueurs*colorées comme une manifestation hystérique : douches, drap mouillé, etc.

Chylurie.

Il faut prescrire le changement d'air, le transport à la montagne, le déplacement lointain. Moncorvo a obtenu un succès par l'ichthyol à l'intérieur : 1/2 puis 1, 2 grammes par jour.

Cirrhoses du foie.

La possibilité d'une origine syphilitique fera prescrire l'iode de potassium (1 à 2 gr. par jour) et les frictions mercurielles (onguent napolitain, 2 gr.). On a donné encore le calomel à petites doses : 1 centigramme tous les matins pendant huit jours.

Régime lacté, tisanes diurétiques : chiendent, queues de cerises, stigmates de maïs.

Potion diurétique efficace :

Infusion avec 10 gr. de baies de genièvre...	200 gr.
Sirop des cinq racines.....	} aa 15 —
Oxymel scillitique.....	
Nitrate de potasse.....	} aa 2 —
Acétate de potasse.....	

Electuaire de Kortum :

Consève de cochléaria.....	60 gr.
Extrait sec de chiendent.....	30 —
Extrait de pissenlit.....	} aa 20 —
Acétate de potasse.....	

Deux cuillerées à café par jour.

On sera conduit à faire la ponction si l'ascite est volumineuse.

La prophylaxie consiste à ne pas abuser des boissons alcooliques chez les enfants, même sous le couvert de la thérapeutique.

Coliques hépatiques.

Très rare chez les enfants, ce syndrome sera traité par les bains tièdes, les cataplasmes laudanisés, les inhalations de chloroforme, les calmants usités :

Antipyrine ou chloral.....	1 gr.
Beurre de cacao.....	3 —

Pour un suppositoire.

Chlorhydrate de morphine.....	05 ^r ,10
Sulfate d'atropine.....	05 ^r ,01
Eau de laurier-cerise.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

On injectera un quart ou une demi-seringue de Pravaz dans la seconde enfance.

L'ingestion d'huile d'olive (100 à 200 gr.), ou de glycérine (Ferrand) peut être essayée :

Glycérine pure.....	15 gr.
Eau chloroformée.....	20 —
Infusion de fleurs d'oranger.....	100 —

Ne pas oublier les purgatifs et les antiseptiques intestinaux (calomel, 5 centigr. par année d'âge; sulfate de soude, 2 grammes par année d'âge, etc.)

Bicarbonate de soude.....	} aa	0 ^{gr} ,20
Benzonaphтол.....		

Pour un paquet; en prendre cinq à six par jour dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

Comme cure thermale, il faut conseiller Vichy, Pougues, ou Carlsbad.

Hygiène thérapeutique: peu ou pas de boissons fermentées, peu de pain, de pommes de terre, d'œufs, pas de pâtisseries ou mets sucrés, pas de graisses, ni carottes, oseille, tomates, crustacés, sauces épicées, fromage fort. Exercices modérés au grand air, pas de sédentarité, pas de surmenage cérébral.

Coliques intestinales.

Chez les nourrissons, régler les tétées, en réduire le nombre, écarter l'alimentation prématurée. Bande de flanelle ou couche d'ouate sur le ventre, fomentations avec huile de camomille ou baume tranquille.

En cas de tympanisme, X gouttes de liqueur ammoniacale anisée dans un peu de lait:

Alcool à 90°.....	1	96	gr.
Essence d'anis.....	3	—	
Ammoniaque.....	24	—	

ou de:

Liqueur ammoniacale anisée.....	10	gr.
— d'Hoffmann.....	2	—

On peut encore prescrire II à V gouttes de:

Liqueur d'Hoffmann.....	} aa	3	gr.
Teinture de colombo.....			
Teinture de badiane.....	} aa	1	—
— de noix vomique.....			

Ou bien par cuillerées à dessert d'heure en heure (Bouchut):

Alcoolat d'anis.....	10	gr.
Potion gommeuse.....	150	—

Ou bien:

Essence d'anis.....	V	gouttes.
Alcool à 60°.....	5	gr.
Sirop de gommé.....	30	—
Eau.....	60	—

Par cuillerées à café d'heure en heure.

Essence d'anis.....	XII	gouttes.
Sucre blanc.....	4	gr.
Teinture de gingembre.....	8	—
Eau distillée de menthe.....	250	—

Une à deux cuillerées à dessert par jour (Ainslie).

Poudre d'anis.....	0 ^{gr} ,05
— de noix vomique.....	0 ^{gr} ,01

Deux à trois paquets par jour dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée (enfant de trois à quatre ans).

Congestion cérébrale.

Compression des carotides pendant une minute. Chambre aérée à température fraîche, vessie de glace sur la tête, bottes d'ouate, lavements purgatifs. Une sangsue au niveau de chaque apophyse mastoïde. S'il y a de l'excitation, bromure, drap mouillé.

Congestion médullaire.

Ventouses sèches ou scarifiées de chaque côté de la colonne vertébrale, sangsues au cou, vésicatoires en lanières. Purgatifs drastiques, seigle ergoté ou ergotine, bains chauds prolongés (38°), inhalations de chloroforme, frictions avec liniment de Rosen.

Congestion pulmonaire.

Ventouses sèches, cataplasmes sinapisés, compresses

froides, vomitifs (ipéca 50 centigr.), inhalations d'oxygène, purgatif.

Comme potion expectorante :

Kermès minéral.....	0 ^{sr} ,05
Sirop de polygala.....	30 gr.
Eau distillée.....	40 —

Agiter avant de s'en servir; par cuillerées à dessert de deux en deux heures (enfant de trois à sept ans).

Oxymel scillitique.....	10 gr.
Sirop de digitale.....	5 —
— de Tolu.....	20 —
Eau de tilleul.....	50 —

Même mode d'administration.

Contre les congestions subaiguës ou à répétition, on donnera l'ergot de seigle ou l'ergotine :

Ergotine.....	0 ^{sr} ,20
Sirop de guimauve.....	30 gr.
Eau de menthe.....	50 —

Par cuillerées de deux en deux heures.

Conjonctivite aiguë.

Lavages à l'eau bouillie ou boriquée tiède, au cyanure de mercure (1 p. 10000), instillations matin et soir, entre les paupières, de une à deux gouttes du collyre :

Sulfate de zinc.....	0 ^{sr} ,05
Eau distillée.....	5 gr.

Si l'inflammation ne cède pas, on pourra doubler le titre de la solution.

On complètera l'action antiseptique en appliquant matin et soir sur les bords ciliaires un peu de la pommade suivante :

Vaseline blanche.....	10 gr.
Précipité jaune.....	0 ^{sr} ,20

Quand il y a conjonctivite vésiculeuse, on touche au

crayon de nitrate d'argent mitigé ou de sulfate de cuivre.

Dans la forme contagieuse, Bourgeois conseille les badigeonnages au nitrate d'argent (1 p. 50), ou le protargol :

Protargol.....	2 à 5 gr.
Eau distillée.....	20 gr.

On peut prescrire ce médicament en collyre dans les formes traînantes :

Protargol.....	0 ^{sr} ,50
Eau distillée.....	10 gr.

On isolera les enfants atteints de conjonctivite aiguë.

Conjonctivite chronique.

Outre le traitement précédent, on insistera sur les toniques et reconstituants (huile de foie de morue, sirop d'iode de fer, eaux arsenicales et sulfureuses), verres fumés.

Après avoir essayé le nitrate d'argent en badigeonnages (1 p. 50), Bourgeois passe au collyre au protargol ou au sulfate de zinc à 1 p. 100, et conseille en même temps les lotions avec la solution de protargol à 1 p. 50 ou 1 p. 100.

Conjonctivite granuleuse.

D'après Valude, les poussées aiguës doivent être traitées par des lavages à l'eau stérilisée avec 10 centigrammes d'extrait thébaïque par litre, et par des cautérisations au nitrate d'argent (solution à 1 p. 50). Contre les granulations et la phlegmasie chronique, cristal d'alun ou crayon de sulfate cuivrique. Si la cornée est touchée, on instille matin et soir une goutte de :

Sulfate d'atropine.....	0 ^{sr} ,05
Eau distillée.....	10 gr.

On enduit le bord libre des paupières avec la pommade au précipité jaune (1 p. 50).

Les grosses granulations seront brossées après scarification ou excisées; on lave ensuite au sublimé à 1 p. 2000 et on cautérise au sulfate de cuivre.

Bourgeois badigeonne une ou deux fois par semaine avec :

Sulfate de cuivre.....	1 gr.
Glycérine neutre.....	10 —

Conjonctivite pseudo-membraneuse.

S'il y a diphtérie, injecter le sérum de Roux et laver avec une solution chaude (40° à 45°) de 10 centigrammes d'extrait thébaïque par litre d'eau, et panser avec une pommade iodoformée à 1 p. 50. Ce traitement peut venir aux conjonctivites diphtéroïdes; s'il s'agit d'abus de topiques, on suspendra toute cautérisation.

Conjonctivite purulente (Voy. OPHTALMIE PURULENTE).

Conjonctivite subaiguë.

Lotions boriquées tièdes quatre à cinq fois par jour.
Collyre fort au sulfate de zinc :

Sulfate de zinc.....	0gr,25
Eau distillée.....	10 gr.

Pommade à l'oxyde jaune ou (Morax) avec :

Ichtyol.....	0gr,50
Oxyde de zinc.....	2 gr.
Vaseline.....	} aa 10 —
Lanoline.....	

Constipation.

Nourrissons. — Cathétérisme rectal avec une sonde molle graissée de vaseline ou glycérine, suppositoires

au beurre de cacao pur ou avec glycérine. Rectifier les erreurs de régime. D'après Dorfler, le beurre frais (une demie à une cuillerée à café matin et soir pour les nourrissons de deux à trois mois, deux à trois cuillerées à café entre trois et quatre mois, deux à trois cuillerées à soupe entre cinq et douze mois), serait très efficace contre la constipation des enfants allaités artificiellement.

Lavements à l'eau bouillie, à la décoction de guimauve, de graines de lin, avec addition de glycérine, de miel de mercuriale, de séné, de sulfate de soude :

1° Eau bouillie.....	50 gr.
Miel de mercuriale.....	10 —
2° Glycérine.....	5 gr.
Décoction d'orge.....	50 —
3° Sulfate de soude.....	5 gr.
Eau de guimauve.....	50 —
4° Follicules de séné.....	4 gr.
Eau bouillante.....	50 —

Passer et donner tiède avec une poire en caoutchouc.

Les suppositoires creux contenant 50 centigrammes, 1 gramme, 2 grammes de glycérine sont très efficaces; de même les ovules en glycérine solidifiée, et surtout les petits lavements de glycérine pure (une cuillerée à café dans une petite seringue de cette contenance) sont très bons pour la constipation des nourrissons.

Les purgatifs des nouveau-nés ou nourrissons sont : le sirop de chicorée, le sirop de fleurs de pêcher, l'huile d'amandes douces qui se donnent par cuillerées à café; la manne qui se prescrit par grammes, la magnésie, le calomel, par centigrammes.

Le calomel se donne à dose unique ou à doses fractionnées :

Calomel à la vapeur.....	0gr,05
Sucre de lait.....	0gr,50

Pour un paquet; à prendre à jeun dans une cuillerée à café de lait (enfant de six mois à un an).

Calomel à la vapeur.....	08 ^r ,01
Sucre de lait.....	08 ^r ,50

Pour un paquet, n° 5; à prendre d'heure en heure.

La magnésie se prescrit de même :

Magnésie calcinée.....	08 ^r ,25
Sucre en poudre.....	1 gr.

Pour un paquet, en donner deux, trois ou quatre par jour dans une cuillerée à café de lait.

La manne se prend dans du lait tiède :

Manne en larmes.....	15 gr.
Lait tiède.....	100 —

Monti prescrit :

Mannite cristallisée.....	5 gr.
Eau distillée.....	100 —

Une cuillerée à café par heure jusqu'à effet.

Deuxième enfance. — Après le sevrage et dans la seconde enfance, on peut user de remèdes plus actifs. Le régime de l'enfant constipé sera principalement végétarien : pain, pain de Graham, légumes secs et verts, œufs, poissons, viandes blanches, fruits cuits. Écarter les viandes rouges ou noires, les mets sucrés ; rationner les liquides, interdire le vin pur, régler les repas (trois ou quatre au maximum), combattre la sédentarité. L'enfant se présentera à la garde-robe tous les jours à la même heure.

Sans abuser des lavements qui distendent l'intestin et augmentent sa paresse, on pourra cependant en donner quelquefois :

1° Sulfate de soude.....	15 gr.
Eau bouillie.....	250 —
2° Miel de mercuriale.....	40 gr.
Eau bouillie.....	200 —
3° Glycérine.....	15 gr.
Eau bouillie.....	200 —
4° Follicules de séné.....	5 gr.
Sulfate de soude.....	10 —
Eau bouillante.....	200 —

A ces grands lavements, quand il n'y a pas indication de laver le gros intestin, on préfère les petits lavements de glycérine pure (4 à 5 gr.) ou les suppositoires creux à la glycérine :

Beurre de cacao.....	Q. S.
Glycérine.....	1 gr.
Aloès.....	08 ^r ,10
Extrait de belladone.....	08 ^r ,01

Pour un suppositoire creux.

Les purgatifs salins sont très employés, ils agissent par irritation en provoquant une sécrétion abondante de l'intestin.

On peut masquer leur goût désagréable par des sirops :

1° Sulfate de soude.....	10 gr.
Sirop de groseilles.....	20 —
Eau distillée.....	100 —

A prendre en une ou plusieurs fois le matin à jeun.

2° Tartrate de soude.....	10 gr.
Sirop de limon.....	20 —
Eau.....	100 —
3° Citrate de magnésie.....	10 gr.
Sirop de framboises.....	10 —
Eau.....	100 —

Avec le citrate de magnésie, on peut faire une limonade gazeuse aromatisée au goût de l'enfant : menthe, citron, groseille, etc. On donne en moyenne 2 grammes de sel purgatif par année d'âge :

Citrate de magnésie.....	20 gr.
Eau.....	250 —

Faire une limonade purgative (enfant de huit à dix ans).

Les eaux purgatives naturelles contenant le sulfate de soude, le sulfate de magnésie, peuvent remplacer les potions précédentes : Montmirail, Sedlitz, Birmenstorf, Hunyadi-Janos, Apenta, Carabaña, Rubinat, etc.

L'huile de ricin est un bon purgatif (2 gr. par année

d'âge), qu'on prescrit seul ou émulsionné avec le lait, le café, ou placé entre deux couches de jus d'orange :

1 ^o Huile de ricin.....	10 gr.
Jaune d'œuf.....	N ^o 1.
Sucre.....	20 gr.
Infusion de café.....	100 —

Faire une émulsion et donner en une fois.

2 ^o Huile de ricin.....	} aa 15 gr.
Sirop de gomme.....	

Mêler et prendre en une fois.

La magnésie calcinée se donne à la dose de 4 à 5 grammes dans l'eau sucrée; on peut fractionner les doses et prescrire par exemple :

Magnésie calcinée.....	} aa 0 ^{sr} ,25
Rhubarbe.....	
Bicarbonate de soude.....	
Poudre de noix vomique.....	

Pour un paquet, n^o 20; en prendre un avant chaque repas dans une cuillerée d'eau sucrée ou de lait.

Le calomel se donne à la dose de 5 centigrammes par année d'âge; on peut l'associer aux purgatifs résineux, la scammonée, le jalap, etc., qui se prescrivent à la même dose :

1 ^o Poudre de scammonée.....	} aa 0 ^{sr} ,25
Calomel.....	

(Enfant de cinq ans).

2 ^o Poudre de scammonée.....	} aa 0 ^{sr} ,20
— de jalap.....	
Podophyllin.....	

Les enfants habituellement constipés peuvent faire une cure à Châtel-Guyon.

Les moyens externes qu'on conseille sont : les compresses d'eau froide sur le ventre, les liniments purgatifs, le massage, l'électricité.

Graves conseillait des frictions tous les matins sur l'épigastre avec :

Teinture de jalap.....	1 gr.
Huile de ricin.....	4 —

Je n'ai pas parlé des purgatifs énergiques, tels que l'aloès, l'eau-de-vie allemande, qui sont peu usités chez l'enfant. Cependant, quand on veut provoquer d'abondantes évacuations, on peut donner l'eau-de-vie allemande (1 gr. par année d'âge avec parties égales de sirop de nerprun).

Convulsions.

Donner un lavement purgatif (glycérine, eau salée, eau de savon, miel, huile), puis un lavement calmant :

1 ^o Musc.....	0 ^{sr} ,10
Hydrate de chloral.....	0 ^{sr} ,20
Camphe.....	1 gr.
Jaune d'œuf.....	N ^o 1.
Eau.....	60 gr.
2 ^o Chloroforme.....	1 gr.
Jaune d'œuf.....	N ^o 1.
Gomme.....	5 gr.
Eau.....	60 —

On peut donner aussi un petit lavement avec antipyrine :

Antipyrine.....	0 ^{sr} ,50
Eau distillée.....	50 gr.

Ou bien on se sert de suppositoires :

Beurre de cacao.....	2 gr.
Chloral ou antipyrine.....	0 ^{sr} ,25
Bromure de potassium.....	0 ^{sr} ,50

En cas d'accès intenses ou répétées, les inhalations d'éther ou de chloroforme sont très efficaces.

Parfois le bain tiède rendra des services.

Comme potions calmantes, on peut donner :

1 ^o Bromure de potassium.....	1 gr.
Musc.....	0 ^{gr} ,20
Hydrolat de tilleul.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 50 gr.
— de fleurs d'oranger.....	
Sirop simple.....	20 —

Une cuillerée à café tous les quarts d'heure (J. Simon).

2 ^o Bromure de potassium.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 1 gr.
— de sodium.....	
— d'ammonium.....	
— de strontium.....	
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau de tilleul.....	100 —

Une cuillerée à café d'heure en heure.

Monteuils conseille les bottes mouillées : mouchoirs ou compresses trempés dans l'eau froide aiguisée d'eau de Cologne ou de vinaigre, entourant les jambes avec maillot de laine par-dessus (renouveler toutes les heures ou toutes les demi-heures). Si l'on soupçonne la syphilis, faire des frictions quotidiennes avec la pommade :

1 ^o Axonge benzoïnée.....	20 gr.
Onguent napolitain.....	10 —
Iodure de potassium.....	4 —
Extrait de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 0 ^{gr} ,50
— de jusquiame.....	

2^o Donner en même temps une cuillerée à café par heure de la potion :

Iodure de potassium.....	1 gr.
Sirop de fleurs d'oranger.....	30 —
Eau de tilleul.....	70 —

Si l'on soupçonne les vers intestinaux, donner la san-tonine, etc.

Si le paludisme est à craindre, injections sous-cutanées de quinine :

Bichlorhydrate de quinine.....	1 gr.
Eau distillée.....	Q. S. p. 10 cent. cub.

On peut encore donner la quinine en lavement ou en suppositoire :

Bromhydrate de quinine.....	0 ^{gr} ,20
Beurre de cacao.....	2 gr.

L'hygiène thérapeutique consiste dans une bonne alimentation, la vie au grand air, les bains tièdes ; pas de boissons alcooliques ; si l'enfant est au sein, penser à l'alcoolisme de la nourrice.

Coqueluche.

Dans la coqueluche, à la période des quintes, chez des enfants résistants, non déprimés, on peut donner un vomitif : ipéca (10 centigr. par année d'âge), émétique (1/2 centigr.), sulfate de cuivre (25 centigr. dans 100 gr. d'eau). Le vomitif peut être répété une ou deux fois par semaine.

Netter (de Nancy) s'est bien trouvé de l'oxymel scillitique pur, de bonne qualité, donné entre cinq et six heures du soir, par cuillerées à café (quatre ou cinq entre deux et trois ans, six au-dessus de cet âge).

Albrecht a conseillé la pilocarpine :

Chlorhydrate de pilocarpine.....	0 ^{gr} ,25
Cognac.....	5 gr.
Sirop d'écorces d'oranges.....	25 —
Eau.....	70 —

Une cuillerée à café après chaque quinte.

La belladone est un des meilleurs médicaments à opposer à la coqueluche (Trousseau) ; on peut formuler :

Extrait de belladone.....	} $\tilde{a}\tilde{a}$ 5 milligr.
Poudre de belladone.....	
Excipient avec glycérine.....	Q. S.

Pour une pilule (trois à six par jour mêlées à du sirop, confiture, etc.)

On prescrit plus volontiers la teinture de belladone